

بررسی تعدیل اثر تنش خشکی با کاربرد عناصر پتاسیم و روی در ذرت

جواد جمالی^{۱*}، شکوفه انتشاری^۲ و سید ماشاالله حسینی^۳

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی، دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان، javad_jamali89@yahoo.com

۲- استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان

۳- استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده

تغذیه مطلوب گیاهی، به عنوان یکی از روش های مؤثر بر تواناسازی گیاهان در مقابله با تنش خشکی به شمار می رود و می تواند به کاهش اثرات مضر تنش خشکی و جلوگیری از کاهش عملکرد دانه کمک کند. به این منظور آزمایشی در شرایط مزرعه در شهرستان بوانات در سال ۱۳۸۹ به صورت اسپلیت فاکتوریل و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار انجام گردید. در این آزمایش که روی ذرت رقم سینگل کراس ۷۰۴ انجام شد، کرت های اصلی مربوط به تنش خشکی (شاهد و تنش در مرحله رویشی (۷۰ روز بعد از کاشت)) و کرت های فرعی شامل سطوح مختلف سولفات پتاسیم (۰، ۱۵۰ و ۳۰۰) کیلوگرم در هکتار و سطوح مختلف سولفات روی (۰، ۱۵ و ۳۰) کیلوگرم در هکتار بود. در این آزمایش عملکرد دانه، وزن ۱۰۰ دانه، ارتفاع بوته و قطر ساقه، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد که تنش خشکی به طور معنی داری موجب کاهش عملکرد دانه، وزن ۱۰۰ دانه و ارتفاع بوته گردید، در حالی که مصرف سولفات پتاسیم و سولفات روی، مقاومت گیاه را به کاهش این صفات افزایش داد و در نتیجه موجب تعدیل اثرات مضر تنش خشکی گردید.

واژه های کلیدی: پتاسیم، تنش خشکی، ذرت، روی، عملکرد دانه.

مقدمه

رتفعی و همکاران، (۱۳۸۳). تنش خشکی با تاثیر بر آماس سلولی و در نتیجه باز و بسته شدن روزنه ها، فرایند های فتوسنتز، تنفس و تعرق را تحت تاثیر قرار داده و از طرف دیگر با تاثیر بر فرایند های آنزیمی، که به طور مستقیم با پتانسیل آب کنترل می شوند، بر رشد گیاه اثر منفی می گذارند (منصوری فر و همکاران، ۱۳۸۴). دهقانیان و مدن دوست (۱۳۸۷) تغذیه مطلوب گیاهی، به ویژه تامین عنصر روی، را به عنوان یکی از روش های مؤثر بر توانا سازی گیاهان در مقابله با تنش خشکی معرفی کردند. پتاسیم به عنوان یک فاکتور بسیار مهم، جهت کنترل کمبود

تنش خشکی، مهمترین عاملی است که در بیشتر مراحل رشد گیاهان زراعی، در مناطق خشک و نیمه خشک، با ایجاد محدودیت در رشد، دستیابی به عملکرد بالا را دشوار می سازد (Kramer, 1969). تنش خشکی، فتوسنتز را از طریق بسته شدن روزنه ها و نرسیدن دی اکسید کربن به کلروپلاست و همچنین کاهش پتانسیل آب سلول، تحت تاثیر قرار می دهد. تنش خشکی با تاثیر منفی بر رشد و نمو اندامک های زایشی، موجب کاهش اجزای عملکرد، شامل تعداد بلال در واحد سطح، تعداد دانه در ردیف، و وزن صد دانه و در نهایت عملکرد دانه می شود

آدرس نویسنده مسئول: اصفهان، دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان، گروه زیست شناسی گیاهی.

* دریافت: ۹۰/۱/۲۳ و پذیرش: ۹۰/۷/۳

عنصر نقش مهمی در حفاظت سلول‌های گیاه از گونه‌های واکنش دهنده با اکسیژن (ROS) ایفا می‌کند (شیخ بگلو و همکاران ۱۳۸۸). کاهش جریان توده‌ای آب ناشی از تنش خشکی موجب اختلال در جذب عناصر توسط گیاه می‌گردد (رفیعی و همکاران، ۱۳۸۳). به طور معمول غلظت عناصر غذایی جهت رشد در طی تنش خشکی، کاهش می‌یابد، این موضوع نشان دهنده اثر غیر مستقیم حجم آب خاک بر جذب عناصر غذایی است که از اثر مستقیم تنش آب بر رشد گیاه، اهمیت بیشتری دارد (منصوری فر و همکاران، ۱۳۸۴). تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد مصرف سولفات پتاسیم در شرایط مطلوب رطوبتی و تنش خشکی، صفات عملکرد بیولوژیکی و انباشتگی پتاسیم در برگ نسبت به تیمارهای مشابه ولی بدون مصرف پتاسیم، افزایش نشان دادند (Dastbandannejad et al., 2010). همچنین با مصرف سولفات روی، در شرایط مطلوب رطوبتی و تنش خشکی، صفات عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت و کارایی مصرف آب، نسبت به تیمارهای مشابه و بدون مصرف روی، افزایش یافتند (Sajadi et al., 2009). در این تحقیق اثر مصرف بهینه سولفات پتاسیم و سولفات روی، در تعدیل اثرات تنش خشکی در ذرت در شرایط تنش خشکی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مواد و روش‌ها

این آزمایش در سال ۱۳۸۹ در شرایط مزرعه در شهرستان بوانات واقع در شمال فارس اجرا گردید. بافت خاک مزرعه بر اساس آزمایش، شنی - لومی و میزان پتاسیم، روی، ماده آلی خاک به ترتیب ۱۹۰، ۱/۰۴، ۱/۹۵ میلی گرم بر کیلوگرم خاک و pH خاک ۷ بدست آمد. این آزمایش به صورت سه تکرار اسپلیت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی و در ۳ تکرار انجام شد. کرت‌های اصلی مربوط به تنش خشکی (شاهد و تنش

آب در گیاهان شناخته شده است، این عنصر در رشد محصولات کشاورزی نقش مهمی ایفا می‌کند و یک عنصر مهم در فیزیولوژی روابط آبی گیاه می‌باشد (Valadabadi et al., 2009). تنظیم و باز و بسته شدن روزنه‌های برگ، کنترل آب مصرفی، حفظ تعادل رطوبت و شادابی گیاه، کاهش آب مصرفی به ازاء هر واحد محصول تولیدی و ادامه کربن گیری در شرایط خشکی، از نقش‌های موثر پتاسیم در گیاه می‌باشد که باعث افزایش مقاومت گیاه در برابر خشکی می‌گردد. پتاسیم در کلیه فرایندهای بیولوژیکی گیاه، به صورت کاتالیزور دخالت دارد. پتاسیم نقش عمده‌ای در مقابله با کم آبی‌ها، بیماری‌ها و همچنین ورس گیاه دارد (محمدی و همکاران، ۱۳۸۹). با توجه به نتایج بررسی‌های انجام شده، افزایش شدت تنش خشکی، منجر به افزایش نیاز گیاهان به پتاسیم، به منظور حفظ فرایند فتوسنتز و نگهداری از کلروپلاست در برابر آسیب ناشی از اکسیداتیو می‌شود. از نتایج به دست آمده می‌تواند به این موضوع دست یافت که بهبود سطح تغذیه با عنصر پتاسیم در گیاهان، برای حفظ عملکرد بالا تحت شرایط تنش خشکی از اهمیت بسزایی برخوردار است (Cakmak, 2005). عناصر غذایی کم مصرف مانند روی، برای رشد گیاهان ضروری می‌باشد و در فرایندهای فیزیولوژیکی مانند فتوسنتز، تولید هرمون‌های رشد و تشکیل کلروفیل گیاهی دخالت دارد و کمبود آن می‌تواند باعث عدم توازن عناصر غذایی در گیاه شده و کاهش راندمان مصرف آب و در نهایت، کاهش کیفیت و کمیت محصول را در پی داشته باشد (گوهری و همکاران، ۱۳۸۹). این عنصر نقش اساسی در سنتز پروتئین‌ها، DNA و RNA ایفا می‌کند. کمبود روی، فعالیت چندین آنزیم از جمله فسفاتاز، الکل دی هیدروژناز، دیمیدین کیناز، کربوکسی پپتیداز، DNA و RNA را کاهش می‌دهد. کمبود ناشی از روی، سبب اختلال در متابولیسم بافت سلولی می‌گردد و مسئول خسارت به پروتئین‌های غشاء کلروفیل، اسیدهای نوکلئیک، آنزیم‌ها، ایندول استیک اسید می‌باشد، بنابراین سبب ممانعت از رشد گیاه می‌شود. این

و وزن هزار دانه گیاهان دارد. نتایج آزمایش حاضر، با نتایج به دست آمده توسط این محققین همراستا می‌باشد. نتایج تجزیه واریانس وزن صد دانه نشان داد که اثر تنش خشکی و همچنین مصرف توام سولفات پتاسیم و سولفات روی، بر وزن صد دانه در سطح احتمال ۵٪ معنی دار شد، در حالی که اثر متقابل تنش خشکی و مصرف توام سولفات پتاسیم و سولفات روی، بر وزن صد دانه معنی دار نشد (جدول ۱). در رابطه با اثر متقابل تنش خشکی و مصرف سولفات پتاسیم و سولفات روی، بیشترین وزن صد دانه مربوط به تیمار عدم تنش خشکی و مصرف توام ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم و ۳۰ کیلوگرم در هکتار سولفات روی، به میزان ۲۸/۰۳ گرم به دست آمد (جدول ۲). فریدریک و همکاران^۱ (۱۹۹۰) اعلام نمودند که بیشترین اثر تنش خشکی بر وزن هزاردانه، در طی پر شدن دانه دیده می‌شود. وقتی که گیاه در معرض تنش خشکی قرار می‌گیرد، برای اینکه از اثرات تنش خشکی فرار کند، اقدام به کوتاه کردن چرخه زندگی خود می‌کند، بنابراین به دلیل کوتاه تر شدن طول دوره پر شدن دانه، وزن نهایی دانه ها کم می‌شود.

نتایج تجزیه واریانس ارتفاع بوته نشان داد که اثر تنش خشکی بر ارتفاع بوته در سطح احتمال ۱٪ معنی دار شد. در حالی که اثر متقابل تنش خشکی و مصرف سولفات پتاسیم و سولفات روی معنی دار نشد (جدول ۱). با توجه به مقایسه میانگین اثر متقابل سه جانبه بیشترین ارتفاع بوته، مربوط به تیمار عدم تنش خشکی و مصرف ۳۰ کیلوگرم در هکتار سولفات روی و عدم مصرف سولفات پتاسیم به میزان ۱۷۲/۹۰ سانتیمتر به دست آمد (جدول ۲). دستبندان نژاد و همکاران (۲۰۱۰) گزارش نمودند با حضور عنصر پتاسیم، تنش آب و اثر آن بر ارتفاع گیاه تعدیل می‌یابد. دلیل چنین پدیده ای می‌تواند مربوط به قابلیت بالای فتوسنتز به وسیله افزایش یافتن تثبیت کربن، و افزایش فعالیت آنزیم روبیسکو و همچنین کمک به سنتز و انتقال

خشکی در مرحله رویشی (۷۰ روز بعد از کاشت)) و کرت‌های فرعی شامل سه مقدار مصرف سولفات روی (۰، ۱۵، ۳۰ کیلوگرم در هکتار) و ۳ مقدار مصرف سولفات پتاسیم (۰، ۱۵۰، ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار) در نظر گرفته شد. و سولفات پتاسیم و سولفات روی قبل از کاشت به خاک اضافه شد. اعمال تنش به صورت حذف یک دور آبیاری اجرا گردید. در مجموع ۵۴ کرت و مساحت هر کرت ۱۲ متر مربع (۵ × ۲/۴) شامل دو پشته به عرض ۷۵ سانتی‌متر و ۴ خط کشت به طول ۵ متر و فاصله بین بوته های ذرت ۲۰ سانتی‌متر در نظر گرفته شد. فواصل بین کرت‌های اصلی ۱/۵ متر و فواصل بین کرت‌های فرعی ۰/۵ متر در نظر گرفته شد. نتایج با استفاده از نرم افزار C-MSTAT تجزیه و تحلیل گردید. جهت مقایسه میانگین ها از آزمون دانکن استفاده شد.

نتایج و بحث

نتایج تجزیه واریانس عملکرد دانه نشان داد که اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه، در سطح احتمال ۱٪ و همچنین اثر سولفات روی و برهمکنش تنش خشکی و سولفات پتاسیم در سطح احتمال ۵٪ معنی دار شد. در حالی که برهمکنش تنش خشکی و مصرف توام سولفات پتاسیم و سولفات روی، بر عملکرد دانه معنی دار نشد (جدول ۱). در خصوص اثر متقابل تنش خشکی و مصرف توام سولفات پتاسیم و سولفات روی، بیشترین عملکرد دانه مربوط به تیمار عدم تنش خشکی و مصرف توام ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم و ۳۰ کیلوگرم در هکتار سولفات روی، به میزان ۱۱/۱۴ تن در هکتار به دست آمد (جدول ۲). نتایج بررسی دستبندان نژاد و همکاران (۲۰۱۰) نشان داد با مصرف سولفات پتاسیم، تحت شرایط تنش خشکی عملکرد دانه افزایش نشان می‌دهد. تالوث و همکاران (۲۰۰۶) گزارش نمودند که محلول پاشی سولفات روی در شرایط تنش خشکی تاثیر مثبتی بر رشد، عملکرد

ماده باشد. کاکماک^۱ (۲۰۰۰) اعلام نمود، کمبود ناشی از عنصر روی، سبب اختلال در متابولیسم بافت سلولی می گردد و مسئول خسارت به پروتئین های غشاء، کلروفیل، اسیدهای نوکلئیک، آنزیم ها، ایندول استیک اسید می باشد، بنابراین سبب ممانعت از رشد گیاه می شود. تحقیقات انجام شده در این خصوص توسط محققین، نشان می دهد که ارتفاع بوته و قطر ساقه، در شرایط تنش خشکی به طور قابل توجهی کاهش داشته است، در حالی که با مصرف سولفات روی، در همان سطح تنش، از کاهش ارتفاع بوته و قطر ساقه جلوگیری شده است (Sajadi et al., 2009) و شیخ بگلو، (۱۳۸۸).

نتایج تجزیه واریانس قطر ساقه، نشان داد که اثر تنش خشکی بر قطر ساقه معنی دار نشد (جدول ۱). با توجه به مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی با مصرف این دو کود، بیشترین قطر ساقه مربوط به مصرف توام ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم و ۳۰ کیلوگرم در هکتار سولفات روی، و کمترین میزان قطر ساقه، مربوط به عدم مصرف این دو کود در شرایط عدم تنش خشکی، به ترتیب، برابر با ۷/۸۹ و ۶/۸۵ سانتی متر می باشد.

نتایج تجزیه واریانس غلظت کلروفیل، نشان داد که اثر تنش خشکی بر غلظت کلروفیل، در سطح احتمال ۰.۵٪ معنی دار گردید (جدول ۱). با توجه به مقایسه میانگین اثر متقابل سه جانبه، بیشترین غلظت کلروفیل، مربوط به تیمار تنش خشکی و مصرف ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم و عدم مصرف سولفات روی، به میزان ۲۹/۱۵ میلی گرم بر گرم به دست آمد. افزایش غلظت کلروفیل، با مصرف سولفات پتاسیم، قبلاً توسط محققین اثبات شده است (Perry et al., 1972). همچنین گزارش های بسیاری مؤید تاثیر مثبت عنصر روی در افزایش محتوای کلروفیل در برگ ذرت می باشد (Ayad et al., 2010) (Potarzycki and Grzebisz, 2009).

جدول ۱- تجزیه واریانس تاثیر تنش آب، سولفات پتاسیم و سولفات روی بر برخی صفات اندازه گیری شده در ذرت

میانگین مربعات					درجه آزادی	منابع تغییرات
عملکرد دانه (ton/ha)	وزن صد دانه (g)	ارتفاع بوته (cm)	قطرساقه (cm)	کلروفیل کل (mg/g)		
۷۶۷۹۸۵/۲۸	۰/۵۵	۱۰/۰۱	۰/۴۵	۱۷/۹۴	۲	تکرار
۳۳۷۴۹۹۹۶۵/۸۲ ^{**}	۲۰۲/۶۱ [*]	۳۰۴۲۱/۶۲ ^{**}	۰/۱۵ ^{NS}	۴۹۱/۲۹ [*]	۱	تنش
۱۳۷۰۷۳/۶۲ ^{NS}	۰/۵۵ ^{NS}	۳۶/۶۹ ^{NS}	۰/۲۲ ^{NS}	۶۶/۷۲ ^{NS}	۲	سولفات پتاسیم
۱۳۶۰۲۲۹۲/۳۷ [*]	۱/۲۱ ^{NS}	۱۰۵/۴۵ ^{NS}	۰/۰۱ ^{NS}	۱۸/۳۱ ^{NS}	۲	تنش × سولفات پتاسیم
۴۹۳۴۶۴۶/۰۱ [*]	۱/۰۰ ^{NS}	۶/۶۷ ^{NS}	۰/۲۷ ^{NS}	۲/۲۷ ^{NS}	۲	سولفات روی
۴۳۸۹۴۹/۷۸ ^{NS}	۴/۳۹ ^{NS}	۲۳۸/۳۵ ^{NS}	۰/۴۲ ^{NS}	۱۴/۳۳ ^{NS}	۲	تنش × سولفات روی
۲۷۷۰۲۸۱/۲۷ ^{NS}	۶/۳۰ [*]	۱۵۰/۲۹ ^{NS}	۰/۲۷ ^{NS}	۱۳/۴۵ ^{NS}	۴	سولفات پتاسیم × سولفات روی
۱۳۲۳۹۱۹/۶۱ ^{NS}	۰/۳۳ ^{NS}	۵۴/۷۹ ^{NS}	۰/۱۱ ^{NS}	۲۳/۸۱ ^{NS}	۴	تنش × سولفات پتاسیم × سولفات روی
۱۴۰۹۹۳۳/۵۵	۲/۸۳	۱۶۴/۴۹	۰/۲۵	۱۷/۶۱	۲۴	خطای کل
۱۶/۵۱	۷/۰۳	۹/۱۳	۶/۷۹	۲۰/۲۰		ضریب تغییرات (%)

^{**} و ^{*} و ^{NS} به ترتیب بیانگر تفاوت معنی دار در سطح احتمال ۱ و ۵ درصد و عدم تفاوت معنی دار می باشد.

جدول ۲- مقایسه میانگین اثر متقابل تنش خشکی، سولفات پتاسیم و سولفات روی بر صفات اندازه گیری شده در ذرت

تیماها	عملکرد دانه		وزن صد دانه (g)	ارتفاع بوته (cm)	قطرساقه (cm)	کلروفیل (mg/g)	تنش خشکی	
	(ton/ha)	(g)					سولفات پتاسیم	سولفات روی
عدم تنش	۸/۸۸ab	۲۵/۱۰abcd	۱۵۸/۹۰a	۶/۸۵b	۱۵/۵۹de	۰	۰	
عدم تنش	۹/۶۴ab	۲۵/۰۵abcd	۱۶۵/۹۰a	۷/۵۱ab	۱۶/۱۵cde	۱۵	۰	
عدم تنش	۱/۰۹ab	۲۶/۸۰ab	۱۷۲/۹۰a	۷/۵۰ab	۱۹/۲۹bcde	۳۰	۰	
عدم تنش	۸/۷۶b	۲۴/۴۵bcde	۱۶۳/۲۰a	۷/۴۶ab	۱۹/۰۴bcde	۰	۱۵۰	
عدم تنش	۹/۷۳ab	۲۶/۵۳ab	۱۶۱/۵۰a	۷/۰۶ab	۱۴/۶۶e	۱۵	۱۵۰	
عدم تنش	۱۱/۱۴a	۲۸/۰۳a	۱۶۹/۷۰a	۷/۸۹a	۱۵/۷۸de	۳۰	۱۵۰	
عدم تنش	۹/۵۹ab	۲۶/۲۷ab	۱۶۱/۲۰a	۷/۰۵ab	۱۶/۱۴cde	۰	۳۰۰	
عدم تنش	۹/۵۸ab	۲۵/۳۳abc	۱۶۲/۰۰a	۷/۴۶ab	۲۱/۵۱abcde	۱۵	۳۰۰	
عدم تنش	۹/۰۰ab	۲۵/۲۰abcd	۱۶۲/۱۰a	۷/۴۷ab	۲۱/۶۴abcde	۳۰	۳۰۰	
تنش	۴/۴۴c	۲۲/۲۰cdef	۱۱۷/۳۰b	۷/۰۸ab	۱۹/۵۰bcde	۰	۰	
تنش	۳/۵۸c	۲۲/۰۰def	۱۲۴/۰۰b	۷/۲۱ab	۲۲/۲۸abcde	۱۵	۰	
تنش	۵/۱۶c	۲۲/۳۰cdef	۱۱۱/۳۰b	۷/۳۲ab	۲۱/۱۹abcde	۳۰	۰	
تنش	۳/۵۳c	۲۱/۳۷ef	۱۱۲/۵۰b	۷/۵۴ab	۲۵/۷۹ab	۰	۱۵۰	
تنش	۵/۵۴c	۲۲/۱۰cdef	۱۰۹/۱۰b	۷/۲۱ab	۲۳/۴۸abcd	۱۵	۱۵۰	
تنش	۴/۹۳c	۲۲/۱۷cdef	۱۱۷/۵۰b	۷/۴۶ab	۲۴/۲۳abc	۳۰	۱۵۰	
تنش	۴/۵۹c	۲۲/۹۳cdef	۱۲۶/۱۰b	۷/۴۷ab	۲۹/۱۵a	۰	۳۰۰	
تنش	۵/۵۷c	۲۲/۲۳cdef	۱۲۴/۰۰b	۶/۹۶ab	۲۴/۲۰abc	۱۵	۳۰۰	
تنش	۴/۸۹c	۲۰/۶۰f	۱۰۸/۵۰b	۷/۰۷ab	۲۴/۲۸abc	۳۰	۳۰۰	

حروف مشابه در هر ستون برای هر صفت بیانگر عدم اختلاف معنی دار در سطح احتمال ۵ درصد می باشد.

فهرست منابع

۱. دهقانیان، م. و مدن دوست، م.، ۱۳۸۷. تاثیر کلات روی بر مقاومت به خشکی گندم. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، ۱۲(۴۵): ۳۹۳-۴۰۰.
۲. رفیعی، م.، نادیان، ح.، نور محمدی، ق. و کریمی، م.، ۱۳۸۳. اثرات تنش خشکی و مقادیر روی و فسفر بر غلظت وکل جذب عناصر در ذرت. مجله علوم کشاورزی ایران. ۳۵(۱): ۲۴۳-۲۳۵.
۳. شیخ بگلو، ن.، قورت تپه، ع.، باغستانی، م. و زند، ب.، ۱۳۸۸. بررسی تاثیر محلول پاشی عنصر روی بر عملکرد کمی و کیفی ذرت دانه ای تحت شرایط تنش آب. مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی، ۲(۲): ۶ صفحه
۴. گوهری، ف.، بحرانی، ع. و باقری، ع.، ۱۳۸۹. تاثیر کود های ماکرو و میکرو بر راندمان مصرف آب در کلزا. همایش ملی مدیریت کمبود آب و تنش خشکی در زراعت، ارسنجان، ۵-۴ اسفند، ۱۴ صفحه.
۵. محمدی، م.، قاسمی، س. و جعفری حقیقی، ب.، ۱۳۸۹. اثر رژیم آبیاری و سطوح مختلف کود پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای. همایش ملی مدیریت کمبود آب و تنش خشکی در زراعت. ارسنجان، ارسنجان، ۵-۴ اسفند، ۱۳ صفحه.
۶. منصوری فر، س.، مدرس، ع. و جلالی، م.، ۱۳۸۴. تاثیر تنش خشکی و کمبود نیتروژن بر تغییرات کمی و کیفی پروتئین های محلول در برگ ذرت. مجله علوم کشاورزی ایران، ۳(۳): ۶۳۷-۶۲۵.
7. Ayad, H.S., Reda, F. and Abdalla, M.S.A. 2010. Effect of putrescine and zinc on vegetative growth, photosynthetic pigments, lipid peroxidation and essential oil content of geranium (*Pelargonium graveolens L.*). World Journal of Agricultural Sciences, 6: 601-608.
8. Cakmak, I., 2000. Possible roles of zinc in protecting plant cells from damage by reactive oxygen species. New Phytol, 146: 185-205.
9. Cakmak, I. 2005. The role of potassium in alleviating detrimental effects of abiotic stresses in plants. Jurnal Plant NutrSoil, 168: 521-530.
10. Dastbandannejad, S., Saki, S. and Lack, S., 2010. Study effect drought stress and different levels potassium fertilizer on K accumulation in corn. Nature and Science, 8: 23-28.
11. Fredrick, J.R., Below, F.E. and Hesketh, J.D., 1990. Carbohydrate, nitrogen and dry matter accumulation and partitioning of maize hybrids under drought stress. Ann Bot, 66: 407-415.
12. Kramer, P.J., 1969. Plant and soil water relationship: a modern synthesis. Mc Graw-Hill, New York, 18: 281-295.
13. Perry, T.W., Rhykerd, C.L., Holt, D.A. and Mayo, H.H., 1972. Effect of potassium fertilization on chemical characteristics, yield and nutritive value of corn silage. Journal of animal science. 34: 642-646.
14. Potarzycki, J., Grzebisz, W., 2009. Effect of zinc foliar application on grain yield of maize and its yielding components. Plant soil environ, 55: 519-527.
15. Sajadi, N. A., Madani, H. and Sajedi, A., 2009. Effect of mycorrhiza and zinc on some agronomical traits and ear characteristics in maize (KSC704) under drought stress. Proceedings of international conference on energy and environment, 19: 2070-3740.
16. Thalooh, M., Tawfik, M. and Magda, M. H., 2006. A comparative study on the effect of Zinc, Potassium and Magnesium and Magnesium on growth, yield and some chemical constituents of Mungbean plants growth under Water stress conditions. World Jurnal Agric Sci, 2: 37-46.
17. Valadabadi, S.A., Aliabadi, F. H. and Khalvati, M.A., 2009. Evaluation of grain growth of corn and sorghum under K₂O application and irrigation according. Asian journal of agricultural sciences, 1: 19-24.