

ارزیابی اثرات پری بیوتیکی و ویژگی‌های کیفی اینولین استخراج شده از کاسنی غیربومی ایران

منیره نهاردانی^۱، مرضیه حسینی نژاد^{۲*}، امیرحسین الهامی راد^۳

^۱ دانش آموخته‌ی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، سبزوار، ایران

^۲ استادیار پژوهشکده‌ی علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی، مشهد، ایران

^۳ استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، گروه علوم و صنایع غذایی، سبزوار، ایران

تاریخ دریافت: ۱۳۹۱/۶/۱۳ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۱/۲/۲۸

چکیده

اهمیت پری بیوتیک‌ها یا ترکیبات غذایی غیرقابل هضم که به طور انتخابی رشد و فعالیت باکتری‌های پروبیوتیک نظری لاكتوباسیل‌ها و بیفیدوباکتری‌ها تحریک می‌کنند به طور روزافزونی مورد توجه قرار گرفته است. اینولین، یکی از ترکیبات ارزشمند پری بیوتیک است که در سطح تجاری از ریشه‌ی گیاه کاسنی چندساله استخراج می‌گردد. با توجه به این که در ایران، گیاه دارویی کاسنی یکساله و به صورت خودرو رشد می‌یابد ریشه‌ی این گیاه، مناسب استخراج اینولین نمی‌باشد. این پژوهش با هدف استخراج اینولین از گیاه کاسنی چندساله با منشأ غیربومی و مقایسه‌ی اینولین استخراجی با نمونه‌ی اینولین تجاری صورت گرفت. فرآیند تولید، شامل استخراج اینولین طبیعی موجود در ریشه‌ی کاسنی غیربومی با استفاده از انتشار در آب داغ، خالص سازی و تغليظ عصاره بوده و در نهایت، اینولین به وسیله‌ی ترسیب با اتانول بازیابی گردید. اینولین استخراجی از کاسنی غیربومی در مقایسه با اینولین شاهد از درجه‌ی پلیمریزاسیون بالاتری برخوردار بود. افزایش رشد و فعالیت باکتری پروبیوتیک *Lactobacillus casei* و باکتری پاتوژن *Escherichia coli* تحت تاثیر اینولین استخراجی در درصدهای مختلف^{۱، ۲} درصد مورد بررسی قرار گرفته و با اینولین خالص تجاری، گلوکز و فروکتوز مقایسه گردید. نتایج تغییرات جذب سنجه و بررسی رشد و زنده‌مانی سلول‌های باکتریایی نشان داد که سطح ۲ درصد نمونه‌های اینولین در افزایش دانسته‌ی سلولی و افزایش رشد و بقاء (افزایش تقریبی Log ۱) باکتری پروبیوتیک موثرتر بودند، درحالی که سطح ۲ درصد گلوکز و فروکتوز موجب افزایش بیشتر رشد و تکثیر اشرشیاکلی گردید.

واژه‌های کلیدی: پری بیوتیک، اینولین، کاسنی، باکتری پروبیوتیک.

۱- مقدمه

کشورهای پیشرفته دنیا، اینولین تجاری از ریشه‌ی گیاه کاسنی چند ساله و سبب زمینی ترشی استخراج شده و از آن در صنعت غذا به طور گسترده، استفاده می‌گردد (۱۱). برای استخراج اینولین از گیاهان روش‌های مختلفی عنوان گردیده است که از آن جمله می‌توان به استخراج با آب گرم، ترسیب با حلال‌های مختلف مانند اتانول، پروپانول، استون، استونیتیل و استخراج آبی با اعمال امواج فرا صوت اشاره نمود (۱۵ و ۲۲ و ۱۶). در ایران تاکنون چندین برسی در زمینه‌ی استخراج و خالص سازی اینولین از گیاهان بومی صورت گرفته است (۳ و ۴). گیاه کاسنی اگرچه دارای منشاء مدیرانه‌ای است اما امروزه در نواحی مختلف کشور مانند ایشان می‌شود که عمدتاً به شکل یک ساله بوده و به صورت خودرو رشد می‌کند. از کاسنی برای مصارف تغذیه‌ای و تهیه دارو استفاده می‌شود. با این وجود تاکنون اینولین به عنوان یک ترکیب غذایی با ارزش در ایران ناشناخته بوده و یا در مقادیر کم از منابع خارجی تامین می‌گردد.

از آن جا که گیاه یکساله‌ی کاسنی که در ایران به صورت خودرو رشد می‌یابد از ریشه‌های ضخیم مشابه کاسنی چند ساله برخوردار نبوده و به این سبب از میزان اینولین کم تر از کاسنی اروپا برخوردار است نمی‌تواند جهت تولید اینولین مورد بهره برداری و برنامه ریزی‌های تجاری قرار گیرد. لذا در این تحقیق، ارزیابی میزان و ویژگی پری بیوتیکی اینولین استخراج شده از ریشه‌های کاسنی چندساله غیر بومی که بذر خارجی آن جهت انجام تحقیقات زراعی در ایران کشت گردیده، مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، اینولین طی روش رسوب دهی با حلال اتانول از کاسنی دوساله استخراج و با اینولین خالص آزمایشگاهی به عنوان شاهد، مقایسه گردید.

۲- مواد و روش‌ها

برای استخراج اینولین، ریشه‌های کاسنی چند ساله (Cichorium intybus)، که بذر آن قبل از کشور مجارستان تهیه و در مزرعه‌ی تحقیقاتی پارک علم و فناوری خراسان کشت شده بود در زمان برداشت، تهیه گردید.

پری بیوتیک‌ها^۱، اجزای غذایی غیر قابل هضمی هستند که با تحریک انتخابی رشد یا فعالیت تعداد محدودی از باکتری‌های روده‌ی بزرگ می‌توانند سلامت میزان را بهبود بخشنند (۱۲). امروزه، رایج ترین پری بیوتیک‌ها در اروپا، ژاپن و استرالیا، فروکتوالیک‌گوساکاریدها^۲ و اینولین^۳ می‌باشد. اینولین و الیکوفروکتونوها ترکیبات غذایی طبیعی متعلق به یک خانواده از کربوهیدرات‌های شناخته شده تحت عنوان فروکтан‌ها، شامل یک سری از الیکو و پلی ساکاریدهای فروکتون با پیوندهای (۱→۲) β می‌باشند که گلوکز قند انتهایی بیش تر زنجیره‌ها است. آرایش فضایی β در C₂ آنمریک در مونومرهای فروکتون، مانع هضم فروکتان‌ها می‌شود و این، مسؤول کم شدن مقدار کالری آن‌ها و اثرات فیرهای رژیمی آن‌است (۱۶ و ۱۴). اینولین به طور موقت آمیزی به عنوان جایگزین چربی و قند با مزایای مختلف شامل میزان کالری کم تر، غنی سازی با فیرهای غذایی و ویژگی‌های تغذیه‌ای به کار می‌رود (۱۴). اینولین و الیکوفروکتونها از طریق بهبود نظم، افزایش تناوب دفع و حجم مدفعه به بهبود عملکرد روده کمک می‌نمایند (۲۰). در ضمن، مصرف اینولین سبب کاهش تری گلیسریدها و کاهش تولید چربی نیز می‌گردد (۲۰). البته عوامل متعددی از قبیل شرایط محیطی و ویژگی‌های ژنتیکی گیاه بر میزان و کیفیت اینولین استخراجی اثرگذار است (۲). مطالعات مختلف در شرایط آزمایشگاهی و محیطی نشان داده است که رژیم حاوی (۱→۲) β فروکتان (نظیر اینولین و الیکوفروکتونها) رشد یافید و باکترها و لاکتوپاسیلوس‌ها را تحریک نموده، سبب افزایش تولید ویتامین‌های B و K شده و به صورت انتخابی از رشد ارگانیسم‌های پاتوژن به ویژه باکتریوئیدها، فوزوپاکترها و کلستریدیا جلوگیری می‌کند (۹ و ۷).

اینولین در ۱۵٪ از گونه‌های گیاهان گلدار مانند مارچوبه، سیر، تره فرنگی، پیاز، کنگر فرنگی و کاسنی به طور طبیعی موجود بوده و در ضمن توسط برخی از باکتری‌ها و قارچ‌ها نیز تولید می‌شود. دو گونه‌ی مناسب برای تولید اینولین عبارتند از سبب زمینی ترشی^۴ و کاسنی^۵ که در حال حاضر در بسیاری از

¹ Prebiotics

² Fructooligosaccharides(FOS)

³ Inulin

⁴ Jerusalem artichoke(*Helianthus tuberosus*)

⁵ *Cichorium intybus L.*

اندازه گیری شد. در این روش از گلوكز به عنوان استاندارد استفاده و بعد از رسم منحنی استاندارد، میزان قند کل موجود در نمونه، تعیین گردید (۲۴).

برای اندازه گیری pH محلول اینولین استخراج شده، ابتدا محلول ۱۰٪ اینولین در آب تهیه شد و بعد pH این محلول با استفاده از دستگاه pH متر الکترونیکی (Metrohm AG Herisan, Switzerland) اندازه گیری شد (۱۶).

برای اندازه گیری درصد ماده خشک نمونه از روش AOAC 2000a (استفاده شد) (۵). بدین منظور، ۵ گرم نمونه در دمای ۱۰۰°C خشک و با استفاده از فرمول زیر، درصد ماده خشک محاسبه شد:

$$\text{درصد ماده خشک} = \frac{\text{جرم نمونه اولیه}}{\text{جرم نمونه خشک شده}} \times 100$$

برای اندازه گیری خاکستر کل از روش (AOAC, 2000b) استفاده شد (۶). ۵ گرم نمونه در کوره‌ی الکتریکی با دمای ۵۵۰°C سوزانده شد و بعد از رسیدن به وزن ثابت، درصد خاکستر نمونه از روی وزن اولیه‌ی نمونه و وزن خاکستر حاصل طبق فرمول زیر، محاسبه گردید:

$$\text{درصد خاکستر} = \frac{\text{جرم نمونه اولیه}}{\text{جرم خاکستر}} \times 100$$

برای اندازه گیری قند احیا کننده موجود در نمونه‌ها از معروف دی نیتروسالیسیلیک اسید استفاده و مقدار قند احیا کننده نمونه‌ها با استفاده از دستگاه اسپکتروفتو متر در طول موج ۵۷۵nm و با استفاده از استاندارد گلوكز اندازه گیری شد (۱۷).

میانگین درجه‌ی پلیمریزاسیون اینولین استخراج شده از تقسیم درصد وزنی قند کل^۱ بر درصد وزنی قند احیا کننده به دست می‌آید و در تعیین کیفیت اینولین استخراج شده، فاکتور مهمی می‌باشد (۱).

۳-۲- روش‌های میکروبی

جهت به دست آوردن کشت فعال باکتری‌های لاکتو بیاسیلوس کازئی (PTCC NO.: ۱۶۰۸) و اشرشیا کلی (PTCC NO.: ۱۳۳۰)، از آمپول‌های لیو فیلیزه شده تهیه شده از مرکز کلکسیون قارچ‌ها و باکتری‌های صنعتی ایران، ابتدا مقدار ۱۰۰-۴۰۰ ملی‌لتر از محیط کشت استریل اختصاصی هر باکتری به ماده خشک موجود در آمپول افزوده شد و بعد از یکنواخت شدن، سوسپانسیون حاصله به

۲-۱- تهیه‌ی اینولین از عصاره گیاه کاسنی

برای استخراج اینولین، ریشه‌ها بعد از برداشت به منظور حذف آلدگی‌ها با آب سرد شسته و بعد از خشک شدن آب از سطح آن‌ها در دمای ۴۰°C نگه داری شدند.

ریشه‌های کاسنی پس از پوست گیری با ۳ لیتر آب به ازای هر کیلو گرم غده در یک مخلوط کن خرد شده و سوسپانسیون حاصل به مدت یک ساعت در دمای ۸۰-۹۰°C قرار گرفت. پس از صاف کردن عصاره‌ی حاصل، pH سوسپانسیون عصاره با استفاده از محلول هیدروکسید کلسیم ۵ درصد (مرک آلمان) از ۵-۶ به حدود ۱۰-۱۲ رسانده شد. عصاره به مدت نیم ساعت در دمای ۵۰°C قرار گرفته و رسوب حاصل با استفاده از کاغذ صافی جدا گردید. سپس pH عصاره با محلول اسید فسفریک ۱۰ درصد (مرک) به ۸-۹ رسانده و به مدت ۲-۳ ساعت در دمای ۶۰°C نگه داری شد تا رسوب تشکیل گردد. پس از صاف کردن رسوب حاصله با استفاده از کاغذ صافی، عصاره‌ی تصفیه شده با افزودن ۲۰ گرم کربن فعال (مرک) به ازای هر کیلو گرم غده و همزدن شدید در دمای ۶۰°C برای مدت زمان ۱۵-۳۰ دقیقه رنگبری شد و سپس کربن فعال با کاغذ صافی جدا گردید. عصاره‌ی به دست آمده با استفاده از دستگاه تغليظ تحت خلا (Buchiwaterbath

B-480, Switzerland) تا بریکس ۴۲ تغليظ گردید.

به منظور رسوب مواد قندی و اینولین از عصاره‌ی تغليظ شده، محلول اتانول ۹۶ درصد به نسبت ۸ به ۱ به آن افزوده شد. سوسپانسیون حاصله برای ته نشینی کامل رسوب به مدت ۲ روز در دمای ۴۰°C قرار گرفت و سپس، الكل آن جدا گردید. رسوب به Memmert ۸۵۴ (W-Germany) در دمای ۵۰°C نگه داری و درنهایت، رسوب خشک شده آسیاب و وزن آن نسبت به غده‌های اولیه، محاسبه گردید (۱۹).

۲-۲- آفالیز پودر اینولین استخراجی

به منظور اندازه گیری قند کل موجود در نمونه‌ها از روش فنول سولفوریک اسید استفاده شد. به این ترتیب که ابتدا به ۱ میلی لیتر نمونه رقیق شده، ۱ میلی لیتر فنول ۵ درصد افزوده شد. سپس، ۵ میلی لیتر اسید سولفوریک ۹۸ درصد (مرک) به نمونه‌ها اضافه و بعد از گذشت ۲۰ دقیقه، جذب با استفاده از دستگاه اسپکتروفتو متر UV-160A، Shimadzu Japan (۴۹۰nm) در طول موج

^۱Total Sugar

۴-۲- تجزیه و تحلیل آماری

آنالیز آماری داده‌ها به صورت کاملاً تصادفی و با استفاده از آزمون فاکتوریل، توسط نرم افزار SPSS vers 16. از سطح اطمینان ۹۹ درصد صورت گرفت و مقایسه‌ی میانگین‌ها با استفاده از آزمون LSD توسط نرم افزار Statisticxvers.8 در همین سطح اطمینان انجام شد.

۳- نتایج و بحث

۳-۱- ویژگی اینولین‌های استخراج شده

اینولین استخراج شده از گیاه کاسنی غیر بومی دو ساله به صورت پودر سفید رنگ، بدون شیرینی، بی بو و فاقد طعم نامطلوب یا ته مزه خاص بوده و حلالیت آن در آب سرد پایین تراز آب گرم بود (تقریباً ۵٪ حلالیت در دمای اتاق). نتایج آنالیز اینولین استخراج شده به همراه اینولین شاهد در جدول ۱، آورده شده است. با توجه به داده‌های به دست آمده مشاهده گردید که بین هر دو نمونه اینولین، اختلاف آماری معنا داری در مقدار کربوهیدرات کل وجود داشت ($P < 0.01$). هچنین، نمونه‌ها در مقدار قند احیا از نظر آماری اختلاف معنی داری داشتند ($P < 0.01$) که مقدار قند احیا در نمونه‌ی شاهد بیش تراز اینولین استخراجی از کاسنی دو ساله بود.

مقدار ماده‌ی خشک موجود در اینولین استخراجی از گیاه کاسنی دو ساله و اینولین تجاری اختلاف معناداری با یکدیگر داشتند. همچنین، تیمارها در مقدار خاکستر اختلاف معنا داری را دارا بودند که خاکستر مربوط به نمونه اینولین استخراجی از نمونه‌ی شاهد بالاتر بود ($P < 0.01$). pH مربوط به محلول ۱۰٪ تهیه شده از اینولین استخراجی بالاتر از pH محلول اینولین شاهد بود (جدول ۱).

مقدار اینولین موجود در اعضای خانواده‌ی کامپوزیته نظیر کاسنی در دامنه‌ی کم تراز ۱ تا ۲۰٪ نسبت به وزن گیاه تازه وجود دارد و بدون توجه به ساختمان اینولین (خطی یا انشعاب دار) طول زنجیره نیز متفاوت است (۱۴). از آن جا که میزان اینولین استخراجی برابر است با تفاضل قند احیا از قند کل به دست آمده، در نتیجه، مشاهده شد که مقدار اینولین نمونه‌ی شاهد (٪ ۸۹/۷۲۵) نسبت به اینولین استخراجی از کاسنی دو ساله (٪ ۸۰/۴۵۷) بیش تر بود.

۲۰ ml محیط کشت مایع منتقل گردید و در دما و شرایط مناسب آن سویه نگه داری شد.

۳-۲- بررسی قابلیت رشد و تکثیر باکتری‌ها

جهت انجام تحقیقات برای بررسی قابلیت افزایش رشد نژاد پروپیو تیک لاکتو بیاسیلوس کازئی و نژاد پاتوژن اشرشیا کلی توسط پودر اینولین استخراجی، سطح‌های ۱، ۰ و ۲ درصد (W/V) از نمونه‌های اینولین استخراجی، اینولین تجاری (شاهد) و مونوساکاریدهای گلوکز و فروکتوز در محیط براث پایه (de Man Rogosa and Sharpe MRS) برای لاکتو بیاسیلوس و نوترینت براث برای اشرشیا کلی حل شدن و سپس، برای ۱۵ min در ۱۲۱ °C اتوکلاو گردیدند (۲۵). بعد از آماده شدن محیط کشت، مقدار ۱ ml (۱۰٪) از کشت فعال هر باکتری با $^1OD = 1$ به ۱۰ ml از محیط کشت‌های تهیه شده اضافه گردید و در شرایط مناسب برای یک شب انکوبه گذاری شد. در پایان دوره‌ی انکوبه گذاری، میزان رشد و تکثیر باکتری‌ای با اندازه گیری OD در nm به دست آمد (۱۳ و ۲۵).

۳-۳-۱- بررسی رشد و زنده مانی باکتری‌ها

بررسی رشد و زنده مانی باکتری لاکتو بیاسیلوس کازئی و باکتری اشرشیا کلی از طریق شمارش سلول‌های زنده باکتری‌ای، روی پلیت^۲ در محیط آگاردار صورت گرفت. برای این منظور، ۱ میلی لیتر از رقت تهیه شده از کشت‌های باکتری‌ای به پلیت منتقل گردید. بعد از گذشت دوره‌ی انکوباسیون مناسب برای هر گونه باکتری‌ای (۴۸ ساعت برای لاکتو بیاسیلوس کازئی و ۲۴ ساعت برای اشرشیا کلی)، شمارش کلی‌های ظاهر شده بر سطح پلیت صورت گرفت (۱۸).

۳-۳-۲- اندازه گیری pH کشت‌های باکتری‌ای

pH کشت‌های باکتری‌ای به وسیله‌ی pH متر در دمای ۲۰ °C اندازه گیری شد (۱۸).

¹ Optical Density

² Viable count

۲-۳- بررسی رشد و تکثیر باکتری‌های مورد آزمون

۱-۲-۳- اثر نوع و مقدار کربوهیدرات

در بررسی اثر نوع کربوهیدرات بر دانسیته‌ی سلولی کشت‌های باکتریایی مشخص شد که بیش ترین مقدار دانسیته‌ی سلولی برای باکتری کازئی ابتدا بر روی اینولین استخراجی از کاسنی دو ساله و پس از آن بر روی اینولین تجاری و با اختلاف معنادار با هم به دست آمد ($P<0.01$). باکتری/اشرشیاکلی، بیش ترین افزایش در دانسیته‌ی سلولی را بر روی گلوکز و بعد از آن بر روی فروکتوز نشان داد (شکل ۱).

افزودن درصدهای مختلف کربوهیدرات، اثر معناداری ($P<0.01$) را بر بیومس کشت‌های باکتریایی داشت، به طوری که کشت‌های حاوی سطح ۲ درصد قند افزوده شده، بالاترین دانسیته‌ی سلولی را نشان دادند (شکل ۱). بدین ترتیب، مشاهده شد که روند تغییرات OD در مورد هر دو باکتری، در درصدهای مختلف کربوهیدرات، مشابه و افزایشی بود.

اثر رقابتی مصرف اینولین در مقایسه با گلوکز و فروکتوز که قندهای ساده ای هستند، قابل توجه بود. گلوکز با توجه به دریافت سریع، قابلیت بهره‌گیری مناسب، تبدیل انرژی سلولی^۱ و اندازه‌ی مولکول آن به عنوان منبع اصلی کربن برای کلیه‌ی میکروارگانیسم‌ها شناخته شده است. با این حال، برخی باکتری‌ها با داشتن یک مکانیسم آنزیمی پیچیده به خوبی قادر به بهره‌گیری از کربوهیدرات‌های پیچیده جهت رشد و فعالیت‌های حیاتی خود می‌باشند (۲۵).

در باکتری پروپیوتیک کازئی، سطح ۲ درصد از هر دو اینولین، بالاترین اثر افزایشی در OD ایجاد کرده بود، درحالی که در همین سطح، مونوساکاریدهای گلوکز و فروکتوز به میزان کم تر و با اختلاف معنادار با آن‌ها اثر گذار بودند. این مساله برای/اشرشیاکلی کاملاً متفاوت بود و مونوساکاریدهای آزمون شده در تمام سطوح، بالاترین رشد را باعث شدند.

با توجه به تحقیقی که پینگ سو و همکاران^۲ (۲۰۰۷) انجام دادند و اثر پری بیوتیک‌های تجاری را روی نژادهای پروپیوتیک، با اندازه‌ی گیری OD طی دوره زمانی ۴۸ ساعت بررسی کردند مشخص گردید که لاکتوپاسیلوس کازئی L26، حداکثر رشد را به ترتیب روی ۱/۵ درصد فروکتوالیگوساکاریدها، اینولین (با

میانگین درجه‌ی پلیمریزاسیون برای نمونه‌ی اینولین کاسنی دو ساله ۴۱/۹۸ و برای اینولین شاهد ۲۴/۰۳ محاسبه گردید. از آن جا که اینولین، مخلوط ناهمگنی از اولیگومرها با DPهای مختلف است، ویژگی نمونه‌های اینولین با میانگین درجه‌ی پلیمریزاسیون یا DPn تعیین می‌گردد. حداکثر درجه‌ی پلیمریزاسیون در اینولین گیاهی تقریباً پایین (کم تر از ۲۰۰) می‌باشد که این حداکثر درجه و میانگین آن بستگی به عوامل متعدد از جمله نوع گیاه، شرایط آب و هوایی و سن فیزیولوژی گیاه دارد (۲۹). در حقیقت، علت تفاوت در DP اینولین استخراج شده مورد آزمون با اینولین شاهد نیز به تفاوت در موارد ذکر شده مربوط می‌باشد. تفاوت در DPn بین اینولین‌های مختلف، منجر به تفاوت‌های مشخص در ویژگی‌های کیفیتی و عملکرای آن‌ها می‌گردد. اینولین‌های با زنجیره طولانی از حلالیت کم تری برخوردار بوده و وقتی در آب یا شیر پخش شوند باعث تشکیل میکروکریستال‌های اینولین می‌گردند. این کریستال‌ها به طور مشخص در دهان، قابل حس نیستند ولی در تشکیل یک بافت خامه ای نرم و ایجاد یک حس دهانی مشابه چربی، دخالت دارند (۱۶).

اینولین استخراجی از کاسنی دو ساله در مقایسه با اینولین شاهد از ارزش DPn بالایی برخوردار بود. بلوری (۱۳۸۷) در تحقیق خود بر روی استخراج اینولین از گیاه سیب زمینی ترشی به درجه‌ی پلیمریزاسیونی برابر با ۲۶/۳۱ دست یافت که ارزش DPn محصول بالاتر بود (۱). درجه‌ی پلیمریزاسیون بالای این اینولین خواص آن را جهت استفاده در صنایع غذایی مناسب تر می‌سازد. به طور نمونه، اینولین در صورت استفاده به عنوان جایگزین چربی با آب یا هر نوع محلول آبکی مخلوط شده و تشکیل یک شبکه‌ی ژل مانند با ساختار خامه ای می‌دهد که قابل پخش و مالش پذیر بوده و می‌تواند در محصولات غذایی جایگزین چربی گردد (۱۱). همچنین، اینولین در ترکیب با عوامل ژل دهنده نظیر ژلاتین، آلرینات، کاراگینان و مالتودکسترین خصوصیات امولسیونی محصولاتی نظیر بستنی، سس و دسرها را بهبود بخشیده و می‌تواند در این محصولات غذایی به عنوان پایدارکننده، مورد استفاده قرار گیرد. این ویژگی‌ها مستلزم داشتن درجه‌ی پلیمریزاسیون بالا در زنجیره‌ی اینولین می‌باشد (۱۱).

¹Cellular energy conversion

²Ping Su et al.

با توجه به روند افزایشی OD از صفر تا ۲ درصد، در کشت باکتری اشرشیاکلی، به نظر می‌رسد که تعدادی از سلول‌ها در سطح ۲ درصد از بین رفته باشند. به عبارت دیگر، رشد زیاد باکتری‌ها در این سطح و به موجب آن کاهش شدید در ترکیبات غذایی محیط کشت و کاهش زیاد pH در نتیجه، تجمع اسید لاکتیک حاصل از رشد و فعالیت‌های متابولیکی باکتری‌ها در محیط، روند معکوس در زنده مانی باکتری‌ها داشته و تعداد سلول‌های زنده را با کاهش شدید مواجه کرده است. بنابراین، می‌توان عنوان کرد افزایش کربوهیدرات به محیط کشت تا سطح مشخصی می‌تواند تعداد سلول زنده‌ی محیط را افزایش دهد (۲۱). طبق یافته‌های فوکس و گیبسون^۶ (۲۰۰۲) pH پایین (۳ و زیر آن)، رشد اشرشیاکلی را به طور کامل متوقف می‌کند (۱۰). بدین ترتیب، بیشترین افزایش در تعداد سلول زنده‌ی باکتری اشرشیاکلی بر روی سطوح ۱ درصد قند فروکتوز مشاهده گردید.

- ۴-۳- برسی pH کشت‌های باکتریایی
- ۴-۳-۱- اثر متقابل نوع و میزان کربوهیدرات

اسیدهای آلی علاوه بر اثر بازدارندگی بر روی باکتری‌های پاتوژن، نقش مهمی در سلامت روده‌ی بزرگ انسان ایفا می‌کنند (۸). از هر دو نظر، تولید اسیدهای آلی به وسیله‌ی بیفیدوباکترها و لاکتوپاسیلوس‌ها بسیار مهم است.

در بررسی روند تغییرات pH در باکتری کازئی رشد داده شده بر روی سطح‌های مختلف ۴ کربوهیدرات مورد آزمون ملاحظه گردید که سطح ۲ درصد اینولین استخراجی توانسته است کم ترین مقدار pH را نسبت به سطح ۲ درصد سایر کربوهیدرات‌ها، ایجاد کند (شکل ۲). با توجه به روند OD که بیشترین جذب در سطح ۲ درصد این کربوهیدرات‌ها خوانده شد، به نظر می‌رسد نتایج به دست آمده، صحیح باشند (شکل ۱).

فوكس و گييسون⁷ (۲۰۰۲) گزارش کردنده که ميزان اسيد توليدی به وسیله‌ی يك باكتري بستگی به منيع کربن در دسترس آن دارد. به عنوان مثال، لاكتوباسيلوس پلاتاروم در حضور نشاسته و تركيب فروكتواليكوساكاريد با اينولين مقدار mM ۱۷-۱۲ لاكتات و در نتيجه‌ی تخمير فروكتواليكوساكاريد و تركيب فروكتواليكوساكاريد با گريلواليكوساكاريد مقدار mM ۲۵-۲۰ لاكتات توليد كرد.

میانگین درجهٔ پلیمریزاسیون (۲۲) و گلوکن داشت که با نتایج به دست آمده از تحقیق ما مشابه بود (۲۵). طبق گزارش وانگ و گیسون^(۱۹۹۳)، شرشیاکلی OD بالاتری را در تخمیر گلوکن نسبت به الیگوفروکتوزهای کاسنی نشان داد که با نتایج به دست آمده، مطابقت دارد (۲۸).

- ۳-۳ برسی قابلیت رشد و زندگانی
- ۳-۱ اثر نوع و میزان کربوهیدرات

بیش ترین افزایش لگاریتم رشد در باکتری کازائی در حضور اینولین تجاري به دست آمد که بین این کربوهیدرات با اینولین استخراجی از نظر آماری اختلاف معناداری وجود داشت (جدول ۲). موثرترین کربوهیدرات در افزایش لگاریتم (P<۰/۰۱) رشد سلول های زنده باکتری اشرشیاکلی، فروکتوز بود (جدول ۳). به نظر می رسد اشرشیاکلی در استفاده از مونوساکاریدها نسبت به اینولین های بلند زنجیر موفق تر باشد. به عبارتی، اینولین کاسنی دو ساله و یک ساله با درجه هی پلیمریزاسیون بالا شرایط را برای تغذیه اشرشیاکلی سخت می کنند.

بر طبق تحقیقات فوکس و گیسون^۲ (۲۰۰۲)، اشرشیاکلی مونوساکاریدها را بسیار بهتر از فروکتوالیگوساکاریدها، اینولین، گزیلوالیگوساکاریدها، لاکتولوز^۳، لاکتیول^۴، نشاسته و دکستربن^۵ مورد تخمیر قرار می‌دهد (۱۰). همچنین، شارپ و همکاران^۶ (۲۰۰۱) اعلام کردند که فروکتوز بهتر از فروکتوالیگوساکاریدها به وسیله‌ی اشرشیاکلی مصرف می‌شود که با نتایج به دست آمده در این تحقیق، مطابقت دارد (۲۳).

افزایش رشد و زنده مانی سلول های باکتریایی در حضور سطوح مختلف کربوهیدرات به این ترتیب بود که در باکتری لاکتوباسیلوس کازئی روند افزایشی تا سطح ۲ درصد به طور معنادار ادامه پیدا کرد ($P < 0.01$). در باکتری اشرشیا کلی، روند افزایش لگاریتم رشد سلول های زنده، تا سطح ۲ درصد هر دو اینولین مشاهده شد، اما با افزایش درصد قند از ۱ تا ۲٪، برای قندهای ساده‌ی گلوکز و فروکتوز، نمودار لگاریتم رشد دارای روند کاهشی بود. البته این روند در مورد گلوکز شدیدتر بود ($P < 0.01$).

¹Wang & Gibson

Wang & Gibson
^Fooks & Gibson

³ Lactulose

⁴Lactitol


5 Sharp et al.

⁶ Fooks and Gibson
⁷ Fooks and Gibson

جدول ۱- نتایج آنالیز کمی و کیفی اینولین‌های استخراج شده و اینولین استاندارد

فناوری‌های مورد بررسی (شاهد)	کاسنی دو ساله	میانگین درجه پلیمریزاسیون
۲۴/۰۳	۴۱/۹۸	
پودر کرمی رنگ	پودر سفید رنگ	وضعیت ظاهری
۹۳/۵۷۵ ± ۰/۱۴۵ ^a	۸۲/۴۱۷ ± ۰/۴۶۶ ^{b*}	٪ کربوهیدرات کل
۳/۸۵ ± ۰/۰۴۳ ^a	۱/۹۶ ± ۰/۱۸۷ ^b	٪ قند احیا
~۸۹/۷۲۵	~۸۰/۴۵۷	٪ اینولین و الیگوفروکتوز
۹۰ ± ۰/۵۸۶ ^b	۹۵/۳۲ ± ۰/۴۵ ^a	٪ ماده خشک
~۰/۰۵ ± ۰/۰۲ ^b	۵/۱۹ ± ۰/۱۵ ^a	٪ خاکستر
۵/۹۷ ± ۰/۰۶ ^b	۶/۶۵ ± ۰/۰۵ ^a	٪ محلول pH

* کمیت‌های دارای حروف غیرمشترک لاتین در هر ردیف از لحاظ آماری تفاوت معناداری با یکدیگر دارند (آزمون LSD). مقادیر همراه با اختلاف میانگین سه تکرار ذکر شده اند.



شکل ۱- روند تغییرات رشد و تکثیر سلولی باکتری‌های لاکتوباسیلوس کازئی و اشرشیاکلی در محیط کشت حاوی انواع و سطوح‌های مختلف کربوهیدرات (CICP: اینولین استخراجی، CLIP: اینولین تجاری، Fru: گلوکز، Glu: فروکتوز) در طی دوره‌ی زمانی ۲۴ ساعت (میانگین‌های دارای حروف مشترک درسطح ۱٪ تفاوت معناداری ندارند).

جدول ۲- تغییرات لگاریتم رشد لاکتوباسیلوس کازئی در MRS برواث اصلاح شده با سطوح‌های مختلف دو اینولین و دو منوساکارید

نوع کربوهیدرات	غلظت کربوهیدرات (%)	شمارش باکتریایی (mlCFUlog)
CIIP	۰ (کنترل)	۸/۴۹۰ ± ۰/۳۶ ^e
	۱	۸/۷۷۳ ± ۰/۲۱ ^d
	۲	۹/۱۷۸ ± ۰/۹۸ ^b
CICP	۰ (کنترل)	۸/۴۹۰ ± ۰/۳۶ ^e
	۱	۹/۰۳۹ ± ۰/۹ ^c
	۲	۹/۴۴۲ ± ۰/۴ ^a
Glu	۰ (کنترل)	۸/۴۹۰ ± ۰/۳۶ ^e
	۱	۸/۵۷۸ ± ۰/۶۴۶ ^c
	۲	۹/۱۷۱ ± ۰/۸۲ ^b
Fru	۰ (کنترل)	۸/۴۹۰ ± ۰/۳۶ ^e
	۱	۸/۶۹۵ ± ۰/۲۲ ^d
	۲	۹/۱۸۹ ± ۰/۳۳ ^b

میانگین‌ها دارای حروف مشترک در سطح ۱٪ تفاوت آماری ندارند. مقادیر همراه با S.D. سه تکرار ذکر شده‌اند.

CIIP: اینولین استخراجی، CICP: اینولین تجاری، Glu: گلوکز، Fru: فروکتوز

جدول ۳- تغییرات لگاریتم رشد باکتری اشرشیاکلی در نوترینت برواث اصلاح شده با سطوح‌های مختلف دو اینولین و دو منوساکارید

نوع کربوهیدرات	غلظت کربوهیدرات (%)	شمارش باکتریایی (mlCFUlog)
CIIP	۰ (کنترل)	۱۰/۵۰۵ ± ۰/۲۷ ^f
	۱	۱۰/۸۵۳ ± ۰/۵۸ ^e
	۲	۱۱/۱۳۷ ± ۰/۵۹ ^c
CICP	۰ (کنترل)	۱۰/۵۰۵ ± ۰/۲۷ ^f
	۱	۱۰/۹۵۹ ± ۰/۴۷ ^d
	۲	۱۱/۳۳۹ ± ۰/۴ ^b
Glu	۰ (کنترل)	۱۰/۵۰۵ ± ۰/۲۷ ^f
	۱	۱۱/۳۵۴ ± ۰/۲۱ ^b
	۲	۱۰/۸۱۵ ± ۰/۲۷ ^e
Fru	۰ (کنترل)	۱۰/۵۰۵ ± ۰/۲۷ ^f
	۱	۱۱/۴۹۲ ± ۰/۲۲ ^a
	۲	۱۱/۳۳۹ ± ۰/۲۲ ^b

میانگین‌ها دارای حروف مشترک در سطح ۱٪ تفاوت آماری ندارند. مقادیر همراه با S.D. سه تکرار ذکر شده‌اند.

CIIP: اینولین استخراجی، CICP: اینولین تجاری، Glu: گلوکز، Fru: فروکتوز

در تمام موارد عنوان شده در قسمت‌های قبل به نظر می‌رسد علاوه بر میزان رشد باکتری که بر روی pH اثرگذار است، نوع سوبستوای مورد استفاده هم در میزان کاهش pH موثر باشد (۲۷).


۴- نتیجه گیری

ترکیب پری بیوتیک استخراج شده از کاسنی غیربومی در تقویت رشد لاکتوپلیاسیلوس کازئی موفق تر از منوساکاریدهای مورد بررسی و اینولین تجاری بود. این در حالی است که منوساکاریدهای گلوکز و فروکتوز در بالا بردن رشد/شرشیاکلی موثرتر بودند.


بررسی سطح‌های مختلف کربوهیدرات‌های اضافه شده به محیط کشت نشان داد که اثر آن‌ها در رشد و زندگانی نژادهای باکتریایی متفاوت است به طوری که در باکتری لاکتوپلیاسیلوس کازئی، جمعیت باکتریایی قابل شمارش در سطح ۲٪ همه کربوهیدرات‌ها حداکثر بود. در باکتری اشرشیاکلی، سطح ۱٪ منوساکاریدهای بیش ترین اثر را در رشد و بقاء سلول زنده باعث شد و در مورد اینولین‌ها، سطح ۲٪ موثرتر بود. نتایج حاصل از این تحقیق، نشان می‌دهد که کاسنی غیربومی ایران می‌تواند به عنوان منبع با ارزشی از اینولین موردنمود بهره برداری قرار گیرد. در این خصوص، مطالعات زراعی به منظور جایگزینی کاسنی دوساله با کاسنی بومی یکساله جهت دستیابی به اینولین با ویژگی‌های پری بیوتیکی با ارزش تر پیشنهاد می‌گردد.

۵- منابع

- ۱- بلوردی، م. ۱۳۸۷. تولید کامبوجا با استفاده از عصاره‌ی گیاهان حاوی اینولین، پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشکده‌ی مهندسی بیوپردازی، دانشگاه تهران.
- ۲- زرگری، ع. ۱۳۷۱. گیاهان دارویی. جلد سوم، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، صفحه‌ی ۸۹۰
- ۳- فخر رنجبری، ح. ۱۳۷۷. بررسی مواد موثرهای کاسنی (*L. Cichoriumintubes*). وزارت جهاد سازندگی، مرکز تحقیقات دارویی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام جهادسازندگی استان آذربایجان غربی، گروه گیاهان دارویی، کد طرح ۰۳۱۰۰۱۰۰۰-۰۳۶.
- ۴- کوثری، ا. ۱۳۷۲. استخراج و خالص سازی اینولین از گیاهان بومی ایران. مرکز تحقیقات دارویی، تهران.



شکل ۲- روند تغییرات pH باکتری لاکتوپلیاسیلوس کازئی در محیط کشت حاوی انواع و سطوح مختلف کربوهیدرات در طی دوره‌ی زمانی ۲۴ ساعت.



شکل ۳- روند تغییرات pH باکتری اشرشیاکلی در محیط کشت حاوی انواع و سطوح مختلف کربوهیدرات در طی دوره‌ی زمانی ۲۴ ساعت

همچنین این محققین، عنوان نمودند که فروکتوالیگوساکارید و ترکیب فروکتوالیگوساکارید با گزیلوالیگوساکارید، سطح بالاتری از استات را (۲۰-۳۰ mM) بعد از ۲۴ ساعت تولید کردند (۱۰). روند تغییرات pH در باکتری اشرشیاکلی بر روی دو منوساکارید به این ترتیب بود که در سطح ۱ درصد این دو قند کاهش شدید pH ملاحظه گردید و بعد از آن تا سطح ۲ درصد مقدار pH تقریباً ثابت باقی ماند که با توجه به روند رشد باکتری بر روی گلوکز و فروکتوز، نتیجه به دست آمده توجیه پذیر است (شکل ۳). تغییرات pH/اشرشیاکلی بر روی اینولین‌ها مطابق با نتایج به دست آمده از میزان رشد این باکتری بر روی آن‌ها بود به این ترتیب که رشد کم تر باکتری بر روی این کربوهیدرات‌ها باعث کاهش کم تر pH شده بود.

- artichoke fructans with ethanol using response surface methodology. *Journal of Food Chemistry*, 104 : 73-80.
- 20- Roberfroid, M. B. 2005. Inulin-type fructans: functional food ingredients. New York: CRC Press.
- 21- Roberfroid, M. B., Van Loo, J. A. E. and Gibson, G. R. 1998. The bifidogenic nature of chicory inulin and its hydrolysis products. *Journal of Nutrition*, 128:11-19.
- 22- Saengthongpinit, W. and Sajjaanantakul, T. 2005. Influence of harvest time and storage temperature on characteristics of inulin from Jerusalem artichoke tubers. *Post Harvest Biology and Technology*, 37: 93-100.
- 23- Sharp, R., Fishbain, S. and Macfarlane, G.T. 2001. Effect of short- chain carbohydrates on human intestinal bifidobacteria and *Escherichia coli* in vitro. *Journal of Microbial*, 50: 152-160.
- 24- Southgate, D. A. T. 1991. Determination of food carbohydrates. 2nded. New York: Elsevier Science Publishers Ltd. pp 232.
- 25- Su, P., Henriksson, A. and Mitchell, H. 2007. Selected prebiotics support the growth of probiotic mono-cultures in vitro. *Food Microbiology Anaerobe*, 13 :134–139.
- 26- Suzuli, M. 1993. History of fractan research. Rose to Edelman, in: Science and Technology of Fructans, Suzuki, M. and Chatterton, N.J. CRC Press, Boca R aton, FL. pp: 21-39.
- 27-Wada, K.1990. In vitro fermentability of oligofructose and inulin by some species of human intestinal flora. Technical report by calpis intestinal flora laboratory, available from ORAFTI, aandorenstraat ,1-B3300 ,Tienen, Belgium.
- 28- Wang, X. and Gibson, G. R. 1993. Effects of the in vitro fermentation of oligofructose and inulin by bacteria growing in the human large intestine. *Journal of applied eacteriology* ,75: 373-380.
- 5- AOAC. 2000a. *Official methods of analysis*. Method 990.20. Determination of solids by direct forced air oven drying method . 17th ed. Washington DC: AOAC.
- 6- AOAC. 2000b. *Official methods of analysis*. Method 945.46. Determination of ash by gravimetric method . 17th ed. Washington DC:AOAC.
- 7- Bortnowska, G. and Makiewicz, A.2006. Technological utility of sugar gum and xanthan for the production of low fat inulin enriched mayonnaise. *ACTA Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria*. 5(2): 135-146.
- 8- Cook, S. I., and Sellin, J. H.1998. Short chain fatty acids in health and disease. *Alimentary Pharmacology and Therapeutics*, 12: 499–507.
- 9- Coussemant, P. 1995. Pre-and synbiotics with inulin and oligofructose. *Food Technology Europe*, January,102-104.
- 10- Fooks, L. J. and Gibson, G. R.2002. In vitro investigations of the effect of probiotics and prebiotics on selected human intestinal pathogens. *FEMS Microbiology Ecology*,39:67-75
- 11- Frank, A. M. E. 2000. Inulin and oligofructose. In: Gibson, G. Angus,F. editors. *LFRA Ingredient Handbook: Prebiotics and Probiotics*. Surrey: Leatherhead Publishing. P 1-18.
- 12- Gibson, G.R. and Roberfroid, M. B. 1995. Dietary modulation of the human colonic microbiota; introducing the concept of prebiotics. *Journal of Nutrition*, 125:1401-1412.
- 13- Huebner,J., Wehling, R. L. and Hutkins, R.W. 2007. *Functional activity of commercial prebiotics*. *International Dairy Journal*, 17: 770–775
- 14- Kaur, N. and Gupta, A.K. 2002. Application of inulin and oligofructose in health and nutrition. *Journal of Bioscience*, 27: 703-714.
- 15- Lingyun, W. Jianhua, W. Xiaodong, Z.H. Da, T. Yalin, Y. Chenggang, C. Tianhua, F and Fan, Z. H. 2007. Studies on the extracting technical conditions of inulin from Jerusalem artichoke tubers. *Journal of Food Engineering* , 79:1087-1093.
- 16- Lopez-Molina, D., Navarro-Martinez, M. D., Rojas-Melgarejo, F., Hiner, A. N., Chazarra, S., and Rodriguez-Lopez, J. N. 2005. Molecular properties and prebiotic effect of inulin obtained from artichoke. *Phytochemistry*, 1476-1484.
- 17- Miller, G.L. 1959. Use of dinitrosalicylic acid reagent for determination of reducing sugar. *Annual Chemistry*, 31:426-430.
- 18- Paseephol,T. and Sherkat, F.2009. Probiotic stability of yoghurts containing Jerusalem artichoke inulins during refrigerated storage. *Journal of Functional Foods*, 1: 311-318
- 19- Paseephol, T., Small, D., Sherkat, F.2007. Process optimisation for fractionating Jerusalem