

اثر تراکم بوته بر ضریب استهلاک نوری، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سورگوم دانه ای

محمدرضا بوربور*، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
سعید سیف زاده، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، گروه کشاورزی، تاکستان، ایران
داود ارادتمند اصلی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه، گروه کشاورزی، ساوه، ایران

چکیده

این آزمایش در سال ۱۳۸۶ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در ۴ تکرار اجرا گردید. سه رقم اسپیدفید، جامبو و کیمیاو سه سطح تراکم ۱۳۰، ۱۵۰ و ۱۹۰ هزار بوته در هکتار به صورت فاکتوریل مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اثر تراکم بر تعداد دانه در خوشه، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و ضریب استهلاک نوری از نظر آماری در سطح ۱٪ معنی دار بود. بیشترین عملکرد دانه ۲۸۳۸ کیلوگرم در هکتار به تراکم کاشت ۱۹۰ هزار بوته در هکتار تعلق داشت. با افزایش تراکم تعداد دانه در خوشه و وزن هزار دانه به طور معنی داری کاهش نشان دادند. ارقام مورد بررسی از نظر تعداد دانه در خوشه، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و ضریب استهلاک نوری با هم اختلاف معنی داری داشتند. فاصله بیشترین و کمترین تعداد دانه در خوشه به ترتیب در رقم جامبو و کیمیا وجود داشت. بیشترین ضریب استهلاک نوری مربوط به تراکم ۱۹۰ هزار بوته در هکتار و رقم جامبو به میزان ۰/۵۵ و کمترین ضریب استهلاک نوری مربوط به تراکم ۱۳۰ هزار بوته در هکتار و رقم اسپیدفید به میزان ۰/۴۷ می باشد. در نهایت بیشترین عملکرد دانه مربوط به تراکم ۱۹۰ هزار بوته در هکتار و رقم جامبو بود.

واژه های کلیدی: تراکم، سورگوم، رقم، ضریب استهلاک نوری و عملکرد دانه

* نویسنده مسئول: E-mail: m.r.bb@yahoo.com

مقدمه

از جمله روش های مؤثر در به زراعی، انتخاب بهترین روش کاشت، تراکم بوته در هکتار و شناسایی ارقام پرمحصول می باشد که می تواند گام مؤثری در افزایش عملکرد تولید محصولات زراعی باشد. هوم و کباده (۲۰۰۱) با دو رقم هیبرید سورگوم دانه ای در دو سال آزمایش نشان دادند که با افزایش تراکم بوته از ۷۵ به ۴۵۰ هزار بوته در هکتار عملکرد دانه بطور خطی افزایش یافت. جوانمرد (۱۳۷۵) طی بررسی اثر تراکم های کاشت بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد سورگوم دانه ای گزارش نمود که از اجزاء عملکرد دانه تعداد پانیکول در مترمربع تحت تأثیر تراکم قرار گرفت، به طوری که با افزایش تراکم تعداد پانیکول در واحد سطح افزایش یافت و منجر به ایجاد حداکثر عملکرد دانه شد. مختارزاده (۱۳۷۹) طی بررسی اثر تراکم و نحوه کاشت بر اجزاء عملکرد سورگوم دانه ای گزارش نمود که تعداد دانه در پانیکول با افزایش تراکم بوته در واحد سطح به طور معنی داری کاهش می یابد. واتیکی (۱۹۹۷) در بررسی تغییرات جذب نور در کشت سورگوم گزارش نمودند که افزایش جذب نور باعث افزایش تولید زیست توده یا عملکرد بیولوژیکی پیش از زمان پر شدن دانه به خصوص در تراکم کمتر شده است. استیکلر (۲۰۰۱) گزارش کردند که فاصله ردیف و تراکم، اثر معنی داری بر شاخص برداشت نداشته است، هر چند مقدار تشعشع موجود در سطح زمین در ردیف هایی با فاصله زیاد، اندکی بیشتر بود، ولی عملکرد حاصل به طور معنی داری تحت تأثیر تراکم قرار نگرفت. افزایش تراکم گیاهی در ذرت را باعث افزایش شاخص سطح برگ و ازدیاد سطح ویژه برگ قلمداد کردند (۸).

زمانی و کوچکی (۱۳۷۳) در مطالعه اثر روش و تراکم کاشت بر جذب تشعشع و اجزاء عملکرد ذرت دانه ای گزارش نمودند که روش کاشت بر جذب تشعشع اثر معنی داری نداشت. بهشتی (۱۳۷۲) گزارش نمود که در سورگوم اثر تراکم بر تعداد دانه در پانیکول معنی دار بود و بیشترین تعداد دانه در پانیکول در تراکم ۵/۶ بوته در مترمربع به تعداد ۴۰۵۳ دانه به دست آمد که تفاوت معنی داری با دو تراکم ۱۱/۸۱ و ۲۲/۲۲ بوته در مترمربع داشت. همچنین ایشان اظهار کردند که اثر تراکم بر روی اجزاء عملکرد به خصوصی مانند تعداد پانیکل و دانه در هر بوته مهمتر از وزن دانه بوده است. استاینر (۱۹۹۹) در مطالعات خود در دو فاصله ردیف ۳۷ و ۷۶ سانتی متر و سه تراکم ۱۸، ۱۲ و ۶ بوته در متر مربع در سورگوم دانه ای دریافت که در فاصله ردیف باریک تر و تراکم بالاتر میزان تشعشع فعال فتوسنتزی PAR بیشتری روزانه وارد سایه انداز گیاهی می شود. ضریب استهلاک نور یا کاهش تشعشع مفهومی است که بیانگر میزان نفوذ نور در داخل کانوپی می باشد، به طوری که هر چه برگ های بالایی کانوپی زاویه کمتری با ساقه داشته باشند، k کمتر و هر چه برگ ها افقی تر باشند، k بیشتر خواهد بود (۴).

فلینت (۱۹۹۶) نشان داد با افزایش فاصله ردیف از ۳۵ به ۱۰۰ سانتی متر ضریب زوال نور به طور معنی داری کاهش (۰/۳۸) یافت که این امر نشان دهنده کارایی بیشتر دریافت نور در فاصله ردیف باریک و تراکم بیشتر است. این محققان بهبود کارایی دریافت نور در فاصله ردیف باریک را نتیجه توزیع یکنواخت تر بوته ها و در نتیجه شاخ و برگ می دانند.

مواد و روش ها

این آزمایش در سال زراعی ۸۶-۱۳۸۵ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه اجرا گردید. شهرستان ساوه در طول جغرافیایی ۵۰ درجه و ۲۰ دقیقه و ۴۳ ثانیه و عرض ۳۵ درجه و یک دقیقه شمالی قرار داشته و میانگین ارتفاع آن از سطح دریا در حدود ۱۰۳۰ متر می باشد. میانگین بارندگی سالیانه در ساوه ۲۰۰ میلی متر می باشد. بافت خاک از نوع شنی و EC خاک متغیر و حدود ۶/۵۵ دسی زیمنس بر متر و EC آب ۵/۴۶ دسی زیمنس بر متر بود. در عملیات خاک ورزی زمین پس از شخم بهاره و قبل از دیسک زدن معادل ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار کود فسفره و ۱۰۰ کیلوگرم سولفات پتاسیم به زمین داده شد. کود اوره توصیه شده به میزان ۲۷۰ کیلوگرم در هکتار در سه نوبت به مقدار نصف قبل از کاشت همراه با کود فسفره و سولفات پتاسیم به عنوان کودهای پایه و یک چهارم در مرحله ۸-۶ برگی و یک چهارم در مرحله شروع گلدهی به صورت سرک مصرف شد. عملیات کاشت به صورت خطی و با دست انجام شد. اولین نوبت آبیاری (خاک آب) بلافاصله بعد از اتمام کشت و آبیاری های بعدی به خاطر شنی بودن زمین با فاصله کم و در هر هفته ۲ بار انجام گردید. این طرح به صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار اجرا شد. تراکم بوته در سه سطح ۱۳۰، ۱۵۰ و ۱۹۰ هزار بوته در هکتار و رقم نیز در سه سطح شامل ارقام: اسپیدفید، جامبووکیما مورد بررسی قرار گرفتند. بذور ضد عفونی شده سورگوم به عمق ۳-۴ سانتی متر در کرت هایی به ابعاد ۶×۲۵ متر مربع با فاصله ردیف ۷۵ سانتی متر در ۷ ردیف کاشته شدند. فاصله بین تکرار ها نیز ۲ متر در نظر گرفته شد. در مرحله رسیدگی کامل، برداشت از ردیف میانی پس از حذف حاشیه ها به مساحت ۳/۷۵ متر مربع انجام شد.

با برداشت ۱۰ بوته از هر کرت به صورت کاملاً تصادفی در مرحله رسیدگی و انتقال بوته ها به آزمایشگاه و قرار دادن آنها در آون به مدت ۴۸ ساعت در دمای ۷۰ تا ۷۵ درجه سانتی گراد، عملکرد بیولوژیکی محاسبه گردید. از تقسیم عملکرد دانه بر عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت محاسبه گردید. قبل از برداشت در مرحله رسیدگی فیزیولوژیکی، ارتفاع بوته اندازه گیری شد، به صورتی که ۱۰ بوته از هر کرت انتخاب و از محل طوقه تا انتهای پانیکول اندازه گیری بوته ها صورت گرفت. در طول مدت رشد گیاه شاخص سطح برگ (LAI) اندازه گیری شد، به صورتی که در هر مرحله پس از برداشت

گیاه و خشک کردن آنها با محاسبه طول و عرض برگ توسط خط کش با استفاده از فرمول $0.75 \times \text{طول} \times \text{عرض}$ مساحت برگ ها تعیین و در نتیجه شاخص سطح برگ محاسبه گردید. در مرحله گلدهی سورگوم (۵۰٪ گل دهی) شدت تابش خورشیدی در بالا و پایین پوشش گیاهی توسط دستگاه Sun Scan اندازه گیری شد. اندازه گیری شدت نور در بالا و پایین پوشش گیاهی از ساعت ۱۱/۳۰ الی ۱۳ نیمروز که خورشید تقریبا عمود بر پوشش گیاهی تابید و شدت تشعشع بالاترین مقدار بود، اقدام گردید.

ضریب استهلاك نوری (K) با استفاده از فرمول $\frac{I_i}{I_0} = e^{-kLAI}$ محاسبه شد. که در فرمول مذکور I_i :

تشعشع در لایه تحتانی پوشش گیاهی، I_0 : تشعشع در لایه فوقانی پوشش گیاهی و LAI شاخص سطح برگ است، سرمدنیا (۱۳۷۲). تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و مقایسه میانگین به روش دانکن صورت پذیرفت.

نتایج و بحث

شاخص سطح برگ (LAI)

نتایج تجزیه واریانس شاخص سطح برگ (جدول ۱) نشان داد که تاثیر تراکم بر شاخص سطح برگ در سطح ۱٪ از نظر آماری معنی دار بود. جدول مقایسه میانگین دانکن (جدول ۲) نشان می دهد که شاخص سطح برگ در تراکم ۱۹۰ هزار بوته در هکتار بیشترین مقدار بوده (۳/۸۲) که البته در طول دوره رشد این برتری را حفظ نمود (شکل ۱). با گذشت زمان شاخص سطح برگ افزایش یافته و با پیر شدن برگ ها در پایان دوره رشد کاهش پیدا کرده است (شکل ۱). همچنین نتایج تجزیه واریانس شاخص سطح برگ نشان داد که تاثیر ارقام بر این شاخص در سطح ۱٪ معنی دار بود (جدول ۱). شاخص سطح برگ در رقم جامبو در مقایسه با ارقام اسپیدفید و کیمیا از تفاوت قابل ملاحظه ای برخوردار بود (شکل ۲) و از سطح برگ بیشتری برخوردار بود. در ابتدای دوره رشد، مساحت برگ هادر رقم جامبو آهنگ رشد کندی داشت، اما همان طوری که از روی نمودار مشخص است در اواسط دوره رشد روند صعودی پیدا کرده و تا آخر دوره این برتری حفظ شده است. مطابق با این آزمایش در تراکم ۱۹۰ هزار بوته در هکتار شاخص سطح برگ زیاد شده، لذا جذب تشعشع خورشیدی و به تبع آن میزان فتوسنتز و در نتیجه عملکرد افزایش پیدا کرد (۱۰، ۱۶ و ۱۸).

ضریب استهلاك نوری (k)

بررسی نتایج تجزیه واریانس ضریب استهلاك نوری (جدول ۱) نشان داد که تاثیر تراکم بر ضریب استهلاك نوری در سطح ۱٪ معنی دار بود. بیشترین مقدار ضریب استهلاك نوری در تراکم ۱۹۰ هزار بوته در هکتار و به میزان ۰/۵۲ و کمترین ضریب استهلاك نوری مربوط به تراکم ۱۳۰ هزار بوته در

هکتار و به میزان ۰/۴۸ بود (جدول ۲). چنین به نظر می رسد که با افزایش تراکم گیاهی از طریق افزایش شاخص سطح برگ و دوام آن و ایجاد پوشش مترامی از گل و سپس خوشه ها در گیاه با افزایش ضریب استهلاک نوری و نرسیدن نور به پائین کانوپی، جذب تشعشع توسط جامعه گیاهی را در لایه های بالایی کانوپی افزایش می دهد و این موضوع باعث افزایش میزان فتوسنتز و تولید مواد و در نتیجه افزایش عملکرد گردید. این آزمایش با نتایج فلنت و همکاران (۱۹۹۶) مطابقت داشت. نتایج مربوط به تجزیه واریانس ضریب استهلاک نوری (جدول ۱) نشان داد که تاثیر ارقام بر ضریب استهلاک نوری در سطح ۱٪ معنی دار بود. بیشترین ضریب استهلاک نوری در رقم جامبو به میزان ۰/۵۵ و کمترین ضریب استهلاک نوری در رقم اسپیدفید به میزان ۰/۴۷ بود. رقم کیمیا از لحاظ آماری در گروه رقم اسپیدفید و با مقدار ۰/۴۹ قرار داشت (جدول ۲). به این ترتیب رقم جامبو دارای بیشترین ضریب استهلاک نوری بود که علت آن را می توان به پهن بودن، افقی بودن و جذب بیشتر تشعشع خورشیدی برگ های این رقم نسبت داد. با توجه به کمتر بودن ضریب استهلاک نوری در رقم اسپیدفید، برای رسیدن به عملکرد بیشتر می توان تراکم های بالاتری را برای این رقم در نظر گرفت و در مقابل برای رقم جامبو که دارای میزان k بیشتری است با تراکم کمتر می توان عملکرد های بالاتری را به دست آورد. همچنین اثر متقابل تراکم و رقم بر ضریب استهلاک نوری معنی دار نشد (جدول ۱).


جدول ۱: تجزیه واریانس صفات عملکرد و اجزاء عملکرد سورگوم دانه ای

میانگین مربعات									
منابع تغییرات	درجه آزادی	ارتفاع بوته	تعداد دانه درخوشه	وزن هزار دانه	عملکرد دانه	عملکرد بیولوژیکی	شاخص برداشت	ضریب استهلاک نوری	شاخص سطح برگ
تکرار (بلوک)	۳	۱۱/۸۵	۵۲۹۲۰/۶۹	۲/۴۸۳	۸۲۳۲/۱۴	۳۲۱۵۶/۵	۰/۰۰۱	۰/۰۰۴	۲/۳۵۷۲
تراکم (D)	۲	۱۰۶۹/۶**	۴۷۶۲۳۵/۴**	۲۸/۶۸**	۱۱۹۰۸۰۰/۳**	۱۳۶۸۸۵۸۸**	۰/۰۰۲**	۰/۰۰۵**	۲۲۹/۵۳۵۱**
رقم (V)	۲	۳۶۰۲۲/۷**	۳۸۶۰۴/۴**	۴۰/۵۵**	۹۵۹۶۷/۸**	۳۵۳۶۶۵۰/۷**	۰/۰۰۱	۰/۰۲۳**	۲۱۳/۳۵۵۷**
DV	4	۱۱/۱۲۵**	۱۵۸۳۶/۲**	۰/۵۷۷ ^{n.s}	۱۰۸۸۴۴/۳**	۱۵۱۵۴۵/۴**	۰/۰۰۱**	۰/۰۰۳	۵/۵۰۷۰**
خطای آزمایش	۴	۳۰/۳۵	۸۸۹۶/۴	۱/۴۸	۴۲۲۹۸/۵	۱۶۴۰۶/۴	۰/۰۰۱	۰/۰۰۲	۰/۰۰۶
ضریب تغییرات (%)		۱۴/۲۱	۲۸/۰۵	۴/۶	۸/۲۷	۰/۷۸	۹/۷۲	۷/۸۶	۲/۳۱

**، * و ns: به ترتیب اختلاف معنی دار در سطح احتمال ۱٪، ۵٪ و غیر معنی دار

تعداد خوشه در واحد سطح

با توجه به اینکه ارقام سورگوم دانه ای مورد مطالعه دارای پانیکول واحد در انتهای بوته بودند، در نتیجه با افزایش تعداد بوته در واحد سطح، تعداد خوشه در واحد سطح نیز افزایش یافت و در نهایت منجر به افزایش عملکرد گردید. نتایج این تحقیق با نتایج جوانمرد (۱۳۷۵) مطابقت دارد.



شکل ۱: روند تغییر شاخص سطح برگ در روزهای پس از کاشت در تراکم های مختلف

تعداد دانه در خوشه

نتایج مربوط به تجزیه واریانس تعداد دانه در خوشه (جدول ۱) نشان داد که تأثیر تراکم بر تعداد دانه در خوشه در سطح ۱٪ از نظر آماری معنی دار بود. بیشترین تعداد دانه در خوشه مربوط به تراکم ۱۳۰ هزار بوته در هکتار به میزان ۲۳۵۲ دانه در خوشه و کمترین تعداد دانه در خوشه مربوط به تراکم ۱۹۰ هزار بوته در هکتار به میزان ۱۹۶۳ دانه در خوشه بود (جدول ۲). نتایج این تحقیق بانتهای فنائی و همکاران (۱۳۸۱) مطابقت داشت. در تراکم های بالا به دلیل افزایش رقابت برای دریافت تشعشع و مواد غذایی، تعداد گل های بارور در پانیکول کاهش یافته و از طرفی با افزایش تعداد گیاه در واحد سطح، فضا و مواد غذایی برای هر گیاه کاهش یافته و لذا گیاه از رشد کافی برخوردار نمی باشد. بررسی نتایج تجزیه واریانس تعداد دانه در خوشه (جدول ۱) نشان داد که اثر ارقام مختلف بر تعداد دانه در خوشه در سطح ۱٪ معنی دار بود. بیشترین تعداد دانه در خوشه در رقم جامبو به میزان ۲۱۸۹ و کمترین تعداد دانه در خوشه مربوط به رقم کیمیا به میزان ۲۰۷۶ بود. رقم جامبو احتمال می رود به علت داشتن تعداد سنبلچه بیشتر در پانیکول و مقاوم تر بودن به شرایط محیطی، بیشترین تعداد دانه در پانیکول را به خود اختصاص داده بود (جدول ۲). رقم کیمیا نیز احتمالاً به علت مواجه شدن دوره نمو پانیکول و گرده افشانی با درجه حرارت های بالا و سقط تعداد زیادی از گلچه های آن، کمترین میزان تعداد دانه در پانیکول را دارا بود.

نتایج این تحقیق با نتایج جلالی (۱۳۷۹) مطابقت داشت. همچنین نتایج تجزیه واریانس تعداد دانه در خوشه (جدول ۱) نشان داد که اثر متقابل تراکم و رقم بر تعداد دانه در خوشه در سطح ۱٪ معنی دار بود، اثر متقابل تراکم ۱۳۰۰۰۰ بوته در هکتار و رقم جامبو با ۲۴۳۶ دانه در خوشه نسبت به سایر تیمارها برتری نشان داد و کمترین میزان تعداد دانه در خوشه مربوط به تراکم ۱۹۰۰۰۰ بوته در هکتار و رقم کیمیا به میزان ۱۸۴۳ دانه در خوشه بود (جدول ۲). نتایج این تحقیق با تحقیقات انجام شده توسط جوانمرد (۱۳۷۵)، مختار زاده (۱۳۷۹) و بهشتی (۱۳۷۲) مطابقت داشت.

وزن هزار دانه

نتایج تجزیه واریانس وزن هزار دانه (جدول ۱) نشان داد که تأثیر تراکم بوته بر وزن هزار دانه در سطح ۱٪ معنی دار بود، به طوری که تراکم ۱۳۰ هزار بوته در هکتار به میزان ۲۷/۰۶ گرم بیشترین وزن هزار دانه و تراکم ۱۹۰ هزار بوته در هکتار به میزان ۲۵/۱ گرم، کمترین وزن هزار دانه را داشتند (جدول ۲). به نظر می رسد با افزایش تراکم در واحد سطح تعداد دانه در واحد سطح افزایش می یابد و در نتیجه قابلیت دسترسی به مواد فتوسنتزی برای هر دانه کمتر و منجر به کاهش وزن دانه می شود. همچنین افزایش میزان مواد فتوسنتزی و انتقال سریع مواد به دانه در فرایند پدیده انتقال مجدد در تراکم های کمتر باعث افزایش وزن هزار دانه می شود و در نتیجه در افزایش عملکرد دانه نقش مهمی را دارا می باشد. همچنین با افزایش تراکم بوته در واحد سطح به علت وجود رقابت در اثر کمبود مواد غذایی و عوامل محیطی مثل نور، آب و غیره در محیط اطراف ریشه احتمالاً وزن هزار دانه کاهش یافته است. نتایج تحقیقات صورت گرفته توسط فنائی و همکاران (۱۳۸۱)، امامی (۱۳۷۹) و جلالی (۱۳۷۹) با نتایج این تحقیق مطابقت داشت. نتایج تجزیه واریانس وزن هزار دانه (جدول ۱) نشان داد که تأثیر ارقام بر وزن هزار دانه در سطح ۱٪ معنی دار بود، به طوری که بیشترین وزن هزار دانه مربوط به رقم کیمیا به میزان ۲۷/۱ گرم و کمترین وزن هزار دانه مربوط به رقم اسپیدفید به میزان ۲۵/۸ گرم بود (جدول ۲). بزرگ بودن دانه در رقم کیمیا دلیل برتری آن بر سایر ارقام بود که احتمالاً یک خصوصیت ژنتیکی است. همچنین اثر متقابل تراکم و رقم بر وزن هزار دانه معنی دار نبود.

عملکرد دانه

بررسی نتایج تجزیه واریانس عملکرد دانه (جدول ۱) نشان داد که تأثیر تراکم بر عملکرد دانه در سطح ۱٪ از نظر آماری معنی دار بود. تراکم های ۱۳۰ هزار بوته و ۱۵۰ هزار بوته در هکتار در یک گروه آماری قرار داشتند و میانگین عملکرد دانه در آنها به ترتیب ۲۱۲۶ کیلوگرم در هکتار و ۲۴۰۰ کیلوگرم در هکتار بود. بیشترین عملکرد دانه مربوط به تراکم ۱۹۰ هزار بوته در هکتار به میزان ۲۸۳۸ کیلوگرم در هکتار بود که اختلاف معنی داری با تراکم های ۱۳۰ و ۱۵۰ هزار بوته در هکتار داشت (جدول ۲). وجود پانیکول بیشتر در واحد سطح یکی از دلایل افزایش عملکرد دانه در هکتار بود. نتایج این آزمایش با نتایج امامی

(۱۳۷۹)، فیشر و ویلسون (۱۹۷۵)، جوانمرد (۱۳۷۵) و فنائی و همکاران (۱۳۸۱) مطابقت داشت، به طوری که آن‌ها گزارش کردند که با افزایش تراکم تا حد نرمال عملکرد دانه افزایش می‌یابد. بررسی نتایج تجزیه واریانس عملکرد دانه (جدول ۱) نشان داد که تاثیر ارقام بر عملکرد دانه در سطح ۱٪ از نظر آماری معنی دار بود، بیشترین عملکرد دانه مربوط به رقم جامبو به میزان ۲۵۹۱ کیلوگرم در هکتار بود، کمترین مقدار عملکرد دانه مربوط به رقم کیمیا به میزان ۲۳۵۸ کیلوگرم در هکتار بود. رقم اسپیدفید با مقدار ۲۳۲۶ کیلوگرم در هکتار در گروه رقم کیمیا قرار داشت (جدول ۲). این آزمایش با نتایج اکبری (۱۳۷۰) مطابقت داشت. همچنین نتایج تجزیه واریانس عملکرد دانه (جدول ۱) نشان داد که اثر متقابل تراکم و رقم بر عملکرد دانه در سطح ۱٪ معنی دار بود، بیشترین عملکرد دانه مربوط به تراکم ۱۹۰۰۰۰ بوته و رقم جامبو به میزان ۲۸۲۴ کیلوگرم در هکتار و کمترین میزان عملکرد دانه مربوط به تراکم ۱۳۰۰۰۰ بوته در هکتار و رقم کیمیا به میزان ۲۲۰۳ کیلوگرم در هکتار بودند (جدول ۲).

جدول ۲: مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه


شاخص	ضریب	شاخص	عملکرد	عملکرد	وزن هزار	تعداد دانه	ارتفاع	صفات
سطح برگ	استهلاک	برداشت	دانه	بیولوژیکی	دانه	درخوشه	بوته	
(LAI)	نوری (k)	(%)	(Kg/ha)	(Kg/ha)	(gr)		(cm)	
<u>تراکم</u>								
۳/۱۵ C	۰/۴۸B	۱۶/۸۹A	۲۱۲۶C	۱۳۴۳۰C	۲۷/۰۶A	۲۳۵۲A	۱۴۷/۱C	d1
۳/۴۳B	۰/۵ AB	۱۴/۴۸B	۲۴۰۰B	۱۵۷۰۰B	۴/۲۶ B	۲۰۶۵B	۱۵۶/۵B	d2
۳/۸۲A	۰/۵۲ A	۱۳/۲۸B	۲۸۳۸A	۲۰۰۸۰A	۲۵/۱C	۱۹۶۳C	۱۶۶/۴A	d3
<u>ارقام</u>								
۳/۲۷B	۰/۴۷B	۱۵/۲۳A	۲۳۲۶B	۱۵۸۵۴B	۲۵/۸B	۲۱۱۶AB	۱۸۳/۷B	اسپیدفید (V1)
۳/۸۷A	۰/۵۵A	۱۵/۹۸A	۲۵۹۱AB	۱۶۸۴۶A	۲۶/۳B	۲۱۸۹A	۱۹۳A	جامبو (V2)
۳/۲۶B	۰/۴۹B	۱۴/۴۱A	۲۳۵۸B	۱۶۴۵۷A	۲۷/۱A	۲۰۷۶B	۹۳/۸C	کیمیا (V3)
<u>اثر متقابل تراکم و رقم</u>								
۲/۹۹E	۰/۴۷ABC	۱۶/۲۵AB	۲۳۳۹B	۱۳۱۲۷G	۲۷/۴BC	۲۲۸۹A	۱۷۳/۵C	d1v1
۲۷/۳D	۰/۴۸BCD	۱۴/۲۵BCD	۲۳۳۲B	۱۵۰۸۰E	۲۵/۳DE	۲۰۴۶B	۱۸۵/۱B	d2v1
۳/۵۴C	۰/۵۱ABCD	۱۴/۵ABCD	۲۸۰۶A	۱۹۰۵۰C	۲۴/۲E	۲۰۱۵B	۱۹۲/۱B	d3v1
۳/۴۶C	۰/۵۴ABC	۱۶/۷۵A	۲۲۸۴B	۱۳۴۸۷G	۲۶/۸CD	۲۴۳۶A	۱۸۵/۴B	d1v2
۳/۸۱B	۰/۵۵AB	۱۶/۷۵A	۲۷۲۲A	۱۶۰۱۰D	۲۵/۰۲DE	۲۲۱۵B	۱۹۱/۱B	d2v2
۴/۳۴A	۰/۵۷A	۷۵/۱۲D	۲۸۲۴A	۲۱۱۶۰A	۲۴/۸E	۲۰۵۶B	۲۰۲/۵A	d3v2
۲/۹۹E	۰/۴۵D	۱۵/۵ABC	۲۲۰۳B	۱۳۹۹۰E	۲۸/۵A	۲۳۵۱A	۸۳/۷F	d1v3
۳/۲۱D	۰/۴۶CD	۱۳/۲۵CD	۲۳۴۸B	۱۶۰۱۰D	۸/۲۷AB	۲۰۳۴B	۹۳/۴۵E	d2v3
۳/۵۸C	۰/۴۹BCD	۱۴BCD	۲۸۱۸A	۲۰۰۲۰B	۲۶/۲CD	۱۸۴۳C	۱۰۴/۲D	d3v3

میانگین‌هایی که در یک ستون حداقل دارای یک حرف مشترک هستند فاقد اختلاف معنی‌دار در سطح احتمال ۵٪ می‌باشند

ارتفاع بوته

نتایج مربوط به تجزیه واریانس ارتفاع بوته (جدول ۱) نشان داد که تأثیر تراکم بر ارتفاع بوته در سطح ۱٪ از نظر آماری معنی دار بود. تراکم های مختلف در ارتفاع بوته از نظر آماری اختلاف معنی داری را نشان دادند. بالاترین ارتفاع بوته مربوط به تراکم ۱۹۰ هزار بوته در هکتار به میزان ۱۶۶/۴ سانتی متر و کمترین ارتفاع بوته مربوط به تراکم ۱۳۰ هزار بوته به میزان ۱۴۷/۱ سانتی متر بود (جدول ۲). با افزایش تراکم، رقابت برای جذب نور، عوامل محیطی بیشتر شده که این امر موجب افزایش ارتفاع گیاه گردید. پوشش متراکم بوته ها در واحد سطح سبب شد که فعالیت جوانه های جانبی کمتر شده و در عوض غالبیت انتهایی جوانه های انتهایی از طریق اعمال هورمونی افزایش یابد. نتیجه این تحقیق با نتیجه امامی (۱۳۷۹) مطابقت داشت. بررسی نتایج تجزیه واریانس ارتفاع بوته نشان داد که تأثیر ارقام بر ارتفاع بوته در سطح ۱٪ معنی دار بود. بالاترین ارتفاع بوته مربوط به رقم جامبو به میزان ۱۹۳ سانتی متر و کمترین ارتفاع بوته مربوط به رقم کیمیا به میزان ۹۶/۳ سانتی متر بود (جدول ۲). سازگاری بهتر با شرایط محیطی و دوره رشدی طولانی تر دلیل بیشتر بودن ارتفاع رقم جامبو و برتری آن نسبت به سایر ارقام بود.

نتایج مربوط به تجزیه واریانس ارتفاع بوته نشان داد که اثر متقابل تراکم و رقم بر ارتفاع بوته در سطح ۱٪ معنی دار بود، بالاترین ارتفاع بوته مربوط به تراکم ۱۹۰ هزار بوته در هکتار و رقم جامبو به میزان ۲۰۲/۵ سانتی متر و کمترین ارتفاع بوته مربوط به تراکم ۱۳۰ هزار بوته در هکتار و رقم کیمیا به میزان ۸۳/۷ سانتی متر بود (جدول ۲). نتایج این تحقیق با نتایج تعدادی از محققان از جمله جلالی (۱۳۷۹) و جوانمرد (۱۳۷۵) مطابقت داشت. تراکم ۱۵۰ هزار بوته در هکتار و رقم اسپیدفید، تراکم ۱۹۰ هزار بوته در هکتار و رقم اسپیدفید، تراکم ۱۳۰ هزار بوته در هکتار و رقم جامبو، تراکم ۱۵۰ هزار بوته در هکتار و رقم جامبو به ترتیب دارای ارتفاعی به میزان ۱۸۵/۱، ۱۹۲/۱، ۱۸۵/۴ و ۱۹۱/۱ سانتی متر در یک گروه آماری قرار داشتند.



شکل ۳: روند تغییر شاخص سطح برگ در روزهای پس از کاشت در ارقام مختلف

عملکرد بیولوژیکی

نتایج تجزیه واریانس عملکرد بیولوژیکی نشان داد که تاثیر تراکم بر عملکرد بیولوژیکی در سطح ۱٪ معنی دار بود. تراکم ۱۹۰ هزار بوته در هکتار به میزان ۲۰۰۸۰ کیلوگرم در هکتار بیشترین و تراکم ۱۳۰ هزار بوته در هکتار به میزان ۱۳۴۳۰ کیلوگرم در هکتار کمترین مقدار عملکرد بیولوژیکی را داشتند (جدول ۲). همچنین نتایج نشان داد که با افزایش تراکم به دلیل افزایش تعداد بوته در واحد سطح و همچنین افزایش شاخص سطح برگ، عملکرد بیولوژیک افزایش یافته است که با نتایج استاینر (۱۹۹۹) و جلالی (۱۳۷۹) مطابقت داشت. نتایج تجزیه واریانس عملکرد بیولوژیکی (جدول ۱) نشان داد که تاثیر ارقام بر عملکرد بیولوژیکی در سطح ۱٪ معنی دار بود. رقم جامبو با عملکرد بیولوژیکی ۱۶۸۴۶ کیلوگرم در هکتار بیشترین و رقم اسپیدفید با عملکرد بیولوژیکی ۱۵۸۵۴ کیلوگرم در هکتار کمترین میزان عملکرد بیولوژیکی را دارا بودند (جدول ۲). همان طور که نتایج نشان داد رقم جامبو به علت داشتن ارتفاع و شاخص سطح برگ بیشتر دارای عملکرد بیولوژیکی بیشتری بود که این ظرفیت ژنتیکی بالای این رقم را نشان می دهد. این نتایج با نتایج بهشتی (۱۳۷۷) و جلالی (۱۳۷۹) مطابقت داشت. همچنین نتایج تجزیه واریانس عملکرد بیولوژیکی (جدول ۱) نشان داد اثر متقابل تراکم و رقم بر عملکرد بیولوژیکی در سطح ۱٪ معنی دار بود. تراکم ۱۹۰ هزار بوته در هکتار و رقم جامبو بیشترین عملکرد بیولوژیکی معادل ۲۱۱۶۰ کیلوگرم در هکتار، کمترین میزان عملکرد بیولوژیکی مربوط به تراکم ۱۳۰ هزار بوته در هکتار و رقم اسپیدفید به میزان ۱۳۱۲۷ کیلوگرم در هکتار بود (۲، ۵ و ۱۱) (جدول ۲).

شاخص برداشت

نتایج تجزیه واریانس شاخص برداشت (جدول ۱) نشان داد که تاثیر تراکم بر شاخص برداشت در سطح ۱٪ از نظر آماری معنی دار بود. بیشترین شاخص برداشت مربوط به تراکم ۱۳۰ هزار بوته در هکتار به میزان ۱۶/۸۹ درصد و کمترین شاخص برداشت مربوط به تراکم ۱۹۰ هزار بوته در هکتار به میزان ۱۳/۲۸ درصد بود. تراکم ۱۵۰ هزار بوته در هکتار با شاخص برداشت ۱۴/۴۸ در یک گروه با تراکم ۱۹۰ هزار بوته قرار داشت (جدول ۲). نتایج تجزیه واریانس شاخص برداشت (جدول ۱) نشان داد که اثر رقم بر روی شاخص برداشت در هیچ سطحی معنی دار نبود. اثر متقابل تراکم و رقم بر شاخص برداشت در سطح ۱٪ معنی دار بود. تراکم ۱۳۰۰۰۰ و ۱۵۰۰۰۰ هزار بوته در هکتار و رقم جامبو به میزان ۱۶/۷۵ درصد بیشترین و تراکم ۱۹۰۰۰۰ هزار بوته در هکتار و رقم جامبو به میزان ۱۲/۷۵ درصد کمترین مقدار شاخص برداشت را دارا بودند (جدول ۲). این نتیجه با نتایج مختارزاده (۱۳۷۹) مطابقت داشت.

نتیجه گیری کلی

انتخاب تراکم مناسب با توجه به شرایط هر منطقه به خصوص میزان انرژی خورشیدی و ضریب استهلاک نوری و مشخصات ارقام مورد نظر یکی از عوامل مهم برای تولید حداکثر محصول در زراعت

سورگوم می باشد. باتوجه به نتایج حاصل از این تحقیق نتیجه گیری می شود که هرچه تراکم زیاد شود شاخص سطح برگ زیاد خواهد شد، در نتیجه افزایش شاخص سطح برگ، جذب تشعشع بیشتر شده و باعث افزایش عملکرد می گردد. رقم جامبو با تراکم ۱۹۰ هزار بوته در هکتار دارای بیشترین عملکرد می باشد. همچنین با افزایش تراکم گیاهی از طریق افزایش شاخص سطح برگ و دوام آن و ایجاد پوشش مترامی از گل، سپس خوشه ها در گیاه با افزایش استهلاك نور و نرسیدن نور به پایین کانوپی جذب تشعشع توسط جامعه گیاهی را در لایه های بالایی کانوپی می توان افزایش داد. رقم جامبو دارای بیشترین ضریب استهلاك نوری بود که علت آن را می توان به پهن بودن وافقی بودن برگهای این رقم نسبت داد. بنابراین بسته به وضعیت خاک منطقه و برتری عملکرد دانه و نظر به سایر جنبه های زراعی سورگوم، رقم جامبو با تراکم ۱۹۰ هزار بوته در هکتار برای کشت در منطقه ساوه توصیه می شود.

منابع

- ۱- اکبری، غ. ۱۳۷۰. بررسی تأثیر تراکم بوته و آرایش کاشت بروی عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه ای در اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد.
- ۲- امامی، ع. ۱۳۷۹. بهترین تراکم گیاهی برای رقم k_4 سورگوم دانه ای در مغان. ششمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات بابلسر ۱۶-۱۳ شهریور ماه.
- ۳- بهشتی، ع. ر. ۱۳۷۲. بررسی اثر تراکم و نسبت های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد کشت مخلوط سورگوم دانه ای و سویا. نشریه علمی، پژوهشی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر شماره ۱۵- جلد ۱۳.
- ۴- سرمدنیا، ع. و ع. کوچکی. ۱۳۷۲. فیزیولوژی گیاهان زراعی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
- ۵- جوانمرد، ح. ر. ۱۳۷۵. بررسی اثر تراکم های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم سورگوم دانه ای. پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات. اصفهان
- ۶- جلالی، ا. ه. ۱۳۷۹. تأثیر میزان ازت و تراکم بوته روی عملکرد دانه و اجزاء آن در سورگوم دانه ای. ششمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات. بابلسر. ۱۷۵-۱۸۶.
- ۷- زمانی، غ و کوچکی، ع. ۱۳۷۳. اثر آرایش و تراکم کاشت بر جذب تشعشع و اجزای عملکرد ذرت دانه ای، سومین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. ۲۴۳-۲۵۴.
- ۸- فنائی، ج.، ولی زاده، ج. و اکبری مقدم، ح. ۱۳۸۱. اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام سورگوم دانه ای در سیستان.
- نهال و بذر ۱۸ : ۲۹۳ - ۲۸۳.
- ۹- مختارزاده، ع. ا. ۱۳۷۹. بررسی اثر تراکم و نحوه کاشت بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد سورگوم دانه ای رقم کیمیا. ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات. بابلسر. ۱۷۲-۱۸۱.

10- Flenet, F., Kinivy, J. R., Board, J. E., Westage, M. E. and Reicoshy, D. C. 1996. Row spacing effects on light extinction coefficients of corn, sorghum, and sunflower. Agron. J. 88: 185 - 190

11- Fisher, K. S. and Wilson, G. L. 1975. Studies of grain production in sorghum bicolor (L. Moench) 5. Effect of planting density on growth and yield. Aust. J. of Agric.

-
- 12- Hum, D. and Kebede, J. 2001.** Response to planting data and population density by early-maturing sorghum hybrids in Ontario. *Can.J.Plant*.
- 13- Pitter, M. S. 1981.** Comparative evaluation of crop performance in selected grain sorghum (*Sorghum bicolor*) (L.) Moench cultivars . Dept . of Crop.Sc
- 14- Rosenthal.W. D., Gerik, T. J. and Wade, L. J. 1993.** Radiation use efficiency among grain sorghum cultivars and plant densities.
- 15- Stickler, F. C. and loud, S. 1998.** Yield and yield components of grain sorghum as by row width and stand density . *Agron .J.*
- 16- Staener, J. L. 1999.** Radiation balace of dry land grain sorghum as affected by planting geometry .
- 17- Watiki, J., Fukai, M. S., Bon, J. A. and Keating, B. A. 1997.** Radiation interception and growth of sorghum cowpea intercrop as affected by sorghum plant density and cowpea cultivar. *Field Crops Res.*
- 18- Williams, W. A., Loomis, R. S. and Lepely, C. R. 2001.** Vegetative growth of corn as affected by population density. I. Productivity in relation to interception of solar radiation. *Crop Sci.*