



مطالعه کالبدشناسی و بافت شناسی روده کوچک در اردک مسکوئی (*Cairina moschata*)

جلیل پور حاجی متاب^{*}، سید رشید هاشمی

گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

^{*}مسئول مکاتبات: dpourhajimotab@gmail.com

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۷/۹/۲۹

تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۴/۳۰

چکیده

اردک پرنده‌ای است که بیشتر در آب زندگی می‌کند. اردک مسکوئی به دلیل وزن گیری بالا برای تولید گوشت مناسب است. روده کوچک در بدن پستانداران و پرندگان بدلیل عمل هضم و جذب مواد غذایی دارای اهمیت می‌باشد. در رابطه با آنatomی و بافت شناسی روده کوچک در اردک مسکوئی بالغ مطالعه‌ای صورت نگرفته است. برای این مطالعه ۲۰ عدد اردک مسکوئی نر و ماده بالغ خریداری شد و مطالعه آنatomیکی بر روی روده کوچک آنها انجام شد. آنالیز داده‌های اندازه‌گیری شده طول و عرض اعضاً توسط نرم‌افزار SPSS و آزمون آماری تی استیوتدنت انجام شد. در مرحله بعد مطالعه بافت شناسی با رنگ‌آمیزی هماتوکسیلین بر روی روده کوچک انجام شد. نتایج آنatomیکی و بافت شناسی روده کوچک دارای شباهت کلی با سایر پرندگان بود و تفاوت‌هایی نیز در آن وجود داشت. ویژگی قابل ذکر آنatomیکی این بود که در اردک مسکوئی دوازده به شکل U خمیده بود. تهی روده نیز در جنس ماده دارای ۶ حلقه و در جنس نر دارای ۵ حلقه بود. میانگین طول و عرض روده کوچک در جنس نر بزرگتر از جنس ماده می‌باشد که این اختلاف در اندازه طول دوازده به صورت معنی دار می‌باشد. در مطالعه بافتی نیز ویژگی قابل ذکر وجود کرک‌های روده‌ای بلند و غیر منشعب با اپیتلیوم استوانه‌ای ساده بود که از سمت دوازده تا ایلثوم از ارتفاع آنها کاسته می‌شد. همچنین از دوازده به سمت ایلثوم نیز تعداد سلول‌های جامی در بافت پوششی افزایش می‌یافتد.

کلمات کلیدی: کالبدشناسی، بافت شناسی، روده کوچک، اردک مسکوئی.

مقدمه

رنگی بوده ولی بیشتر به رنگ سفید یکدست، سیاه و سفید و سیاه رنگ مشاهده می‌شود. همه اردک‌های مسکوئی زائد گوشتی قرمزی اطراف چشم‌ها و در قاعده منقارشان دارند. در اردک‌های نر پیر، این گوشت ممکن است در پشت گردن و بال‌ها هم دیده شود. اردک مسکوئی به دلیل وزن گیری بالا طور عمده برای تولید گوشت مناسب است (۸، ۵، ۶).

دستگاه گوارش پرندگان، لوله‌ای بین حفره دهانی تا کلواک می‌باشد. روده کوچک از پیلور سنگدان شروع و به تقاطع روده‌کور (سکوم) و راست روده یا کولون

اردک پرنده‌ای است که بیشتر در آب زندگی کرده و با پرندگان خشکی مانند مرغ و بوقلمون دارای تفاوت‌هایی است.

اردک از پرندگان نوک پهنه‌ی است که در جانورشناسی به آنها Lamellioroster (لاملیورستر) می‌گویند. گونه‌های زیادی از اردک در دنیا وجود دارد که هنوز شناخته و مورد مطالعه قرار نگرفته‌اند. این پرنده یکی از نژادهای اهلی غیربومی است که در استان‌های شمالی کشور به دلیل وزن گیری بالا طور موردن پرورش قرار می‌گیرد. اردک مسکوئی دارای تنوع



مواد و روش کار

برای این مطالعه ۲۰ قطعه اردک مسکوئی بالغ نر و ماده به تعداد یکسان از استان‌های شمالی خریداری گردید و به مدت یک ماه با جیره تغذیه‌ای یکسان مورد تغذیه قرار گرفتند. سپس پرندگان به سالن تشریح دانشکده دامپزشکی منتقل شدند.

ابتدا برای مطالعه آناتومیکی پرندگان به روش شرعی ذبح گردیدند و به شکل پشتی و شکمی روی سینی آناتومی خوابانده شدند. سپس یک برش طولی پوست در خط میانی از ابتدای گردن تا کلواک انجام گرفت و جناغ و عضلات شکمی از جوانب برداشته شد، تا تمام اندام‌های لوله گوارشی نمایان گردد.

بررسی اولیه آناتومیکی شامل توپوگرافی، مجاورات، رنگ و شکل روده کوچک در محل اصلی آن انجام گرفت و تصویر لازم گرفته شد.

در مرحله بعد لوله گوارش از حفره دهانی کلواک از محل اتصال خود جدا و از محوطه بطئی پرنده خارج گردید و بعد از گسترش در سینی تشریح بررسی بیشتر آناتومیکی از سطح داخل و بیرون اعضای مختلف روده باریک انجام شد.

برای مطالعه مورفومتریکی طول هر عضو محاسبه گردید و عرض آن نیز از قسمت‌های ابتداء، وسط و انتهای اندازه گیری و یادداشت گردید. برای دقت عمل بیشتر، هر اندام سه مرتبه مورد اندازه گیری شد و تصاویر لازم همراه با قرار دادن شاخص از آنها تهیه شد. نتایج بدست آمده در جداولی که از قبل آماده شده بود یادداشت گردید. سرانجام نمونه‌ها برای نگهداری طولانی در ظرف محتوی فرمالین ۱۰ درصد انتقال یافتند.

در مرحله بعد برای مطالعه بافت شناسی از ۶ پرنده (۳ پرنده نر و ۳ پرنده ماده) اقدام به نمونه برداری از هر سه قسمت دوازده، تهی روده و ایلئوم شد و برش‌هایی به ضخامت 1×1 سانتی‌متر تهیه گردید و

منتھی می‌شود و شامل سه بخش دوازده، تهی روده و ایلئوم می‌باشد. بین تهی روده و ایلئوم مجرای زرده ای یا ته کیسه مکل (Meckel's) قرار گرفته است. روده کوچک در پرندگان بخاطر دو عمل هضم و جذب مواد غذایی دارای نقش حیاتی است (۱۴، ۱۶، ۱۷).

شكل حلقه‌های روده‌ای در طبقه‌بندی نمودن پرندگان دارای اهمیت می‌باشد. این حلقه‌ها در ماکیان به تعداد ۱۱-۱۰ عدد، در غاز ۸-۵ عدد و در مرغ مروارید ۴-۵ عدد ذکر شده است (۲، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۷، ۱۸، ۱۹).

در بررسی بافت‌شناسی دوازده پرندگان دارای مخاط حاوی کرک و چین‌های حلقوی شکل، پارین و طبقه مخاطی است. در زیر مخاط غدد بروونر وجود ندارد. در بافت پوششی نیز سلول‌های پانت مشاهده نمی‌گردد. تهی روده بافتی مشابه دوازده داشته و ایلئوم نیز بافتی مشابه داشته و دارای ساختار لنفاوی زیاد و پلاک‌های پیر است. سلول‌های جامی در هر سه قسمت روده کوچک قابل مشاهده است (۱، ۲، ۳، ۴، ۵).

در تحقیقات بافت شناسی نیز گزارش شده که در روده کوچک پرندگان شترمرغ، گنجشک و مرغ شاخدار برای افزایش سطح جذب بوده و در گنجشک و مرغ مروارید این کرک‌ها دارای انشعاب نمی‌باشد (۲، ۱۳، ۱۵).

با مطالعه تحقیقات انجام شده تفاوت‌های آناتومیکی و بافت شناسی متعددی را بین گونه‌های مختلف پرندگان نشان می‌دهد که این تفاوت‌ها بین دو جنس نیز گزارش شده است.

به همین منظور مطالعه همزمان آناتومیکی و بافت شناسی روده کوچک دو جنس نر و ماده اردک مسکوئی بالغ برای اولین بار مورد مطالعه قرار گرفت.



صعودی بلندتر از بازوی نزولی دیده شد و روی سطح پشتی کبد، ادامه یافته و مجاور بیضه راست یا تخدمان قرار می‌گرفت و به سمت حد قدامی کلیه راست خمیده می‌شد و تهی روده آغاز می‌گشت. رباط لوزالمعده‌ای دوازده‌ای دو بخش نزولی و صعودی دوازده را به یکدیگر متصل می‌نمود. غده پانکراس یا لوزالمعده مابین دو بازو و داخل این رباط قرار داشت در شروع بازوی صعودی نیز مجرای پانکراس دیده می‌شد که به داخل دوازده در همین محل باز می‌شد.

رباط دوازده‌ای ایلئومی سکومی نیز بخش انتهایی دوازده صعودی را به بخشی از ایلئوم بین دو سکوم از سمت چپ متصل می‌نمود. در نتیجه وجود این رباط، در بخش خلفی پیلور سنگدان، چهار بخش روده (دوازده، ایلئوم و جفت سکوم) در موازات هم قرار می‌گرفتند. در ادامه دوازده صعودی، با یک خمیدگی مشخص به سمت پشت تهی روده شروع می‌شد.

رنگ تهی روده صورتی تا قرمز روشن بود و سطح خارجی آن یکدست و صاف مشاهده شد. تعداد حلقه‌های روده‌ای در اردک مسکوئی بین ۶-۵ عدد دیده شد (در ماده‌ها ۶ عدد و در نرها ۵ عدد). حلقه‌های تهی روده توسط روده‌بند تهی روده (مزورژنوم) به هم متصل بودند.

روده‌بند تهی روده وسیع‌ترین بخش روده‌بنای روده‌ها را تشکیل می‌داد. تهی روده با دوازده، سنگدان و سکوم چپ در هر دو جنس و در ماده‌ها با تخدمان و اویدوکت و در نرها با بیضه و کانال دفران تماس داشت.

مجموعی ویتلین یا مکل در انتهای تهی روده مشاهده شد. عرض تهی روده در تمامی اردک‌ها در ابتدا تقریباً برابر با عرض بازوی صعودی دوازده بود. با نزدیک شدن به بخش میانی کمی از عرض آن کاسته می‌شد و

به داخل محلول فرمالین ۱۰ درصد انتقال داده شد. بعد از ثبوت نمونه‌ها را به داخل دستگاه تهیه مقاطع میکروسکوپی برده و بعد از قالب‌گیری توسط پارافین برش‌های سریالی با ضخامت ۶ میکرون از آنها تهیه شد. سپس رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین بر روی آنها انجام شده و توسط میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند.

آنالیز آماری داده‌ها (مقایسه طول، عرض هر سه قسمت روده کوچک در دو جنس) توسط نرم افزار SPSS نسخه ۲۳ انجام پذیرفت و از آزمون تی استیودنت استفاده شد و سطح $p \leq 0.05$ برای معنی دار بودن اختلاف بین داده‌ها در نظر گرفته شد.

نتایج

نتایج آناتومیکی نشان داد دوازده در اردک مسکوئی در تحتانی‌ترین ناحیه روده‌ای قرار داشته و به محض برداشتن استخوان جناغ همراه با عضلات به راحتی قابل تشخیص بود.

رنگ دوازده در اردک‌های مسکوئی کرم تا صورتی بسیار روشن بود و سطح خارجی یکدست و صافی داشت.

دوازده از بخش پیلور سنگدان شروع می‌شد. سپس در سمت راست به خلف ادامه مسیر می‌داد و با یک انحنای مشخص از سمت لبه راست سنگدان به لبه چپ سنگدان می‌رفت و دوازده نزولی را تشکیل می‌داد. در انتهای این انحنا یک خمیدگی تنده روی دیواره‌ی تحتانی حفره بطنی ایجاد می‌کرد. از لبه چپ سنگدان، این خمیدگی تنده با انحنای مشابه دوازده نزولی به سمت راست ادامه یافته و دوباره در موازت بازوی نزولی خود با یک خمیدگی ملاجم به سمت قدام طی مسیر می‌داد و دوازده صعودی را تشکیل می‌داد. این وضعیت بازوی نزولی و صعودی شبیه یک لوب (U) شکل خمیده و دارای انحنا بود. بازوی



مخاطی از سلول‌های استوانه‌ای ساده همراه با سلول‌های جامی تشکیل می‌شد. عضله مخاطی مشخصی پارین و زیرمخاط بسیار نازک و نامحسوس از هم جدا می‌کرد. طبقه عضلانی متشكل از دو لایه حلقوی داخلی و طولی خارجی بود که با یک لایه سروزی از خارج احاطه می‌شد (شکل ۳).

در تهی روده نیز کرک‌های تقریباً بلند و گاهی مخروطی شکلی مشاهده شد که با اپیتیلیوم استوانه‌ای ساده همراه با تعداد بیشتری از سلول‌های جامی نسبت به دوازدهه پوشیده می‌شد. بافت همبند سست پارین در محور مرکزی و در زیر کرک‌ها حضور داشت و حاوی غدد روده‌ای از نوع لوله‌ای ساده با اپیتیلیوم مشابه مخاط بود. عضله مخاطی در زیر پارین کاملاً مشخص دیده شد و باعث تمایز شدن پارین از زیرمخاط باریک و ظرفی می‌شد. طبقه عضلانی نیز مانند دوازدهه از دو لایه داخلی حلقوی و خارجی طولی تشکیل شده بود (شکل ۴).

در ایلئوم دیواره کرک‌ها دارای قطر بیشتر و ارتفاع کوتاه‌تر از بخش‌های قبلی روده کوچک بود. اپیتیلیوم مخاط سطح کرک‌ها به شکل استوانه‌ای ساده همراه با سلول‌های جامی بسیار بیشتر مشاهده گردید. پارین مخاط ایلئوم نیز دارای غدد روده‌ای لیبرکوهن با سلول‌های جامی فراوان‌تر از بخش‌های قبلی بود. زیرمخاط نازک بوده و طبقه عضلانی با دو لایه صاف حلقوی داخلی و طولی خارجی با لایه سروزی در سطح خارجی احاطه شده بود (شکل ۵).

نتایج مورفومتری نشان داد میانگین ابعاد طول و عرض هر سه قسمت روده باریک در جنس نر بزرگ‌تر از جنس ماده می‌باشد که این اختلاف در قسمت طول دوازدهه معنی‌دار بوده ولی در تهی روده و ایلئوم معنی‌دار نمی‌باشد. میانگین و اختلاف طول و عرض قسمت‌های مختلف روده کوچک در جدول ۱ نشان داده شده است.

بخش انتهایی عرض کمتر از بخش میانی داشت. در ادامه تهی روده ایلئوم بصورت یک بخش کوتاه و بدون حلقه، به موازات حلقه‌های دوازدهه‌ای و نزدیک سطح تحتانی ستون مهره‌ها قرار گرفته بود. سطح خارجی ایلئوم همانند دوازدهه و تهی روده صاف و یکدست بوده و رنگ آن کرم تا صورتی رنگ مشاهده شد. در محل شروع ایلئوم به آزاد یا قدامی رباط ایلئومی سکومی مشاهده شد.

ایلئوم در ادامه با طی مسیر به سمت قدام در پشت دو بازوی دوازدهه تا مرز خلفی سنگدان امتداد می‌یافت و در سمت مقابل غدد جنسی به سمت پشت و چپ خمیده شده و با رسیدن به پایه سکوم‌ها و ابتدای راست روده پایان می‌یافت. بخش اعظم طول ایلئوم در تمامی اردک‌های مسکوئی بین دو روده کور یا سکوم راست و چپ مشاهده می‌شد. چین یا رباط ایلئومی سکومی سکوم‌ها را به ایلئوم متصل می‌کرد.

رباط ایلئومی سکومی طوبیل تراز طول سکوم‌ها و هماندازه طول ایلئوم بود. ایلئوم از جانب با جفت سکوم چپ و راست، از جانب چپ با تهی روده و از قدام با سنگدان، از سطح تحتانی با دوازدهه و پانکراس و از پشت با مهره سین ساکروم مجاورت داشت. عرض ایلئوم در تمامی اردک‌های مسکوئی در ابتدا تقریباً برابر با عرض انتهای تهی روده بود. با نزدیک شدن به بخش میانی پهنا تاحدود بسیار کمی افزایش می‌یافت (شکل‌های ۱ و ۲).


نتایج بافت‌شناسی نشان داد در دوازدهه مخاط به سمت لومن، کرک‌های انگشتی شکل بلندی ایجاد می‌کرد. اپیتیلیوم پوشاننده سطح کرک‌ها به شکل استوانه‌ای ساده همراه با سلول‌های جامی کمی بود و محور مرکزی آن را بافت همبندی سست پارین تشکیل می‌داد. پارین در قاعده کرک‌ها و زیر آن دارای تعدادی غدد لوله‌ای ساده به عنوان غدد روده‌ای یا غدد لیبرکوهن بود. اپیتیلیوم غدد نیز مشابه اپیتیلیوم




جدول ۱- میانگین اندازه طول و عرض روده کوچک بر حسب میلی‌متر

ماده	نر	میانگین ابعاد
$133/9 \pm 10/84$	$160/01 \pm 7/48$	طول دوازده نزولی*
$7/06 \pm 0/93$	$7/44 \pm 1/15$	عرض دوازده نزولی
$148/30 \pm 7/64$	$170/10 \pm 7/52$	طول دوازده صعودی*
$6/75 \pm 0/66$	$6/76 \pm 0/38$	عرض دوازده صعودی
$948/7 \pm 93/36$	$1017/30 \pm 19/33$	طول تهی روده
$6/44 \pm 0/75$	$6/77 \pm 0/61$	عرض تهی روده
$163/20 \pm 15/70$	$182/50 \pm 7/15$	طول ایلنوم
$5/89 \pm 0/51$	$6/27 \pm 0/49$	عرض ایلنوم


ستارک (*) نشانه معنی‌دار بودن داده‌ها می‌باشد.




شکل ۱- توپوگرافی لوله گوارش اردک مسکوئی ماده بالغ. a- مری گردانی، b- مری سینه‌ای، c- پیش‌معده، d- تنگه، e- توode ماھيچه‌اي قدامي پشتى، f- توode ماھيچه‌اي خلفي تحاتاني، g- توode ماھيچه‌اي پشتى جانبي، h- توode ماھيچه‌اي تحاتاني جانبي، i- توode ماھيچه‌اي جانبي، j- دوازده نزولی، k- دوازده صعودی، l- تهی روده، m- ایلنوم، n- کلواک. Scale=3cm




شکل ۲- روده باریک در محوطه بطئی اردک مسکوئی نر بالغ. a: مری سینه‌ای، b: پیش‌معده، c: تنگه، d: سنگدان، e: دوازدهه نزولی، f: دوازدهه صعودی، g: تهی روده، h: ایلنوم، i: سکوم راست، j: سکوم چپ، k: بیضه چپ، Scale= 3cm



شکل ۳- جدار دوازدهه صعودی اردک مسکوئی نر بالغ. a: کرک روده‌ای، b: پارین با غدد مخاطی لیبرکوهن، c: ماهیچه مخاطی، d: طبقه عضلانی، (H & E) $\times 40$



شکل ۴- جدار تهی روده اردک مسکوئی نر بالغ. a: اپیتلیوم کرک، b: پارین، c: غدد مخاطی لیبرکوهن، d: ماهیچه مخاطی، e: زیرمخاط، f: طبقه عضلانی، $\times 100$. (H & E).



شکل ۵- تهی روده اردک مسکوئی نر بالغ. a: اپیتلیوم کرک، b: پارین، c: غدد مخاطی لیبرکوهن، d: ماهیچه مخاطی، e: زیرمخاط، f: طبقه عضلانی، $\times 100$. (H & E).

بحث

آناتومی و بافت‌شناسی روده کوچک در اردک مسکوئی شباهت کلی به سایر پرنده‌گان داشته ولی تفاوت‌هایی نیز در آن وجود داشت.



برای جبران کاهش سطح جذب روده کوچک در روده کوچک دارای کرک‌های بزرگ و بلندی هستند (۱۵). در مطالعه پور حاجی موتاب و همکاران نیز (۱۳۹۳) اعلام گردید که در مرغ مروارید کرک‌های بزرگ در روده کوچک مشاهده می‌گردد. در مطالعه حاضر روده کوچک اردک مسکوئی مشابه مرغ شاخدار و پرنده بال لاکی می‌باشد و دارای کرک‌های بزرگ روده‌ای بوده که این پرزها در دوازدهه بسیار بلند می‌باشد (۲). Jingjing و همکاران (۲۰۰۷) در مطالعه بر روی بافت لوله گوارش شترمرغ اعلام نمودند که کرک‌های روده‌ای طویل و منشعب می‌باشند و در تهی روده نیز راس کرک‌ها S شکل می‌گردد (۱۳).

در تحقیق حاضر کرک‌های روده‌ای در اردک مسکوئی برخلاف شترمرغ در هر سه قسمت دوازدهه، تهی روده و ایلنوم ساختار یکسان داشته و غیر منشعب دیده شد.

نتیجه‌گیری

در پایان بعنوان یک نتیجه‌گیری کلی از پژوهش حاضر می‌توان گفت که آنatomی و بافت شناسی روده کوچک در اردک مسکوئی شباهت کلی به سایر پرنده‌گان داشته ولی تفاوت‌هایی نیز در آن دیده می‌شود. ویژگی قابل ذکر آنatomیکی این بود دوازده در اردک مسکوئی به شکل U خمیده و دارای انحنای دیده شد. در تهی روده نیز در جنس ماده دارای ۶ حلقه و در جنس نر دارای ۵ حلقه بود. نتایج آزمون آماری نشان داد که میانگین طول و عرض هر سه قسمت روده کوچک در جنس نر بزرگتر از جنس ماده می‌باشد که این اختلاف در دوازدهه بصورت معنی‌دار می‌باشد ولی در تهی روده و ایلنوم معنی‌دار نبود. در مطالعه بافتی نیز ویژگی قابل ذکر وجود کرک‌های روده‌ای بلند و غیر منشعب با اپیتلیوم استوانه‌ای ساده بود که از سمت دوازدهه تا ایلیوم از ارتفاع آنها کاسته می‌شد. از دوازده به سمت

پور حاجی موتاب و همکاران (۱۳۹۳) گزارش کردند که طول روده کوچک در جنس ماده مرغ شاخدار بزرگتر از جنس نر می‌باشد (۲). در تحقیق حاضر اردک مسکوئی با فرقاول و مرغ مروارید متفاوت بوده و برخلاف مرغ شاخدار و فرقاول طول و عرض روده باریک در جنس نر بزرگتر از جنس ماده می‌باشد. Bailey و همکاران (۱۹۹۷) گزارش کردند طول روده کوچک پرنده هوبره را $40/5$ تا 55 درصد از کل طول لوله گوارش می‌باشد که به دلیل همه‌چیزخوار بودن این پرنده، کوتاه‌تر از پرنده‌گان دانه‌خوار و گیاه‌خوار است (۷).

در مطالعه مشابه دیگری که Wu و همکاران (۲۰۰۹) اعلام نمودند که طول روده کوچک در فرقاول طلایی 114.7 ± 7.9 میلی‌متر می‌باشد. همچنین طول کلی روده‌ها در این پرنده $\frac{3}{4}$ طول بدن و این اندازه در طول روده‌ها را ناشی از گیاه‌خوار بودن این پرنده دانستند (۲۰).

Herd نشان داد که طول روده کوچک در پرنده امو با توجه به حجم و وزن آن کمتر از سایر پرنده‌گان گیاه‌خوار است (۱۱). نتایج مطالعه حاضر با تحقیقات پیشین مشابه است. همچنین در مطالعات پیشین آنatomیکی گزارش شده که تعداد حلقه‌های روده‌ای در ماکیان ۱۱-۱۰ حلقه و در غاز و اردک ۸-۵ حلقه می‌باشد. در مرغ مروارید نیز تعداد این حلقه‌ها ۴-۵ حلقه گزارش شد (۲، ۹، ۱۷، ۲۰، ۱۹).

در اردک مسکوئی تعداد حلقه‌های روده‌ای در جنس نر ۵ عدد و در جنس ماده ۶ عدد مشاهده شد و با اردک و غاز مشابهت بیشتری نسبت به ماکیان داشت. Lavin و همکاران (۲۰۰۸) در مطالعه پرنده بال لاکی سدری و بال لاکی بوهمی که هردو از تیره گنجشک سانان می‌باشد گزارش کردند که این پرنده‌گان روده کوچک کوتاه‌تری در مقایسه با پستانداران دارند و



- 10- Cooper R.G., Mahroze K.M., 2004. Anatomy and physiology of the gastrointestinal tract and growth curves of the ostrich. *Animal Science Journal*, 75: 491–498.
- 11- Herd R.M., 1985. Anatomy and histology of the gut of the Emu *Dromaius novaehollandiae*. A gricultural Research Centre, *New South Wale*, 85:43-46.
- 12- Iji P.A., Van der Walt J.G., Brand T.S., Boomker E.A., Booysse D., 2003. Development of the digestive tract in the Ostrich (*Struthio camelus*), *Archives of Animal Nutritions*, 57: 217-228
- 13- Jingjing W., Keme P., Anna D., Li T., Hui S., 2007. Histological structure of the digestive tract in African Ostrich Chicks. *Chinese Journal of Zoology*, 42: 131-135.
- 14- King A.S., Mc Lelland J., 1984. Birds their strucure and function. Bailliere Tindal, London, United Kingdom, pp: 121- 130.
- 15- Lavin S.R., Karasov W.H., Ives A.R., Middleton K.M., Garland T.J., 2008. Morphometrics of the avian small intestine compared with that of nonflying mammals, *Physiological and Biochemical Zoology*, 81(5): 526-50.
- 16- Mclelland J., 1991. A color atlas of avian anatomy. W.B. Saunders, Philadelphia, Pennsylvania.
- 17- McLelland J., 1975. Aves digestive system. In: sisson and grossman's the anatomy of the domestic animals, Getty, R. Vol. 2, 5th Edition. Philadelphia: Saunders. 48 pp.
- 18- Nickel R., Schummer A., 1977. Anatomy of the domestic birds. Verla Paul Parey, Berlin, pp: 85- 94.
- 19- Ru H.F., 2006. Comparative studies on digestive system of several species of birds. *Journal of Economic Animal*, 10(1): 35-38.
- 20- Wu B., Li L., Yu X., 2009. Winter diet and digestive tract of the Golden Pheasant in the Qinling Mountains, China. *Chinese Birds*, 1(1): 45–50.

ایلکوم نیز تعداد سلول‌های جامی در بافت پوششی افزایش می‌یافت.

منابع

- ۱- پوستی، ا، ادیب مرادی، م.، ۱۳۸۵. بافت‌شناسی مقایسه‌ای و هیستوتکنیک، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران، صفحات ۴۲۵-۴۲۹.
- ۲- پور حاجی موتاب، ج.، سرگزی، م.، تونی، س.ر.، حسینی، س.ج.، ۱۳۹۳. مطالعه ریخت‌شناسی بافتی روده کوچک در مرغ مروارید (مرغ شاخدار)، مجله تحقیقات دامپزشکی، دوره ۶۹، شماره ۴، صفحات ۳۹۹-۳۹۵.
- ۳- رضائیان، م.، ۱۳۷۷. بافت‌شناسی و اطلس رنگی دامپزشکی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، صفحات ۲۴۳-۲۳۳.
- ۴- رضائیان، م.، ۱۳۸۵. بافت شناسی طیور، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۷۶ صفحه.
- ۵- سعادت نوری، م.، ۱۳۶۲. شناسایی و طبقه بندی اردک‌های ایران، ماهنامه مزرعه، شماره ۲، صفحات ۱۱-۱۵.
- ۶- شمسائی، ا.ه.، ۱۳۷۱. اردک‌های مسکوئی، چاپ اول، انتشارات تحقیقات کشاورزی کشور، صفحات ۱-۴۰.
- ۷- Bailey T.A., Mensah E.P., Samour J.H., Naldo J., Lawrence P., Garner A., 1997. Comparative morphology of the alimentary tract and its glandular derivatives of captive bustards. *Journal of anatomy*, 191: 387-393.
- 8- Bauer F., 1983. Muscovy ducks. Poultry research center, Labu, *Papua New Guinea*, 1-3.
- 9- Chikilian M., de SperoniN. B., 1996. Comparative study of the digestive system of three species of tinamou. I. *Crypturellus tataupa*, *Nothoprocta cinerascens*, and *Nothura maculosa* (Aves: Tinamidae), *Journal of Morphology*, 228: 77-88.



some internal organs in common pheasant.
Trakia Journal of Sciences, 10(3): 48-52.

21- Yovchev D., Dimitrov R., Kostov D., Vladova D., 2012. Age Morphmetry of