

بررسی تأثیر تجویز داروی داکسی سایکلین بر روی برخی پارامترهای بیوشیمیابی سرم خون در ماکیان گوشتی سویه تجاری Ross

بهرام عمرو اوغلی تبریزی^۱، عادل فیضی زنگبار^۱، سالار ضرابی اهرابی^۲

چکیده

این مطالعه به منظور ارزیابی اثرات تجویز داکسی سایکلین بر روی برخی پارامترهای بیوشیمیابی سرم خون در ماکیان گوشتی سویه Ross به علت استفاده وسیع در صنعت ماکیان صورت پذیرفت. ۴۰ قطعه ماکیان گوشتی سویه Ross جنس مخلوط در دو گروه ۲۰ تایی شاهد و تیمار با شرایط سنی، محیطی و تغذیه ای یکسان قرار گرفتند. در گروه تیمار دارو با دز ۴۰۰ گرم پودر در ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی تجویز شد. نمونه خونی از پرنده‌گان هر دو گروه پس از ۵ روز از ورید بال اخذ و پس از سانتریفوژ و جداسازی سرم، میزان پارامترهای بیوشیمیابی آلانین آمینوترانسفراز، آسپارتات آمینوترانسفراز، فسفاتاز قلیایی، فسفر، کلسیم، گلوکز، بیلی روین کونژگه و بیلی وردین به روش رنگ سنجی و با استفاده از کیت‌های اختصاصی اندازه‌گیری شدند. نتایج این بررسی افزایش معنی دار در مقادیر سرمی آلانین آمینوترانسفراز، آسپارتات آمینوترانسفراز، فسفاتاز قلیایی، بیلی روین کونژگه و بیلی وردین ($p < 0.05$) و کاهش معنی دار در میزان سرمی کلسیم در ماکیان گروه تیمار نشان داد ($p < 0.05$). میزان سرمی فسفر و گلوکز در گروههای تیمار و شاهد اختلاف معنی داری را نشان نداد ($p > 0.05$). تجویز داکسی سایکلین در ماکیان عوارض بالینی خاصی ایجاد نمی‌کند ولی می‌تواند در مواردی که اختلالات و یا بیماریهای کبدی وجود دارد، باعث تشديد بیماری و آسیب بیشتر در بافت کبد گردد.

واژگان کلیدی : داکسی سایکلین، پارامترهای بیوشیمیابی، ماکیان گوشتی سویه Ross

وسيعى صورت مى پذيرد. چراكه انوع بيماريهايى كه در پرورش ماکيان مطرح مى باشند همواره تهديدى برای اين صنعت مى باشند(۲). اهميت استفاده از داروهای آنتى بيوتيك در صنعت مرغدارى مسئله اي انكار ناپذير مى باشد. داکسی سایکلین بعنوان يك داروي پر مصرف در صنعت ماکيان مى باشد. اين دارو جزو تتراسيكلين هاي نيمه ساختگي يا نسل دوم است كه داراي ترکيب

مقدمه

امروزه با پيشرفت صنعت مرغدارى و پرورش متراكم طيور، استفاده از آنتى بيوتيك ها در سطح

۱- گروه آموزشي علوم درمانگاهى، دانشكده دامپزشکى دانشگاه آزاد اسلامى واحد تبريز

۲- دانش آموخته دامپزشکى، دانشكده دامپزشکى، دانشگاه آزاد اسلامى واحد تبريز

*-نويسنده مسئول Bahram-tabrizi1353@yahoo.com

دارو در ماکیان گوشتشی در این تحقیق سعی شده اثرات مثبت یا منفی داکسی سایکلین بر روی برخی پارامترهای بیو شیمیایی شامل آلائین آمینوترانسفراز، آسپارت آمینوترانسفراز، فسفاتاز قلیایی، فسفر، کلسیم، گلوکر، بیلی روپین کونژگه و بیلی وردین در مرغ گوشتشی سویه تجاری Ross ارزیابی شود.

مواد و روش کار

جهت انجام این مطالعه، ۴۰ قطعه مرغ گوشتشی سویه تجاری Ross به ظاهر سالم و هم وزن، در سن ۱۹ روزگی انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تیمار و شاهد تقسیم شدند. ماکیان مورد مطالعه در دمای ۲۴-۲۲ درجه سانتی گراد با ۲۴ ساعت روشنایی در داخل قفسهای مخصوص نگهداری واژ یک جیره یکسان تغذیه شدند. جهت از بین بردن استرس حمل و نقل و همچنین استرس ناشی از تغییر مکان و برگشت اشتها، به مدت ۴۸ ساعت مولتی ویتامین بصورت آشامیدنی تجویز شد. در سن ۲۱ روزگی به گروه تیمار بمدت ۵ روز داکسی سایکلین ۵۰٪ با دوز ۴۰۰ گرم پودر داکسی سایکلین به ازای ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی طبق دستور العمل توصیه شده در بروشور تجویز شد. در گروه شاهد نیز فقط از آب آشامیدنی استفاده شد. در پایان روز پنجم، از تمامی ماکیان گروه شاهد و تیمار، ۵ میلی لیتر خون از ورید بال اخذ و بلافارسله نمونه ها به آزمایشگاه منتقل شده و توسط سانتریفیوژ با دور ۳۰۰۰ به مدت ۱۵ دقیقه سرمه نمونه ها جدا شد. پارامترهای بیو شیمیایی سرمه شامل آلائین آمینوترانسفراز، آسپارت آمینوترانسفراز، فسفاتاز قلیایی، فسفر، کلسیم، گلوکر، بیلی روپین کونژگه و بیلی وردین به روش رنگ سنجی BIOWAVE و با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر S2100 ساخت کشور انگلستان و با استفاده از کیتهای اختصاصی ساخت شرکت زیست شیمی اندازه گیری شدند. داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ویرایش ۱۴ تحت ویندوز XP مورد

۶-*hydroxytetracycline* می باشد (۶ و ۸). تفاوت این دارو با داروهای هم گروه خود مربوط به جنبه های فارماکوکینیتیک، مکانیسم اثر و طیف اثر وسیع این دارو است. این دارو برخلاف تتراسایکلین های دیگر دارای اثرات چلالته کنندگی کمتری بوده و بیشتر چربی دوست می باشد. جذب گوارشی بهتر و قابلیت دسترسی حیاتی بالاتر از ۵۰٪ دارد (۶ و ۸). این دارو جزو آنتی بیوتیک های نسل جدید بوده و یک داروی باکتریواستات وسیع الطیف که بر روی باکتریهای گرم مثبت، گرم منفی، هوازی، بیهوازی، ریکتزا، کلامیدیا و مایکوپلاسما و برخی پروتوزواها موثر است (۶، ۸ و ۹). در مصرف خوراکی دارو حداقل دوز سرمی بعد از ۶ ساعت ایجاد می شود (۶ و ۱۵). دارو با مکانیسم انتشار در باکتری وارد و به زیر واحد های ۳۰S ریبوزوم متصل می شود. در نتیجه از اتصال آمینواسید به مجموعه ریبوزوم و mRNA جلوگیری کرده و مانع سنتز پپتید می شود (۶، ۱۳، ۱۰ و ۱۱). بعد از جذب از روده ۴۰ تا ۸۰ درصد به پروتئین های سرم متصل می شود. این دارو در کبد متابولیزه شده و سپس از راه صفرا دفع می شود. قسمت کمی از دارو دوباره باز جذب شده و سیکل کبدی-روده ای را تشکیل می دهد. این دارو برخلاف بقیه داروهای خانواده تتراسایکلین با مکانیسم غیر کلیوی دفع می شود، بنابراین نبایستی اثرات کلیوی داشته باشد (۱۷).

داکسی سایکلین در صنعت ماکیان بعنوان یک داروی انتخابی در مقابله با بیماری CRD-Complex بوده و بعنوان درمان قطعی بیماری کلامیدیوز در انسان و ماکیان توصیه شده است (۱۸ و ۱۹). عوارض جانبی ناشی از مصرف داکسی سایکلین از جمله حساسیت به نور، کولیک، ناراحتی های گوارشی، آنمی، التهاب مری و اثوزینوفیلی در انسان گزارش شده است (۱۲، ۱۱ و ۱۰). اما در دامپزشکی مطالعاتی انجام نگرفته است. با توجه به میزان شیوع بالای CRD-Complex در منطقه شمال غرب کشور و نیز استفاده وسیع از این

محسوب نمی‌شود. چراکه در بیماری‌های عضلانی پرندگان نیز افزایش می‌یابد (۴ و ۵). چون این آنژیم بعد از تجویز دارو افزایش آماری معنی دار نشان داده و از آنجاییکه متابولیسم دارو در کبد انجام می‌گیرد شاید بتوان گفت که استفاده طولانی از این دارو می‌تواند باعث آزردگی سلولهای کبدی گردد. افزایش AST در پرندگان بیشتر در آسیبهای عضلات اسکلتی، قلب و کبد AST گزارش شده است (۴ و ۵). در این مطالعه افزایش همراه با افزایش ALT می‌باشد که می‌توان آسیب کبدی ناشی از تجویز داکسی سایکلین را عامل افزایش دانست. چون دارو از طریق کبد متابولیزه و دفع می‌شود (۶ و ۸). Randall و همکاران (۱۹۹۹) افزایش آنژیمهای کبدی و ایجاد سمیت کبدی را بعد از مصرف داکسی سایکلین در خرگوش گزارش کردند (۱۶). Westerman و همکاران در سال ۲۰۰۱ افزایش مقادیر سرمی ALT و ایجاد آنمی را بعد از مصرف این Po-lin دارو در انسان گزارش نمودند (۱۹). نتایج مطالعه و همکاران در سال ۲۰۰۷ نشان داد که تجویز داکسی سایکلین در درمان تب Q انسان موثر بوده و تغییری در مقادیر سرمی ALT و AST و بیلی رویین ایجاد نمی‌کند (۱۴). در این مطالعه میانگین مقادیر سرمی کلسیم کاهش آماری معنی داری بعد از تجویز دارو نشان می‌دهد و مقدار آن کاهش می‌یابد در حالیکه میانگین مقادیر سرمی فسفاتار قلیایی در گروه تیمار نسبت به گروه شاهد افزایش آماری معنی داری نشان می‌دهد. میزان سرمی فسفر نیز اختلاف معنی داری بعد از تجویز دارو نشان نمی‌دهد.

کلسیم و فسفر دو عنصر مرتبط به هم می‌باشند که بیشترین میزان آنها در استخوان قرار دارد (۵).

آنالیز آماری قرار گرفته و برای مقایسه میانگین پارامترهای سرمی از آزمون آماری T-test استفاده گردید.

نتایج

میانگین مقادیر سرمی ALP، AST، فسفر، کلسیم، گلوکز، بیلی رویین کونژگه و بیلی وردین در گروه‌های شاهد و تیمار در جدول ۱ ذکر شده است. مقایسه میانگین سرمی ALT و AST بعد از تجویز دارو در گروه تیمار نسبت به گروه شاهد افزایش آماری معنی داری نشان می‌دهد ($P < 0.05$). بررسی میانگین مقادیر سرمی فسفاتار قلیایی در گروه تیمار نسبت به گروه شاهد افزایش آماری معنی داری نشان می‌دهد ($P < 0.05$). در حالیکه میانگین مقادیر سرمی کلسیم کاهش آماری معنی داری نشان داد ($P < 0.05$) و مقدار آن بعد از تجویز دارو کاهش یافت. میزان سرمی فسفر اختلاف معنی داری نشان نمی‌دهد ($P > 0.05$). میانگین میزان سرمی بیلی رویین گونژوکه و بیلی وردین بعد از تجویز دارو در گروه تیمار نسبت به گروه شاهد افزایش آماری معنی داری نشان داد ($P < 0.05$). در مقایسه میانگین میزان سرمی گلوکز بعد از تجویز دارو اختلاف آماری معنی داری بین گروه تیمار و شاهد مشاهده نشد ($P > 0.05$).

بحث

میانگین سرمی ALT و AST بعد از تجویز دارو در گروه تیمار نسبت به گروه شاهد افزایش آماری معنی داری نشان می‌دهد ($P < 0.05$). افزایش فعالیت ALT سرم در اختلالات کبدی پرندگان شکاری، ماکیان، اردک و طوطی گزارش شده است (۴ و ۵) ولی در پرندگان یک آنژیم اختصاصی و حساس برای کبد

جدول شماره ۱ - میانگین میزان سرمی پارامترهای بیوشیمیایی در گروه‌های شاهد و تیمار

گروه	پارامتر	ALT IU/L	AST IU/L	ALP IU/L	فسفر mg/dl	کلسیم mg/dl	گلوکز mg/dl	بیلی رویین mg/dl	بیلی وردین mg/dl
شاهد		۸۳/۴۴±۱۲/۷۷ ^a	۱۰۲/۳۶±۵/۳۸ ^a	۱۷۶/۶۰±۱۳/۶ ^a	۳/۷۳±۰/۶۵ ^a	۱۰/۷۹±۰/۸ ^a	۳۸۱/۲۸±۴/۳۸ ^a	۰/۱۶±۰/۰۵ ^a	۰/۵۵±۰/۰۳ ^a
تیمار		۱۶۸/۴۷±۱۴/۷۶ ^b	۱۹۹/۹۱±۱۰/۰۸ ^b	۲۵۱/۲۶±۲۲/۱ ^b	۴/۰۸±۰/۷۱ ^a	۱۰/۲۷±۰/۱۴ ^b	۳۸۵/۸۷±۱/۶ ^a	۰/۳۵±۰/۰۵ ^b	۰/۷۸±۰/۰۷ ^b

(P<0.05) حروف غیر مشابه در هر ستون نشان دهنده وجود اختلاف آماری معنی دار (P<0.05)

می‌گیرد و شاید علت افزایش مقادیر سرمی این پارامترها ناشی از اختلال در عمل کونژوگه شدن و یا برداشته شدن بیلی وردین و یا عدم دفع بیلی روین کونژوگه باشد. تاکنون مطالعه‌ای در خصوص تاثیر این دارو بر روی پارامترهای بیوشیمیایی در ماکیان انجام نگرفته است اما Paul و همکاران (۲۰۰۵) و Westermann و همکاران (۲۰۰۱) افزایش بیلی روین را بعد از مصرف دارو در انسان گزارش کرده اند (۱۹۱۳).

می‌توان نتیجه گرفت که داروی داکسی سایکلین در صورتی که با توصیه دامپزشک و نیز تست آنتی بیو گرام مورد مصرف قرار گیرد داروی بسیار خوبی به شمار می‌رود ولی در صورت استفاده بی رویه و طولانی مدت می‌تواند آسیب کبدی و استخوانی ایجاد کرده و زمینه را برای دیگر بیماری‌ها فراهم کند.

منابع

- ۱- جردن، اف. تی. پاتیسون، م (۱۳۷۷): بیماریهای ماکیان، ترجمه بزرگمهری فرد م، اقتصاد کوثر.
- ۲- رجب، الف. افشار مازندران، ن (۱۳۸۱): تجویز صحیح آنتی بیوتیک در درمان بیماریهای ماکیان، نوربخش.
- ۳- قمیریان، ع (۱۳۸۴): داروهای دامپزشکی نهاده‌های تغذیه‌ای دام و ماکیان، قمیریان.
- ۴- مجتبی، ع (۱۳۷۹): بیوشیمی درمانگاهی دامپزشکی، انتشارات نوربخش، دوم.
- ۵- نظری، س (۱۳۷۶): هماتولوژی و بیوشیمی بالینی پرندگان، انتشارات دانشگاه شیراز.
- 6- Allen, Pringle. And Simith., (1998). Hand book of veterinary Drug. P.145-170
- 7- Amendola, M.A., Spera, T.D.,(1995): Doxycycline-induced esophagitis. Journal of the. American Medical Association, 253: 1009 11.

در زمانی که به هر دلیلی کمبود کلسیم در بدن ایجاد شود عوامل مهم هورمونی و ویتامینی می‌توانند میزان آنها را در بدن تحت کنترل در آورند. مهمترین هورمون، پاراتورمون است که می‌تواند برداشت استخوانی کلسیم و فسفر را بیشتر کرده و از طرف دیگر در کلیه اثر و میزان جذب کلسیم و همچنین دفع فسفر را بیشتر نماید. این هورمون می‌تواند سنتر متابولیت فعال ویتامین D را در کلیه افزایش دهد که این ویتامین نیز باز جذب کلسیم در روده را افزایش می‌دهد (۵)، در صورتی که برداشت کلسیم از استخوان باشد فعالیت استئوکلاستها در آنجا بیشتر شده و آنزیم فسفاتاز قلیایی بیشتر می‌شود (۵). تجویز داروی داکسی سایکلین به مرور باعث کاهش کلسیم می‌شود که ناشی از اتصال این دارو به کلسیم می‌باشد اما تغییر قابل توجه‌ای در مقدار فسفر ایجاد نمی‌کند (۳، ۸ و ۱۷). افزایش فسفاتاز قلیایی شاید به علت افزایش آیزوآنزیم‌های استخوانی و کبدی این آنزیم باشد. می‌توان نتیجه گرفت دارو با اتصال به کلسیم، میزان جذب آنرا کاهش داده و برداشت استخوانی آن بیشتر می‌شود و همزمان آنزیم فسفاتاز قلیایی با منشاء استخوانی افزایش می‌یابد. از طرف دیگر دارو در کبد متابولیزه شده و از راه صفراء دفع می‌شود که می‌تواند باعث آسیب کبد و افزایش فسفاتاز قلیایی با منشاء کبدی شود.

مقایسه میانگین میزان سرمی گلوکز بعد از تجویز دارو اختلاف آماری معنی‌داری بین گروه تیمار و شاهد نشان نداد. با توجه به عدم تغییرات سرمی در گلوکز می‌توان نتیجه گرفت که دارو باعث تغییرات سیستم آندوکرینی لوزالمعده نمی‌شود.

میانگین میزان سرمی بیلی روین کونژوگه و بیلی وردین، بعد از تجویز دارو در گروه تیمار نسبت به گروه شاهد افزایش آماری معنی‌داری نشان داد. این افزایش در میزان سرمی بیلی روین کونژوگه و بیلی وردین نیز ممکن است در ارتباط با کبد باشد. عمل کونژوگه شدن دارو و دفع آن از طریق کبد انجام

- 8- Anadon, M., (1994): Pharmacokinetics of doxycycline in broiler chickens. Avian pathology.19-90
- 9- Ak,S. and Turan. N., (2001): Antimicrobial susceptibility of *Ornithobacterium rhinotracheale* isolated from broiler chickens in Turkey.Veterinarsky Arhiv,71,3:121-127.
- 10- Ghani, F., Iqbal, T., Shahid,M.,(2003): Renal Clearance of Endogenous Creatinine and Doxycycline in Male Volunteers. Journal of Medical Sciences. 3: 283-288.
- 11- Henderson,CA.,Cunliffe,W.J.,(1989): Unusual side-effects in patients receiving doxycycline. J Dermatol Treat.1.95:6.
- 12- Lobel,H.O., Kozarsky,P.E.,(1997):Update on prevention of malaria for travelers. JAMA. 278.17:67-71.
- 13- Paul,N.N., Jean,C., Arjen,D., Alan,B., Ronatrai,R., Cyril,M., Wirongrong,C., Sornchai. L., Nicholas, J.W.,(2005): Pharmacokinetics of Oral Doxycycline during Combination Treatment of Severe Falciparum Malaria.Antimicrobial agents and Chemotherapy.49.4:1622–1625.
- 14- Po-Lin, C., Nan-Yao, L. and Wen-Chien K(2007): Acute Q Fever with Jaundice and Pleuritis Refractory to Doxycycline or Levofloxacin Monotherapy A Case Report J Intern Med Taiwan.18:371-374.
- 15- Prevosto, J. M., B. Beraud, V. Cheminel, Y. Gaillard, C. Mounier, and J. F. Chaulet.,(1995): Determination of doxycycline in human plasma and urine samples by high performance liquid chromatography. Application for drug monitoring in malaria chemoprophylaxis. Ann. Biol. Chem. 53:29–32.
- 16- Randall, E., Mitchem, D., Betty, L. ,Herndon, P., Russell, M. ,Fiorella, M.,(1999): Pleurodesis by autologous blood, doxycycline, and talc in a rabbit model. The Society of Thoracic Surgeons.67:917-921 .
- 17- Santos, H., Remon, p., (1997): Administration of doxycycline Hcl via drinking water to Turkey under laboratory and field conditions-Poultry Science.38.132-140.
- 18- Tariq,M., Ehab, A., (2005): Pharmacokinetics and bioequivalence of Doxycycline oral powder formulation in chickens. International journal of Poultry Science.54.161-164
- 19- Westermann ,G. W., Böhm, M., Bonsmann ,G., Rahn, K. H., Kisters, K.,(2001): Chronic intoxication by doxycycline use for more than 12 years.246.6: 591-592.

