

گزارش یک مورد آبسه عقده لنفاوی عقب حلقی (*Retropharyngeal lymph node abscess*) در کره



دوره سیزدهم، شماره یک، بهار و تابستان ۱۴۰۱

حمید توانایی منش^۱، زهرا شهبازی^{۲*}

۱. استادیار بخش بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، ایران

۲. دانشجوی دکتری حرفه‌ای دامپزشکی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، ایران

d.z.shahbazi@gmail.com

دریافت مقاله: ۱۷ تیر ۱۴۰۰؛ پذیرش نهایی: ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

آبسه عقده لنفاوی عقب حلقی در اسب‌ها در اثر عوامل مختلفی، غالباً استرپتوکوکوس اکوئی ایجاد می‌شود. این آبسه‌ها در موارد شدید می‌توانند تنفس اسب را با مشکل مواجه سازند و علاوه بر آن با گسترش عفونت می‌توانند منجر به عوارض سیستمیک دیگری نیز شوند. یک راس کره مادیان ۸ ماهه با علائم آبریزش بینی و عدم بلع (دیسفاژی) با علائم عمومی طبیعی ارجاع داده شد که با وجود درمان کوتاه مدت آنتی بیوتیک، علائم مجدد عود پیدا کرده بود. با شک بر وجود آبسه در ناحیه حلقی، رادیوگراف جانبی از ناحیه حلق اخذ گردید و در ناحیه عقب حلقی، توده بزرگ با دانسیته بافت نرم دیده شد. با توجه به سیر یافته‌های بالینی و تایید تشخیص وجود آبسه در ناحیه مذکور توسط رادیوگراف، اقدام به آنتی بیوتیک تراپی طولانی به مدت ۲۰ روز گرفته شد که پس از آن بهبودی در این مورد حاصل گردید.

واژگان کلیدی: آبسه عقده لنفاوی عقب حلقی، اسب، رادیوگرافی، تنفس