

# بررسی تأثیر دو فرمولاسیون سم کالیپسو روی کرم سیب در استان آذربایجان شرقی

علیرضا پور حاجی<sup>۱</sup>

## چکیده

کرم سیب *Cydia pomonella* L.، آفت کلیدی باغات سیب می باشد که هر سال چندین بار سوم مختلف علیه این آفت به کار گرفته می شود. به منظور دست یابی به یک حشره کش جدید و مؤثر روی این آفت و جایگزین کردن آن به جای سوم کم اثر، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۶ تیمار در چهار تکرار انجام گرفت. در این آزمایش کارایی سه دز ۳۰۰، ۴۰۰ و ۶۰۰ پی پی ام حشره کش جدید کالیپسو او- دی به همراه فرمولاسیون اس- سی کالیپسو با دز ۳۰۰ پی پی ام و سم آزینفوس مตیل ای- سی با دز ۲۰۰۰ پی پی ام (به عنوان تیمار استاندارد) در مقایسه با تیمار شاهد (بدون سم پاشی) مورد ارزیابی قرار گرفت. آماربرداری یک روز قبل و ۳، ۷، ۱۴ و ۲۵ روز بعد از هر نوبت سم پاشی از میوه های ریخته شده هر کرت انجام گرفت و در بیست و پنجمین روز آخرین سم پاشی ضمن جمع آوری و شمارش میوه های پای درختان هر کرت و شمارش تعداد میوه های سالم و کرومی روی هر درخت، آماربرداری کامل گردید. درصد تأثیر تیمارهای مختلف نسبت به شاهد بر اساس تعداد کل میوه های سالم و آلوده ریزش کرده و روی درخت به وسیله فرمول اشنایدر- اورلی محاسبه گردید. نتایج نشان داد که بین تیمارهای سم پاشی شده و شاهد از لحاظ درصد میوه سالم و بین تیمارهای سم پاشی شده از لحاظ درصد تأثیر در سطح احتمال ۱٪ اختلاف معنی دار وجود دارد. مقایسه میانگین داده ها در سطح احتمال ۱٪ نشان داد که از لحاظ درصد میوه های سالم و درصد تأثیر، تمام دزهای کالیپسو او- دی و کالیپسو اس- سی در یک سطح (به ترتیب a, ab) آزینفوس متیل در سطح b و شاهد در سطح c قرار گرفت. نتایج نشان داد که هر دو فرمولاسیون سم کالیپسو با تمام دزهای مورد آزمایش بیشتر از سم استاندار منطقه (آزینفوس متیل) در کاهش میزان آلودگی مؤثرند، در نتیجه این سم می تواند با این دزها جایگزین سوم متدائل منطقه شود.

واژه های کلیدی: کالیپسو، آزینفوس متیل، کرم سیب، آذربایجان شرقی

تاریخ دریافت مقاله: ۸۶/۵/۲۶ تاریخ پذیرش: ۸۶/۲/۲۸

۱. عضو هیأت علمی بخش تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

a\_pourhaji@yahoo.com

#### مقدمه

تأثیر اوکلتین در اوایل فصل عليه لاروهای نئونات به خصوص در گلابی قابل قبول بوده است (۱۱). اگرچه حشره کش های فسفره پر مصرف ترین گروه حشره کش ها در باغات میوه دانه دار در سراسر جهان و به خصوص غرب ایالات متحده امریکا هستند (۹) ولی بروز مقاومت در کرم سیب و لاروهای برگ خوار پروانه ها به این گروه از سموم در باغات میوه دانه دار غرب امریکا به اثبات رسیده است (۱۲، ۱۵، ۱۸). و در جنوب شرقی فرانسه نیز مواردی از کاهش اثر سموم فسفره و پیروتیروتیدی علیه کرم سیب تشخیص داده شده است (۱۰). البته مقاومت این آفت در مقابل تنظیم کننده های رشد از جمله دیفلوبنزرون (دیمیلن) نیز در تعدادی از باغات ایتالیا مشاهده گردیده (۱۶) و در باغات جنوب فرانسه مقاومت به دیفلوبنزرون در یکی از جمعیت های این آفت ۳۷۰ برابر بیشتر از جمعیت های حساس بود (۱۷).

بروز مقاومت در جمعیت های کرم سیب به سموم رایج، انگیزه آزمایش و ثبت سموم جدید از جمله سموم متعلق به گروه کلرونیکوتینیل بر علیه این آفت شد بر این اساس استامپراید ترکیب تازه ای از گروه کلرونیکوتینیل، متوكسی فنوزاید<sup>۱</sup> از گروه تنظیم کننده های رشد و اسپینوزاد<sup>۲</sup> ترکیب حاصل از تخمیر میکروبی، سه ماده شیمیایی جدید جایگزین حشره کش های فسفره هستند که در حال حاضر برای مصرف در باغات واشنگتن به ثبت رسیده اند (۱۴) مقایسه تأثیر دو حشره کش جدید تیاکلوپراید<sup>۳</sup> و نووالرون<sup>۴</sup> با سم متدائل (آزینفوس متیل) نشان داد که

کرم سیب با نام علمی *Cydia pomonella* (Linnaeus)، یکی از آفات کلیدی باغات سیب می باشد و در صورت عدم کنترل آن خسارت سنگینی به این محصول وارد می کند. در کشور ما استفاده از آفت کش ها کارامدترین و متدائل ترین روش مبارزه با این آفت می باشد، به طوری که همه ساله در چند نوبت و در سطوح وسیع علیه آن سم پاشی می شود. آزینفوس متیل<sup>۱</sup> از جمله حشره کش هایی است که از زمان معرفی آن در اوایل ۱۹۶۰ در سطح وسیعی از باغات سیب و گلابی مورد استفاده قرار گرفته (۸) و به دلیل دارا بودن دوره تأثیر طولانی هنوز هم در برنامه مدیریت آفات سیب جایگاه نسبتاً ثابتی دارد (۱۱). مقایسه کارایی سم ایمیدان<sup>۲</sup> با آزینفوس متیل و دیازینون<sup>۳</sup> نشان داد که این سم بعد از آزینفوس متیل اثر قابل توجهی در کنترل این آفت دارد (۵). در بررسی چند سم جدید در کنترل این آفت، فرمولاسیون جدید فن پروپاترین<sup>۴</sup> (دانیتول اف-۱۰٪) کارایی بیشتری در مقایسه با سموم ایندوساکارب<sup>۵</sup>، استامپراید<sup>۶</sup>، هگزافلومورون<sup>۷</sup> و لوفنورون<sup>۸</sup> از خود نشان داد (۴). تنظیم کننده های رشد شامل دیفلوبنزرون<sup>۹</sup>، تری فلومورون<sup>۱۰</sup>، کلرفلوازورون<sup>۱۱</sup>، تفلوبنزورون<sup>۱۲</sup> در شرایط آزمایشگاهی و صحراوی علیه کرم سیب مؤثر شناخته شده اند و

1 - Azinphos methyl

2- Imidan

3- Diazinon

4- Fenpropathrin

5- Indoxacarb

6- Acetamiprid

7- Hexaflumuron

8- Lufenuron

9- Diflubenzuron

10- Triflumuron

11- Chlorfluazuron

12- Teflubenzuron

1- Methoxyfenozide

2- Spinosad

3- Thiacloprid

4- Novaluron

- ۳- تیاکلوپراید (کالیپسو او- دی ۲۴۰) ۰/۶ در هزار، ساخت شرکت بایر
- ۴- تیاکلوپراید (کالیپسو اس- سی ۴۸۰) ۰/۳ در هزار، ساخت شرکت بایر
- ۵- شاهد (آب پاشی)
- ۶- آزینفوس متیل (آزینفوس متیل ای- سی ۲۰٪) ۰/۳ در هزار، فرموله شده در شرکت بهاور شیمی هر واحد آزمایش (کرت) شامل چهار اصله درخت بود. درختان تیمارهای سم پاشی با دزهای مورد نظر روز یازدهم خرداد ماه سال ۱۳۸۵ علیه نسل اول کرم سیب که زمان دقیق آن با استفاده از تله های فرمونی تعیین شده بود، سم پاشی گردیدند. یک روز قبل از سم پاشی ۳، ۷، ۱۴ و ۲۵ روز بعد از سم پاشی میوه های ریخته شده پای هر درخت جمع آوری و ضمن تعیین تعداد کل آن ها، تعداد میوه های کرمونیز مشخص گردید. بعد از سم پاشی علیه نسل دوم و سوم آفت به ترتیب در روزهای بیست و چهارم تیر ماه و بیست و هفتم مرداد ماه سال ۱۳۸۵، مشابه نسل اول، میوه های ریخته شده پای هر درخت در روزهای پیش بینی شده جمع آوری و در بیست و پنجمین روز بعد از آخرین سم پاشی ضمن جمع آوری و شمارش میوه های پای درختان هر کرت و شمارش تعداد میوه های سالم و کرمونی هر درخت، آمار برداری تکمیل گردید. سپس با استفاده از فرمول اشنایدر- اورلی<sup>۱</sup>
- $A/B \times 100 = \text{درصد میوه های سالم}$

$$\frac{b-k}{100-k} \times 100 = \text{درصد تأثیر}$$

تأثیر هر دوی آن ها مشابه آزینفوس متیل می باشد و به طور معنی داری بهتر از شاهد عمل می کنند (۶)، هم چنین در باغات سیب شهرستان مرند، دزهای مختلف سم تیاکلوپراید با دز ۱/۵ در هزار سم فوزالون<sup>۱</sup> در یک سطح قرار گرفته اند (۲) و در باغات سیب ارومیه این سم با دز ۰/۳ در هزار، همراه سوموم آزینفوس متیل، فن پروپاترین و استامیپراید کارایی خوبی در کنترل آفت داشت (۱). در این بررسی کارایی دو فرمولا سیون حشره کش جدید کالیپسو با نام عمومی تیاکلوپراید از گروه کلرو نیکوتینیل با خواص تماسی، گوارشی و سیستمیکی و مؤثر روی حشرات مکننده و جونده با خواص منحصر به فرد خود، نظیر بی خطر بودن برای زنبور عسل، سمیت کم برای پستانداران، عدم ایجاد گیاه سوزی، مقاومت در برابر باران شویی و تابش نور خورشید و هم چنین مؤثر بر حشرات مقاوم شده در برابر حشره کش های کلره، فسفره، پایروترونیدی و کارباماتی، (۷) به همراه سم آزینفوس متیل در کاهش جمعیت کرم سیب، در منطقه خسرو شهر استان آذربایجان شرقی در سال ۱۳۸۵، مورد ارزیابی قرار گرفت.

## مواد و روش ها

- این بررسی در یکی از باغات سیب منطقه خسرو شهر انجام گرفت. باغ مزبور به چهار بلوک تقسیم و هر بلوک به شش تیمار ذیل تقسیم گردید:
- ۱- تیاکلوپراید (کالیپسو او- دی ۲۴۰) ۰/۴ در هزار، ساخت شرکت بایر
- ۲- تیاکلوپراید (کالیپسو او- دی ۲۴۰) ۰/۵ در هزار، ساخت شرکت بایر

نشان داد که بین تیمارها در سطح احتمال یک درصد اختلاف معنی‌دار وجود دارد و این نشان دهنده این واقعیت است که بین تیمارهای سم‌پاشی و شاهد و هم‌چنین درون تیمارهای سم‌پاشی اختلاف معنی‌دار وجود دارد. چون هدف از انجام این تحقیق تعیین سوموم شیمیایی مؤثر روی آفت هدف بود، لذا مقایسه میانگین‌های درصد تأثیر و درصد میوه‌های سالم در سطح احتمال یک درصد با آزمون چند دامنه‌ی دانکن برای نسل‌های اول و دوم و سه نسل آفت انجام گرفت. مقایسه میانگین درصد تأثیر تیمارهای سم‌پاشی در هر دو مقایسه (جداول ۹ و ۱۰) نشان داد که تمام دزهای مورد آزمایش سم جدید و ثبت‌نشده کالیپسو او- دی و سم کالیپسو اس- سی در یک سطح قرار می‌گیرند و با تأثیر ۸۵ درصدی، کارایی خوبی در کاهش جمعیت این آفت دارند، این نتیجه با نتایج اکبرزاده و کلیائی (۱)، پور حاجی (۲) و برخی محققین خارجی از جمله آلستون و لیندستورم (۶) و دانلی و گرین فیلد (۱۳) مطابقت دارد. مشابه بودن نتایج تأثیر این دو سم نشان داد که نوع فرمولاسیون این سم (او- دی و اس- سی) کارایی آن را در کنترل کرم سبب تحت تأثیر قرار نمی‌دهد و تنها کم خطر بودن هر کدام از آن‌ها برای محیط زیست می‌تواند عامل رجحان باشد. در این بررسی آزینفوس متیل بر خلاف نتایج حاصل از آزمایشات کاظمی (۵)، دانلی و گرین فیلد (۱۳) و آلستون و لیندستورم (۶)، با تأثیر ۴۶/۷۵ و ۴۲/۳۳ درصدی، کارایی خوبی در کاهش میزان آلودگی از خود نشان نداد که احتمالاً به دلیل فرمولاسیون نامناسب این سم و یا بروز مقاومت به این سم در اثر استفاده طولانی مدت از آن بر علیه این آفت می‌باشد که هر دو مورد احتیاج به بررسی‌های تکمیلی دارد.

A: تعداد میوه‌های سالم در هر کرت  
B: تعداد میوه‌های سالم و کرم‌موی همان کرت  
b: درصد میوه‌های سالم در تیمار سم‌پاشی  
k: درصد میوه‌های سالم در تیمار شاهد (آب) درصد میوه‌های سالم و درصد تأثیر هر یک از تیمارهای سمی نسبت به تیمار شاهد محاسبه گردید (۳). از آن‌جا که میوه‌های چند کرت یک تکرار بعد از سم‌پاشی نسل سوم برداشت شد برای افزایش دقت تجزیه و تحلیل‌های آماری، درصد تأثیر و درصد میوه‌های سالم تیمارهای مورد آزمایش یک بار با چهار تکرار برای نسل اول و دوم و یک بار با سه تکرار (بدون تکرار برداشت شده) برای هر سه نسل آفت محاسبه گردید.

کلیه محاسبات آماری شامل تجزیه واریانس و مقایسه میانگین‌ها با استفاده از نرم افزار آماری MSTATC انجام گرفت. برای مقایسه میانگین‌ها از آزمون چند دامنه‌ی دانکن در سطح احتمال ۰.۱٪ استفاده گردید.

## نتیجه و بحث

تعداد کل میوه‌های کرم‌مو و سالم ریخته شده پای درختان در طول مدت آزمایش در جداول ۱ و ۲ آورده شده است. در جدول شماره ۱ آمار مربوط به نسل اول و دوم آفت در چهار تکرار ولی در جدول شماره ۲ علاوه بر آمار نسل اول و دوم، آمار نسل سوم در سه تکرار به همراه تعداد و درصد میوه‌های آلدوه و سالم روی درختان در آخر فصل آورده شده است.

با استفاده از این داده‌ها، درصد تأثیر و درصد میوه‌های سالم محاسبه شد (جداول ۳ و ۴). تجزیه واریانس درصد تأثیر و درصد میوه‌های سالم نسل‌های اول و دوم (جداول ۵ و ۶) و سه نسل (جداول ۷ و ۸)

سم پاشی های مرتب علیه سه نسل کرم سیب باعث شده بود که جمعیت دیگر آفات از جمله شته ها و مینوزها و نیز دشمنان طبیعی به قدری کاهش پیدا کنند که غیر قابل نمونه برداری شوند و در طول مدت آزمایش هیچ خسارتی از این آفات دیده نشد و از دشمنان طبیعی فقط کفش ذک های شکارگر جنس *Stethorus* (شکارگر کنه ها) در اواخر فصل (نیمه دوم شهریور ماه) کم و بیش در روی درختان تمام تیمارها مشاهده شد.

### سپاسگزاری

بدین وسیله از زحمات آقای دکتر شیردل به خاطر ویراستاری متن و خانم پرنیان به خاطر تایپ مقاله تشکر و قدردانی می شود.

در صد میوه های سالم در نسل های اول و دوم و سه نسل در تیمار شاهد به ترتیب ۵۷/۵ و ۳۸ درصد بود (جداول ۱۱ و ۱۲) و این نشان می دهد که در صورت عدم کنترل این آفت، بیش از ۵۰ درصد محصول از آزمایش و باغات اطراف به طور مرتب بر علیه سه نسل آفت سم پاشی می شدن و در صورت عدم سم پاشی مرتباً باغات منطقه، احتمال افزایش آسودگی از میزان برآورد شده خیلی بیشتر است. بنابراین استفاده از سم کالیپسو با بیش از ۸۵ درصد تأثیر، می تواند نتیجه مطلوبی در کاهش خسارت آفت به همراه داشته باشد با توجه به این که در این بررسی فقط کارایی این سم در کاهش جمعیت کرم سیب مورد ارزیابی قرار گرفته است و جهت بررسی مسایل زیست محیطی آن باید بررسی های لازم در شرایط منطقه با توجه به دز مصرفی و دفعات سم پاشی انجام گیرد.

جدول ۱- تعداد میوه‌های سالم و آلوده هر کرت (چهار درخت) در نسل‌های اول و دوم

تعداد میوه‌های رُوی درخت	تعداد میوه‌های افتاده در نسل اول		تعداد میوه‌های افتاده در نسل دوم		تیمار* تکرار
	سالم	آلوده	سالم	آلوده	
۶۵۳۹	۱۶۸	۳۴۷	۷۸	۴۶	T1R1
۲۷۳۲	۲۵۰	۱۶۵	۷۰	۱۸	T1R2
۲۹۷۰	۱۱۱	۲۵۲	۴۹	۷۰	T1R3
۸۴۶۳	۲۳۰	۶۱۴	۱۹۷	۱۷	T1R4
۴۷۹۴	۱۷۳	۲۹۳	۴۲	۷۸	T2R1
۳۸۸۸	۲۱	۷۱	۵۶	۲۳	T2R2
۷۸۲۲	۱۸۶	۷۱۲	۱۷۲	۱۷۸	T2R3
۲۷۱۰	۶۲۷	۲۱۲	۷۳۷	۲۵	T2R4
۵۹۰۹	۸۱	۲۷۶	۳۲	۲۵	T3R1
۶۹۰	۲۳۶	۳۷	۰	۰	T3R2
۳۸۱۵	۴۹	۱۰۹	۴۷	۳۱	T3R3
۸۸۰۱	۲۷۵	۳۹۹	۴۴۷	۳۳	T3R4
۲۲۱۳	۶۹	۹۲	۳۷	۱۳	T4R1
۱۶۰۸	۲۰۵	۳۱	۳	۱۴	T4R2
۵۳۶۱	۱۳۲	۳۱۴	۱۱۹	۷۸	T4R3
۲۲۵۱	۲۰	۴۳	۱۵	۹	T4R4
۲۳۵۷	۲۸۸	۷۳۷	۱۶	۳۹	T5R1
۹۲۵	۸۴	۱۲۷۷	۶۰	۶۳	T5R2
۱۲۷۳	۷	۸۳۸	۴۳	۱۹	T5R3
۲۷۲۷	۱۱۱	۳۲۴۲	۳۹۶	۹۴	T5R4
۲۲۰۱	۸۳	۴۹۳	۲۱	۴۴	T6R1
۲۰۲۴	۱۷۱	۳۶۲	۲۳	۱۷	T6R2
۳۸۹۸	۱۴۲	۱۶۳۲	۱۱۸	۱۲۵	T6R3
۸۶۸۹	۴۳۵	۱۴۷۰	۸۶۱	۵۷	T6R4

جدول ۲- تعداد میوه‌های سالم و آلوده هر کرت (چهار درخت) در سه نسل

تعداد میوه‌های سالم روی درخت	تعداد میوه‌های آلوده	درصد میوه‌های آلوده	تعداد میوه‌های روی درخت	تعداد میوه‌های افتاده		تعداد میوه‌های افتاده		تعداد میوه‌های افتداده در نسل اول		تیمار* تکرار
				در نسل سوم	در نسل دوم	در نسل دوم	در نسل اول			
۵۶۶۴	۲۲۶	۴	۵۹۰۰	۴۷۸	۱۶۱	۱۶۸	۳۴۷	۷۸	۴۶	T1R1
۲۴۹۹	۵۱	۲	۲۵۵۰	۲۳۹	۸۱	۱۱۱	۲۵۲	۴۹	۷۰	T1R2
۷۶۰۰	۴۰۰	۵	۸۰۰۰	۲۹۳	۱۷۰	۲۳۰	۶۱۴	۱۹۷	۱۷	T1R3
۴۳۶۵	۱۳۵	۳	۴۵۰۰	۲۴۹	۴۵	۱۷۳	۲۹۳	۴۲	۷۸	T2R1
۷۰۳۰	۳۷۰	۵	۷۴۰۰	۲۷۲	۱۵۰	۱۸۶	۷۱۲	۱۷۲	۱۷۸	T2R2
۲۰۶۴	۸۶	۴	۲۱۵۰	۴۱۰	۱۵۰	۶۲۷	۲۱۲	۷۳۷	۲۵	T2R3
۵۱۴۱	۱۰۹	۳	۵۳۰۰	۴۶۸	۱۴۱	۸۱	۲۷۶	۳۲	۲۵	T3T1
۳۴۷۴	۷۱	۲	۳۵۰۰	۲۲۳	۴۲	۴۹	۱۰۹	۴۷	۳۱	T3R2
۸۳۳۰	۱۷۰	۲	۸۰۰۰	۱۰۲	۱۴۹	۲۷۵	۳۹۹	۴۴۷	۳۳	T3R3
۵۰۲۷	۶۳	۳	۲۰۹۰	۱۰۴	۱۹	۶۹	۹۲	۳۷	۱۳	T4R1
۴۹۹۶	۱۰۴	۳	۵۱۰۰	۱۴۶	۶۵	۱۳۲	۳۱۴	۱۱۹	۷۸	T4R2
۲۰۹۳	۸۷	۴	۲۱۸۰	۵۸	۱۳	۲۰	۴۳	۱۰	۹	T4R3
۱۳۸۹	۱۷۰	۱۱	۱۰۵۰	۶۷	۴۷۰	۲۸۸	۷۳۷	۱۶	۳۹	T5R1
۷۲۹	۶۸	۸	۸۶۰	۱۳	۴۰۰	۷	۸۳۸	۴۳	۱۹	T5R2
۷۰۵	۷۵	۹	۸۳۰	۴۷	۱۸۵۰	۱۱۱	۳۲۴۲	۳۹۶	۹۴	T5R3
۱۵۸۴	۶۶	۴	۱۶۵۰	۳۲۳	۲۲۸	۸۳	۴۹۳	۲۱	۴۴	T6R1
۲۹۴۵	۱۰۰	۵	۳۱۰۰	۱۶۱	۶۳۷	۱۴۲	۱۶۳۲	۱۱۸	۱۲۵	T6R2
۶۸۵۳	۸۴۷	۱۱	۷۷۰۰	۴۶۷	۵۲۲	۴۳۵	۱۴۷۰	۸۶۱	۵۷	T6R3

جدول ۳- تعداد میوه‌های سالم و آلوده و درصد تأثیر تیمارهای مختلف در نسل‌های اول و دوم

تیمار* تکرار	میوه‌های آلوده	تعداد میوه‌های سالم	تعداد میوه‌های آلوده و سالم	مجموع میوه‌های آلوده و سالم	درصد تأثیر درصد تأثیر درصد تأثیر درصد تأثیر درصد تأثیر درصد تأثیر	میانگین درجه‌های تبدیل شده Arcsine $\sqrt{x}$
T1R1	۳۹۳	۶۷۸۵	۷۱۷۸	۹۴	۷۳	۵۸/۷
T1R2	۱۸۳	۳۰۵۲	۳۲۳۵	۹۴	۸۹	۷۰/۶
T1R3	۳۲۲	۳۱۳۰	۳۴۵۲	۹۰	۷۵	۶۰
T1R4	۶۳۱	۸۸۹۰	۹۵۲۱	۹۳	۸۶	۶۸
T2R1	۳۷۱	۵۰۰۹	۵۳۸۰	۹۳	۶۹	۵۶/۲
T2R2	۹۴	۳۹۶۵	۴۰۵۹	۹۷	۹۴	۷۵/۸
T2R3	۸۹۰	۸۱۸۰	۹۰۷۰	۹۰	۷۵	۶۰
T2R4	۲۳۷	۴۰۷۴	۴۳۱۱	۹۴	۸۸	۶۹/۷
T3R1	۳۰۱	۶۰۲۲	۶۳۲۳	۹۵	۷۸	۶۲
T3R2	۳۴	۹۲۶	۹۶۰	۹۶	۹۲	۷۳/۲
T3R3	۱۹۰	۳۹۱۱	۴۱۰۱	۹۵	۸۷	۶۸/۲
T3R4	۴۳۲	۹۵۲۳	۹۹۵۰	۹۵	۹۰	۷۱/۶
T4R1	۱۰۵	۲۳۱۹	۲۴۲۴	۹۵	۷۸	۶۲
T4R2	۴۵	۱۸۱۶	۱۸۶۱	۹۷	۹۲	۷۳/۶
T4R3	۳۹۲	۵۶۱۲	۶۰۰۴	۹۳	۸۲	۶۴/۹
T4R4	۵۲	۲۲۸۶	۲۳۳۸	۹۷	۹۴	۷۵/۸
T5R1	۷۷۶	۲۶۶۱	۳۴۳۷	۷۷		
T5R2	۱۳۴۰	۱۰۶۹	۲۴۰۹	۴۴		
T5R3	۸۰۷	۱۳۲۳	۲۱۸۰	۶۰		
T5R4	۳۳۳۶	۳۲۳۴	۶۵۷۰	۴۹		
T6R1	۵۳۷	۲۳۰۵	۲۸۴۲	۸۱	۱۷	۲۴/۴
T6R2	۳۷۹	۲۲۱۸	۲۵۹۷	۸۵	۷۳	۵۸/۷
T6R3	۱۷۵۷	۴۱۵۸	۵۹۱۵	۷۰	۲۵	۳۰
T6R4	۱۵۲۷	۹۹۸۵	۱۱۵۱۲	۸۶	۷۲	۵۸/۱

جدول ۴- تعداد میوه‌های سالم و آلوده و درصد تأثیر تیمارهای مختلف در سه نسل

تیمار*	تعداد میوه‌های آلوده	تعداد میوه‌های سالم	مجموع میوه‌های آلوده و سالم	درصد میوه‌های سالم	درصد تأثیر	میانگین درصد تأثیر	داده‌های تبدیل شده	Arcsine $\sqrt{x}$
T1R1	۷۹۱	۶۳۸۸	۷۱۷۹	۸۹	۷۵	۷۰	۶۰	
T1R2	۴۵۴	۲۹۹۸	۳۴۵۲	۸۶	۷۷	۷۱/۳	۶۱/۳	۷۸
T1R3	۱۲۰۱	۸۳۲۰	۹۵۲۱	۸۷	۸۳	۶۵/۶		
T2R1	۵۵۱	۴۸۲۹	۵۳۸۰	۸۹	۷۵	۶۰		
T2R2	۱۴۱۰	۷۶۶۰	۹۰۷۰	۸۴	۷۳	۵۸/۷	۷۸	
T2R3	۴۷۳	۳۸۳۸	۴۳۱۱	۸۹	۸۶	۶۸		
T3R1	۶۰۱	۵۷۲۲	۶۳۲۳	۹۰	۷۷	۶۱/۳		
T3R2	۳۰۳	۳۷۹۸	۴۱۰۱	۹۲	۸۶	۶۸	۸۴	
T3R3	۷۵۱	۹۲۰۴	۹۹۵۵	۹۲	۹۰	۷۱/۶		
T4R1	۱۸۷	۲۲۳۷	۲۴۲۴	۹۲	۸۲	۶۴/۹		
T4R2	۶۱۱	۵۳۹۳	۶۰۰۴	۸۹	۸۱	۶۴/۲	۸۴	
T4R3	۱۵۲	۲۱۸۶	۲۳۳۸	۹۳	۹۱	۷۲/۵		
T5R1	۱۴۱۶	۱۷۵۱	۳۱۶۷	۹۵				
T5R2	۱۳۲۵	۸۰۵	۲۱۸۰	۹۹				
T5R3	۵۲۶۱	۱۳۰۹	۶۵۷۰	۹۰				
T6R1	۸۳۱	۲۰۱۱	۲۸۴۲	۷۰	۲۳	۳۵/۱		
T6R2	۲۵۴۹	۳۳۶۶	۵۹۱۵	۵۶	۲۷	۳۱/۳	۴۲	
T6R3	۲۸۹۶	۸۶۱۶	۱۱۵۱۲	۷۴	۶۷	۵۴/۹		

جدول ۵- تجزیه واریانس درصد تأثیر سوم مورد آزمایش در نسل‌های اول و دوم کرم سیب

منابع تغییر	درجه آزادی	میانگین مربعات درصد تأثیر
کل	۱۹	
تیمارها	۴	۱۱۳۳/۱۷**
بلوک‌ها	۳	۷۷۳/۳۸**
خطا	۱۲	۱۰۳/۶۷

CV=٪۱۳/۳۲

پور حاجی، ع. بررسی تأثیر دو فرمولاسیون سم کالیپسو...

جدول ۶- تجزیه واریانس درصد میوه‌های سالم در نسل‌های اول و دوم کرم سیب

منابع تغییر	درجه آزادی	میانگین مربعات درصد تأثیر
کل	۲۳	
تیمارها	۵	۹۰۵/۱۶**
بلوک‌ها	۳	۴۰/۱۱**
خطا	۱۵	۴۷/۰۱

CV=٪۸

جدول ۷- تجزیه واریانس درصد تأثیر سموم مورد آزمایش در سه نسل کرم سیب

منابع تغییر	درجه آزادی	میانگین مربعات درصد تأثیر
کل	۱۴	
تیمارها	۴	۹۴۲/۷۶**
بلوک‌ها	۲	۳۶۵/۲۶*
خطا	۸	۶۰/۲۶

CV=٪۱۰/۵۶

جدول ۸- تجزیه واریانس درصد میوه‌های سالم در سه نسل کرم سیب

منابع تغییر	درجه آزادی	میانگین مربعات درصد تأثیر
کل	۱۷	
تیمارها	۵	۱۳۵۱**
بلوک‌ها	۲	۶۹/۵۰ ns
خطا	۱۰	۶۸/۶۳

CV= ٪۱۰/۷۶

جدول ۹- مقایسه میانگین درصد تأثیر سموم روی کرم سیب نسل‌های اول و دوم

تیمار	۶	۱	۲	۴	۳
درصد تأثیر	۴۶/۷۵	۸۰/۷۵	۸۱/۵۰	۸۶/۵۰	۸۶/۷۵
سطح تیمار	b	a	a	a	a

جدول ۱۰- مقایسه میانگین درصد تأثیر سموم روی کرم سیب در سه نسل

تیمار	۶	۲	۱	۳	۴
درصد تأثیر	۴۲/۳۳	۷۸	۷۸/۳۳	۸۴/۳۳	۸۴/۶۷
سطح تیمار	b	a	a	a	a

جدول ۱۱- مقایسه میانگین درصد میوه‌های سالم روی کرم سیب در نسل‌های اول و دوم

تیمار	۵	۶	۱	۲	۳	۴
درصد میوه‌های سالم	۵۷/۵۰	۷۹/۵۰	۹۲/۷۵	۹۳/۵۰	۹۵/۲۵	۹۵/۵۰
سطح تیمار	c	b	ab	ab	a	a

جدول ۱۲- مقایسه میانگین درصد میوه‌های سالم روی کرم سیب در سه نسل

تیمار	۵	۶	۱	۲	۳	۴
درصد میوه‌های سالم	۳۸	۶۶/۶۷	۸۷/۲۳	۸۷/۳۳	۹۱/۳۳	۹۱/۳۳
سطح تیمار	c	b	a	a	a	a

## منابع

- اکبرزاده شوکت، غ. و ر. کلیائی. ۱۳۸۶. بررسی کارایی چند حشره‌کش جدید روی کرم سیب در باغات سیب ارومیه. مجله دانش کشاورزی، جلد ۱۷، شماره ۱، صفحات ۱۱۹-۱۲۶.
- پور حاجی، ع. ۱۳۸۲. بررسی اثر دزهای مختلف سم کا لیپسو (SC ۴۸۰) روی کرم سیب در استان آذربایجان شرقی. هفتمین همایش منطقه‌ای کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، ۴ صفحه.
- حاتمی، ب. ۱۳۷۰. راهنمای آزمایشات صحرایی در گیاه‌پزشکی. ۲۲۳ صفحه.
- جوادزاده، م. پور حاجی، ع. و ر. کلیائی. ۱۳۸۱. بررسی اثر چند حشره‌کش جدید در کنترل کرم سیب (*Cydia pomonella* L.) در ایران. خلاصه مقالات پانزدهمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران، ۱۶ تا ۲۰ شهریور، دانشگاه رازی کرمانشاه، صفحه ۱۴۷.

۵- کاظمی، م.ح. ۱۳۵۹. تعیین میزان کارایی سم ایمیدان بر علیه کرم سیب. مجله آفات و بیماری‌های گیاهی، جلد ۴۸، شماره ۲، صفحات ۱۶۵ - ۱۵۵.

- 6- Alston, D. G., and T. Lindstrom. 2003. Codling moth control in apple. Proceeding of the 77 Annual Western Orchard Pest & Disease Management Conference, January 15-17, Portland Washington, U.S.A, p.60.
- 7- Anonymous. 2000. Calypso, common name thiacloprid, systemic insecticides for foliar application against sucking and important biting pests. Bayer corp science.21pp.
- 8- Barnes, M. M., and H. R. Moffitt. 1963. Resistance to D.D.T in the adult codling moth and referenc curves for guthion and carbaryl. Journal of Economic Entomology 56: 722-725.
- 9- Beers, E. H., and J. F. Brunner. 1991. Washington state apple and pear pesticide use survey, 1989-1990. Report to USDA- NAPIAP, 79 pp.
- 10-Bouvier, J. C., V. Brosse, and B. Sauphanor. 1995. Insecticide resistance in the codling moth. Rov. Agri. Entomol. Vol. 89(3):316.
- 11-Croft, B. A., and H. W. Riedl. 1992. Chemical control and resistance to pesticides of the codling moth. In: Van L. P. S der Geest and Evenbuss J. J. (Eds.): Tortricid pestes: Their biology, natural enemies and control. Elsevier, Amsterdam pp, 371-387.
- 12-Dunley, J. E., J. F. Brunner, M. D. Doerr, and E. H. Beers. 2001. Baseline insecticide tolerance and cross-resistance in oblique banded leafroller and pandemic leafroller (Lepidoptera: Tortricidae). Preceding of the 75<sup>th</sup> Annual Western Orchard Pest & Disease Management Conference, January 10-12, Portland, Washington, U.S.A, pp. 115-116.
- 13-Dunley, J. E., and B. M. Greenfield. 2003. New insecticides for control of codling moth. Proceeding of the 77<sup>th</sup> Annual Western Orchard Pest & Disease Management Conference January 15-17, Portland, Washington, U.S.A, p. 62.
- 14-Granger, K. R., J. F. Brunner, and M. D. Doerr. 2003. Managing codling moth with new insecticides: Assail, Interpid and Success. Proceeding of the 77<sup>th</sup> Annual Western Orchard Pest and Disease Management Conference, January 15-17, Portland, Washington, U.S.A., p. 61.
- 15-Knight, A. L, J. F. Brunner, and D. G. Alston. 1994. Survey of azinphosmethyl resistance in codling moth (Lepidoptera: Tortricidae) in Washington and Utah. Journal of Economic Entomology. 87(2): 285-292.
- 16-Riedl, H. 1995. First results of studies on resistance of codling moth to diflubenzuron. Rev. Agri. Entomol. 83(7): 762-770.
- 17-Sauphanor, B.,and J. C. Bouvier. 1995. Cross- resistance between benzoyluras and benzoyl hyrazines in the codling. Pesticide science. 45(4): 369-735.
- 18-Valera ,L. G., S. C. Welter, V. P. Jones, J. F. Brunner, and H. Riedl.1993. Monitering and characterization of insecticide resistance in codling moth (Lepidoptera: Torticidae) in four Western States. Journal of Economic Entomology. 86(1): 1-10.