

مقایسه هیستوپاتولوژیک الگوی جدید بخیه با بخیه تشکی سرتاسری

مهدی مرجانی^{۱*}، سام امیر گودرزی^۲، رضا صداقت^۳

۱- گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج- ایران.

۲- دانش آموخته دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، تهران- ایران.

۳- گروه پاتوبیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران- ایران.

*نویسنده مسئول: mzmarjani@gmail.com

Histopathologic comparison of new suture pattern with continuous mattress suture

Marjani, M.^{1*}, Amirgoodarzi, S.², Sedaghat, R.³

¹Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Karaj-Iran. ²Graduated of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Faculty of Veterinary Medicine, Karaj-Iran. ³Department of Pathological Sciences, Faculty of Medicine, Shahed Medical University, Tehran- Iran.

Abstract

In this study the new suture pattern compared with continues horizontal mattress suture by histopathologic evaluation. In 8 New Zealand white rabbits weighing 2-3 Kg weight, both sides of spinal cord, shaved and disinfected for surgery. 10X1 cm flaps of skin in both sides removed and one side sutured by new pattern and the other side sutured by continues horizontal mattress pattern. Then in 1, 3, 7, 10, 14, 21 days after surgery 2X2 cm pieces of surgical area took for histopathology observations and measured by standard healing factors. Measurement results analyzed with Mann-Whitney U test ($P<0.05$).

Results showed no significant difference in histopathology, but in performing 10 cm new suture pattern significantly consumed less time than routine pattern. Plus in consumption of materials, results illustrated that routine method was taken less material to perform 10 cm suture.

With some of these results and privileges it is assumed for new pattern, like enhanced security, easy to perform and suture removal is faster and easier, new suture pattern suggest for skin sutures. *Vet.J.of Islamic.Azad.Univ., Garmser Branch. 4,1:7-11,2008.*

Key words: Suture pattern, Continuous horizontal mattress suture, Healing, Rabbit.

بیشتر و راحت تر باشد مورد استفاده قرار می گیرد و برای نیل به این انتخاب لازم است الگوهای متفاوت با یکدیگر مقایسه شوند و براساس فاکتورها و الگوهای خاصی ارزیابی گردند. یکی از معیارهای خوب و مناسب ارزیابی در این زمینه بررسی روند التیام بافت و فاکتورهای هیستوپاتولوژیک است که با کمک آنها می توان به یک جمع بندی کلی در مورد یک الگوی بخیه رسید. بعلاوه فاکتور زمان بخیه که خود روزی زمان بیهوشی تاثیر گذار

چکیده

در این پژوهش یک نوع الگوی جدید بخیه از لحاظ فاکتورهای هیستوپاتولوژیک با الگوی تشکی افقی سرتاسری بررسی می شود. ۸ سرخرگوش نر سفید نیوزیلندي با وزن تقریبی ۲-۳ کیلوگرم تهیه و دو طرف فرستون مهره آنها را شیده و ضد عفونی شد. سپس آویخته ای به ابعاد ۱ در ۱۰ سانتی متر از پوست دو طرف برداشت و دو لبه شکاف یک سمت با بخیه جدید و طرف دیگر با بخیه تشکی افقی سرتاسری بخیه شد. سپس در روزهای ۳, ۷, ۱۰, ۱۴, ۲۱, ۱, ۲۱ پس از عمل نمونه هایی با ابعاد ۲ در ۲ سانتی متر برای بررسی های هیستوپاتولوژی برداشت و از نظر فاکتورهای استاندارد التیام بافت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بوسیله آزمایش من و بنتی یو تست مورد آنالیز آماری قرار گرفت. نتایج هیچ تفاوت معنی داری در فاکتورهای التیام نشان نداد ولی ($P>0.05$) در فاکتورهای جراحی زمان انجام بخیه برای ۱۰ سانتی متر سرعت بالاتری را نسبت به روش متداول به طور معنی دار نشان داد. همچنین میزان مصرف فنخ در این آزمایش به طور معنی داری نسبت به روش متداول بیشتر بود.

با توجه به نتایج بدست آمده و امتیازاتی مانند امنیت بالاتر بخیه، سهولت اجرا و سرعت انجام بخیه، حداقل زمان لازم برای کشیدن بخیه و موارد دیگر، پیشنهاد می شود روش والگوی جدید بخیه در موارد بستن شکاف های پوست مورد استفاده قرار گیرد. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، ۱۳۸۷، دوره ۴، شماره ۱۱-۱۰، ۷-۶.

واژه های کلیدی: الگوی بخیه، بخیه تشکی افقی سرتاسری، التیام، خرگوش.

مقدمه

الگوهای مختلف و متنوعی برای بستن پوست و شکاف های جراحی مورد استفاده قرار می گیرد که هر یک دارای مزایا و معایب می باشند ولی با توجه به تجربه جراح، نوع بافت، میزان کشش ناحیه ای، وسعت شکاف و عوامل بسیار دیگر انتخاب الگوی بخیه صورت می گیرد. بدون شک الگوی بخیه ای که دارای مزایای



کردن از امتیازات روش معمول بخیه تشکی صرفه جویی کرده و همینین پس از بهبودی کمتر اسکار نا مطلوب از خود بر جای می‌گذارد(۴).

با نوجه به تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده سعی شد بررسی الگوی جدید بخیه نیز در راستای موارد ذکر شده صورت پذیرد.

مواد و روش کار


در این مطالعه از ۸ سر خرگوش سفید بیوزلنندی نر با وزن تقریبی بین ۲ تا ۳ کیلوگرم استفاده شد. خرگوشها پس از تهیه به محیط نگهداری منتقل گردیدند و در طی ۱۳ روز جهت ارزیابی سلامت و درمان ضد انگلی بررسی شدند. آماده سازی قبل از عمل توسط آسپرومایزین (۰/۲ تولید کارخانه HOOGSTRATE) به میزان ۵-۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و به شکل تزریق داخل عضلانی انجام شد. سپس خرگوشها به شکل خوابیده روی شکم روی میز جراحی کاملاً مقید شده و دو طرف ستون مهره‌ها تراشیده و توسط بتادین رقیق شده ضد عفونی و آماده شدند. بعد از مرحله القای بیهوشی توسط تزریق داخل عضلانی ترکیب زایلازین (xylazin) با نام تجاری رامپون (۰/۲٪ ساخت شرکت ALFASAN هلند) و کتامین (۱۰٪ ساخت شرکت ALFASAN) هر یک به مقدار مساوی به میزان ۰/۳ میلی لیتر انجام شد. برای انجام تحقیق در دو طرف ستون مهره‌ها خرگوش‌ها ابتدا برش‌های مشابه به طول ۱۰ سانتی‌متر روی پوست انجام شد. پس از برداشت آویخته پوستی، دو لبه شکاف توسط بخیه تشکی افقی در یک سمت در سمت مقابل با بخیه روشن جدید بسته شد. الگوی بخیه معرفی شده جدید مانند دوخت چرخ خیاطی است. برای انجام این بخیه از سرسوزن تزریق متصل به سرنگ که سایزوترومای حاصله از آن در بافت مشابه سوزن بخیه پوست است استفاده شده و نخ از وسط سوزن عبور می‌کند. ابتدا سوزن از طرف راست شکاف ضمن عبور از دو لایه به طرف چپ حرکت می‌کند و یک رشته نخ بلندتر از طول شکاف در سمت چپ باقی می‌ماند. سپس سر سوزن از همان سوراخ ایجاد شده به سمت راست برگشته و دوباره همان مراحل عبور به فاصله یک سانتی‌متر دورتر از سوراخ اول تکرار شده و حلقه‌هایی در سمت چپ تشکیل که نخ سمت چپ از آنها عبور داده می‌شود. درنهایت در سمت چپ گره باروش متداول بخیه می‌شود. در این حالت الگوی حاصله مانند دوخت چرخ خیاطی برروی لبه پارچه خواهد بود.

خواهد بود، سهولت انجام بخیه و نقش ایجاد کشش مناسب و قرار گرفتن لبه‌های شکاف در یک امتداد هم از دیگر معیارهای سنجش و ارزیابی دو نوع بخیه می‌باشد. یکی از بخیه‌های متداول در جراحی دامپزشکی و مخصوصاً دامهای بزرگ بخیه تشکی افقی می‌باشد که در پوست تحت کشش کاربرد گسترده‌ای دارد (۱،۶،۸). در اینجا برخی از تحقیقات انجام شده در مورد مقایسه الگوهای مختلف بخیه بیان می‌شود.


توسط فیک و همکاران (۲۰۰۵) (بررسی هیستوپاتولوژی چهار نوع مواد و الگوی بخیه مختلف روی پوست بدن خوک انجام گرفت. ابتدا چهار برش موازی روی پوست ایجاد و انواع مختلف الگوهای بخیه آزموده شد. سپس در روزهای ۷، ۱۴، ۲۱ و ۴۲ و نمونه‌ها برداشت شد. نتایج حاکی از آن بود که استاپل های فلزی التهاب گسترده‌تری را نسبت به روش‌های بخیه با نخ پلی گلایکن ۹۱٪ ایجاد می‌کنند (۲). تاوب و همکاران (۱۹۸۳) همراه با تجربه برروی ۱۶۹ بیمار که برای جراحی‌های فتق مغابنی، برداشت آپاندیس و لیگاتور سافنو فمورال مراجعه کرده بودند در یافتن که روش‌های جدید بخیه با استفاده از ترکیب بخیه زیر پوستی و نوار چسب‌های نازک (micro pore tape) نسبت به روش‌های رایج ارجحیت‌هایی از لحاظ فاکتورهای زیبایی دارند همچنین این نوار زخم را پوشانده و بهبودی را برای بیمار قابل تحمل ترمی می‌کند (۷).

سیلوسترو همکاران (۲۰۰۲) در دانشکده دامپزشکی دانشگاه گوئلف - اونتاریو بر روی سگهای اواریو یوسترکتومی شده نشان دادند که استفاده از الگوی بخیه (BCS) subcuticular Buried continuous و کاربرد هر دو نخ بخیه قابل جذب و غیرقابل جذب علی‌رغم وجود واکنش بافتی در بخیه BCS نسبت به هر دو نوع ماده مورد استفاده در روش ساده تک در روز دهم به بعد اثرات زخم آلود کمتری از خود در محل برش بر جای گذاشت (۵). کرونیک و همکاران (۲۰۰۵) تحقیقی در مورد روش جدیدی از ترکیب دو روش بخیه ساده سرتاسری نسبت به روش معمول بخیه تشکی عمودی تک و سرتاسری انجام دادند. در این بررسی مشخص شد روش جدید سریع تر و راحت تر قابل انجام است و همچنین با وجودی که روش تشکی عمودی پوست را بالا می‌کشد بخیه ساده میانی باعث می‌شود که لبه‌های پوست نزدیک تر به قرار گرفته و جلوی عدم تطابق لبه‌های زخم را می‌گیرد. از طرفی کشیدن بخیه برای جراح بدليل نصف بودن لوپها راحت تر و سریعتر است و درد کمتری نیز بیمار طی آن تحمل می‌کند. این روش در وقت جراح بدون کم







تصویر ۲: فتو میکروگراف پرست خرگوش در گروه آزمایش روز ۷، در خط



تصویر ۳: نمونه‌های جدید. این تصویر مثالیک (تصویر سمت راست و سمت) کاربرد آن ادریت (میکروجیب) در تلاص بوسنی خرگوش.




تصویر شماره ۵: فتو میکروگراف پرست خرگوش در گروه آزمایش روز ۲۱. بوسنی کامل مشخص است در خط پوشش صهابه بوسنی ازین وقت که در خط پوشش صهابه بوسنی ازین وقت است مدت بوسنی کامل است. افت همسه بر سلول دیده شود (هماتوکسیلین و اوزن ۱۰۰ X) ترمیم بافت همسه بر سلول دیده من شود و شته های کلازن مستحثت صهابی تشکیل نداده اند (هماتوکسیلین و اوزن ۱۰۰ X).



تصویر شماره ۶: فتو میکروگراف پرست خرگوش در گروه آزمایش در روز ۱۰. در این صورتی بوسنی ازین وقت زمانه باست بوسنی کامل تشکیل شده است. بافت بوسنی کنلاستکیل شده، داده هم پذیر مخلول است و دستگاه ران بافت همسه بر عارق و سلول به ظاهری زند (هماتوکسیلین و اوزن ۱۰۰ X) تشکیل شده است. هنوز تشکیل شناخته شده است (هماتوکسیلین و اوزن ۱۰۰ X).

پایینی شکاف در نخ سمت چپ برش داده شده و رشته نخ سمت چپ بطور کامل بیرون کشیده شود (شکل ۱).

در روزهای ۱، ۷، ۱۰، ۱۴، ۲۱ پس از عمل نموده هایی با ابعاد ۲ در ۲ سانتی متر از محل بخیه و بافت اطراف آن برای بررسی های هستوپاتولوژی برداشت و از نظر فاکتورهای استاندارد التیام بافت و بررسی فراگرفت. برش های تهیه شده با متغیرهای معمول و خاردادی روند التیام رخ مانند زمان لازم برای تشکیل و کامل شدن مجدد بافت پوششی، وسعت التهاب، شدت التهاب، آنزیوژن، میزان فیبروپلازی و زمان لازم برای التیام کامل رخ مطالعه شدند و مورد ارزیابی بافت شناختی قرار گرفتند. برای این منظور در هر برش در نواحی مورد نظر حدائق ۱۰ میدان میکروسکوپی بازرسگ نمایی ۴۰۰ برابر تهیه، درجه بندی و میانگین



تصویر ۷: فتو میکروگراف بوسنی خرگوش گرد، آزمایش در روز ۱۶، بافت برای کشیدن بخیه کافی است یا فیجي طریف بخش بالایی و



دیده نمی شد.

در روز چهارده پس از عمل در گروه آزمایش بافت پوششی کاملاً تشکیل شده، رشته های کلازن در دو طرف برش دستجات نازکتری داشت و بافت همبند پرسلوول به نظر می رسید و در مجموع التیام متوسط بود.

در روز ۲۱ پس از عمل در گروه آزمایش در خط برش ضمائم پوستی از بین رفته بودند و اثری از التهاب نبود عروق خونی چندان دیده نمی شد کلازن خوب تشکیل شده بود ولی دسته های ضخیم تشکیل نشده بود. سلول ها هنوز زیاد بودند و التیام متوسط تا خوبی دیده می شد بعلاوه در خط برش ضمائم از بین رفته و بافت پوششی کاملاً تشکیل شده و اثری از التهاب دیده نمی شد. در گروه کنترل در روز ۲۱ علیرغم تشکیل مجدد بافت پوششی هنوز آثار التهاب خفیف و عروق خونی دیده می شد و رشته های کلازن چندان دستجات ضخیمی را تشکیل نداده بودند که در مجموع التیام متوسط ارزیابی شد.

نتایج آماری حاصل از پژوهش: نتایج حاصل از مشاهدات هیستوپاتولوژیک مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس آن تجزیه و تحلیل آماری انجام شد. در این بخش نمونه های دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند و نتایج مقادیر آنها مورد مقایسه قرار گرفت. در روش آماری Mann Whitney U نتایج نشان داد که در فاکتورهای مختلف التیام تفاوت معنی داری یافت نشد.

بحث و نتیجه گیری

با توجه به تحقیقات گسترده در بستن شکاف های جراحی پیشرفت های شکر فی در حال انجام است و محققان روش های نوین و جدیدی را مطرح می کنند. در این راستا ارائه الگوهای جدید بخیه نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و در این تحقیق نیز الگوی جدیدی ارائه شده که با روش مشابه مقایسه شده است و بر اساس آن مزايا و معایب این الگوبرشمده می شود.

در تحقیق کرونیک و همکاران (۲۰۰۵) از ترکیب دوروش بخیه استفاده شد و با روش معمول بخیه تشکیل شده عمودی تک مقایسه شد. روش جدید امتیازاتی مانند سرعت، سهولت کاربرد، درد کمتر در زمان کشیدن بخیه و راحتی در خذف بخیه هارا به همراه داشت. در الگوی معرفی شده حاضر نیز این مواد مد نظر و مقایسه قرار گرفت و این بخیه نیز همان امتیازات را به همراه داشت.^(۴)

در بررسی های ال فلیک و همکاران چهار نوع روش مختلف بخیه در روزهای مختلف از نظر روند التیام بافتی مورد ارزیابی قرار

آنها تعیین شد. تغییرات مشاهده شده از صفر تا ۳ درجه بندی شد. درجه صفر نشانه عدم مشاهده تغییر، درجه ۱ نشان دهنده تغییرات خفیف، درجه ۲ بیانگر تغییرات متوسط، و درجه ۳ معرف تغییرات شدید بود.

همچنین فاکتورهای جراحی طول مصرف نخ و زمان اجرای بخیه برای انجام ۱۰ سانتیمتر بخیه در پوست مورد ارزیابی قرار گرفت و داده های آن ثبت و نتایج مورد آزمون آماری قرار گرفت. یافته های بدست آمده از مشاهدات هیستولوژیک بصورت اعداد صفر تا ۳ در جداولی ثبت شدوا این داده ها همراه داده های جراحی با استفاده از آزمون Mann Whitney U test با فرض $P < 0.05$ مورد آنالیز آماری قرار گرفتند.

نتایج

نتایج هیستو پاتولوژیک: پس از نمونه گیری و آماده سازی نمونه ها از لحاظ فاکتورهای التیام مورد بررسی قرار گرفتند که در ذیل به نتایج حاصله پرداخته می شود:

در گروه آزمایش در روز اول ضمایم پوستی از بین رفته و scab شکاف برش و هماتوم دیده شد. در گروه کنترل نیز هماتوم و scab دیده شد. در روز سوم در گروه آزمایش هنوز رشته های کلازن نوع I توسعه چندانی نیافته بود و در خط برش بیشتر شکاف ناشی از برش و آثار هماتوم و سلولهای التهابی دیده می شد. در روز ۷ بعد از عمل در گروه آزمایش در خط برش ضمایم پوستی از بین رفته و بافت پوششی کاملاً تشکیل شده بود و بافت همبند التیامی کاملاً پر عروق و پرسلوول مشاهده شد. در گروه کنترل هم در روز ۷ پس از عمل ضمایم پوستی از بین رفته و بافت پوششی کامل تشکیل شده بود. بعلاوه بافت همبند التیامی پر عروق و پرسلوول و رشته های همبندی ظریف با ارتضاح بسیار خفیف سلولهای آمازی ملاحظه شد.

در روز دهم پس از عمل در گروه آزمایش بافت پوششی کاملاً تشکیل شده و ضمایم پوستی از بین رفته بود و بافت التیامی هنوز پرسلوول و پر عروق به نظر می رسید و بافت همبند التیامی در محل برش اگرچه کمی پرسلوول به نظر می رسید ولی اثری از التهاب مشاهده نمی شد و رشته های کلازن دستجات ضخیم تری را تشکیل داده بودند. در گروه کنترل در روز دهم پس از عمل در محل برش، ضمایم پوست از بین رفته و بافت پوششی تشکیل شده بود که بافت پوششی کامل و بصورت artifact جدا گشته بود. بافت همبند هم هنوز پرسلوول و پر عروق بود ولی اثر چندانی از التهاب



References

- Chernosky, M.E.(1987) Scalpel and scissors surgery as seen by the dermatologist. In: Epstein E, Epstein E Jr, eds. Skin surgery. 6th ed. Philadelphia, Saunders: 88-127.
- Fick, J. L., Roberto, E., Novo, M.S, Nicole, K.(2005) Comparison of gross and histologic tissue responses of skin incisions closed by use of absorbable subcuticular staples, cutaneous metal staples, and polyglactin 910 suture in pigs. American Journal of Veterinary Research November, **66**(11): 1975-1984.
- Kinmon, K.J., Rosen, R.G., Perler, A.D.(2003) The Roussel stitch: a new evertting skin closure technique. J Foot Ankle Surg, **42**:244-6.
- Krunic, A.L., Weitzul, S., Taylor, R.S.(2005) Running Combined Simple and Vertical Mattress Suture: A Rapid Skin-Everting Stitch by the American Society for Dermatologic Surgery. Dermatol Surg, **31**:1325-1329.
- Sylvestre, A., Wilson, J., Hare, J.(2002) A comparison of 2 different suture patterns for skin closure of canine ovario-hysterectomy. Can Vet J, **43**(9):699-702.
- Schlegel, T.F., Hawkins, R.J., Lewis, C.W.(2007) An in vivo comparison of the modified Mason-Allen suture technique versus an inclined horizontal mattress suture technique with regard to tendon-to-bone healing: A biomechanical and histologic study in sheep. Journal of Shoulder and Elbow Surg, **16**: 115-121.
- Taube, M., Porter, R.J., Lord, P.H.(1983) A combination of subcuticular suture and sterile Micropore tape compared with conventional interrupted sutures for skin closure. A controlled trial. Ann R Coll Surg Engl, **65**(3):164-167.
- Zuber, T.J.(1998) Skin biopsy, excision, and repair techniques. In: Soft tissue surgery for the family physician (illustrated manuals, videotapes, and CD-ROMs of soft tissue surgery techniques). American Academy of Family Physicians:100-106.

گرفت و نتایج متنوع حاصله از نظر هیستوپاتولوژی جالب و متنوع بود. در این تحقیق مدل حیوانی خوک مد نظر قرار گرفت و تفاوت‌ها از نظر شدت التهاب قابل توجه بود. در این بررسی نیز خرگوش با توجه به امکانات نگهداری مورد استفاده قرار گرفت و شدت التهاب نیز جزء فاکتورهای مقایسه‌ای بود.

در روش جدید تاوب و همکاران (۱۹۸۳) امتیازات حاصله از نظر روند بهبودی در بیماران از ترکیب بخیه زیرپوستی و نوار چسب‌های نازک موردارزیابی قرار گرفت و در بررسی حاضر نیز مشخص شد که روند بهبودی مطلوب و رضایت‌بخش بوده است (۷).

در الگوی جدید معرفی شده مشاهدات ماکروسکوپیک حاکی از آن بود که بخیه‌ها بعلت هماهنگی بیشتر با بافت و فشار متعادل تر در حین روند بهبودی از لحاظ زیبایی ظاهر بهتری داشته و بخیه بدلیل کم بودن دستکاری هنگام برداشت درد کمتری را به بیمار تحمیل می‌کند.

علیرغم تفاوت‌های کوچک در روزهای مختلف بدلیل استفاده از مواد بخیه یکسان بخیه مورد آزمایش نسبت به بخیه کنترل تفاوت چندانی از لحاظ فاکتورهای هیستوپاتولوژیک از خود نشان نداد و با توجه به نتایج بدست آمده تفاوت معنی داری بین روش فوق و روش تشکی یافتن نشد. علاوه‌بر نتایج هیستوپاتولوژی نشان داد که علی‌رغم این که این روش دو طرف زخم را بطور یکسان تحت کشش قرار می‌دهد ولی از لحاظ فاکتورهای بهبودی تفاوت معنی داری را نشان نداده و با توجه به نگهداری بهتر به های زخم در کنار یکدیگر و اعمال فشار یکسان این روش به عنوان یک روش جایگزین و جدید برای بخیه‌های پوست می‌تواند مطرح باشد. روش‌های جدید بدون بخیه مانند بستن پوست با کمک لیزر و چسب‌های زیست ساز گاراگره روش‌هایی سریع و بعضًا قابل اعتماد هستند ولی به علت هزینه بالا و همچنین کاربری پیچیده در سطح گسترده و مخصوصاً در بخش دامپزشکی هنوز قابل استفاده و کاربردی نیستند. در یک نتیجه گیری کلی می‌توان گفت الگوی جدید بخیه معرفی شده دارای سرعت بیشتر و سهولت انجام بوده و سبب کاهش دوره بیهوشی و تقلیل زمان کشیدن بخیه می‌شود و می‌توان از آن به عنوان یک الگوی جدید مخصوصاً در بستن شکاف‌های پوستی دامهای بزرگ نیز استفاده نمود.

