

جداسازی و ردیابی مایکوپلاسمای سینوویه از مزارع مرغ مادر دارای واکنش مثبت سریع سرمی با استفاده از روش کشت و واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

هادی حق بین نظرپاک^۱، سید علی پوربخش^{۲*}، سعید چرخکار^۳، نریمان شیخی^۳، عباس اشتاری^۴

- ۱- دانشجوی دوره دکترای تخصصی بیماریهای طیور - دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - تهران - ایران .
۲- دانشیار گروه پاتوبیولوژی دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - تهران - ایران .
۳- دانشیار علوم درمانگاهی دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - تهران - ایران .
۴- کارشناس آزمایشگاه رفائلس مایکوپلاسمای - موسسه تحقیقات و اکسن و سرم سازی رازی - کرج - ایران .

*نویسنده مسئول: a.pourbakhsh@rvsri.ir

دریافت مقاله: ۱۵ تیر ۸۸ پذیرش نهایی: ۲۱ دی ۸۸

Isolation and detection of Mycoplasma synoviae from seropositive rapid reaction broiler breeder flocks by polymerase chain reaction and culture methods

Haghbin Nazarpak, H.¹, Pourbakhsh, S. A.^{2*}, Charkhkar, S.³, Sheikhi, N.³, Ashtari, A.⁴

¹ Ph.D Student of Poultry Diseases, Faculty of Specialized Veterinary Sciences, Sciences & Researches Branch, Islamic Azad University , Tehran-Iran. ²Associate Professor of Department of Pathobiology, Faculty of specialized veterinary sciences, Sciences & Researches Branch, Islamic Azad University, Tehran-Iran. ³Associate Professor of Department of Clinical Sciences, Faculty of Specialized veterinary Sciences, Sciences & Researches Branch, Islamic Azad University , Tehran-Iran. ⁴ Mycoplasma Reference Laboratory Of Razi Vaccine and Serum Research Institute, Karaj- Iran.

Abstract

Mycoplasma synoviae (MS) is one of the main disease in fowl which cause infections of respiratory system and tenosynovitis. Characterization and successful detection of MS in broiler breeder farms help to prevent distribution of MS in broiler farms. The aim of this study was isolation and characterization of MS in broiler breeder farms by culture and polymerase chain reaction (PCR) techniques. Thirty specimens which obtained from flocks with positive serum reactions were studied by culture and PCR techniques. After collecting of Choanal cleft and tracheal swabs in PPLO broth , a short-term incubation was occurred and then filtered and a serial passage was performed. In the fourth passage, all of the specimens cultured on PPLO agar, in addition ,original specimens used to extract of DNA and MS-PCR technique. Results showed that 15/30 were positive by culture (Approved by using of standard MS specific antiserum) and 25/30 were positive by PCR. These observations highlight the higher sensitivity of PCR rather than culture. These results may be observed because of PCR ability to detect DNA after mycoplasma's death. However positive results of culture obtained when there were not defect on swabbing and handling of specimens which can cause harmful effects on MS and accordingly suitable environment for growth of MS was exactly prepared. *Vet. Res. Bull. 6,1: 31-35,2010.*

Keywords: Mycoplasma synoviae, Culture, PCR, Isolation.

چکیده

مایکوپلاسمای سینوویه از عوامل مهم ایجاد کننده بیماری در ماکیان است که موجب عفونت دستگاه تنفسی و سینوویت می‌گردد. جداسازی و ردیابی دقیق مایکوپلاسمای سینوویه در گله‌های مرغ مادر کمک به جلوگیری از انتشار عامل پاتوژن در سطح گله‌های گوشتی می‌نماید. هدف از این تحقیق، جداسازی و شناسایی مایکوپلاسمای سینوویه از مزارع مرغ مادر با استفاده از روش PCR و کشت می‌باشد. در این تحقیق ۳۰ نمونه از گله‌هایی که دارای پاسخ مثبت تست سرولوژیک PCR قرار گرفتند. سوابهای شکاف کامی حلقی و نانی ارسال می‌باشند مورد کشت و PCR پس از غنی سازی کوتاه مدت فیلتر شد و به منظور شده در محیط PPLO Broth پس از غنی سازی کوتاه مدت فیلتر شد و به منظور پاساز اقدام گردید. از پاساز چهارم تمامی نمونه‌ها بر روی PPLO Agar کشت داده شد. همچنین از نمونه‌های اصلی دریافت شده استخراج DNA انجام شد و نمونه‌ها تحت برنامه MS -PCR قرار گرفتند. در کشت پس از قرارگیری در مجاورت آنتی سرم استاندارد اختصاصی MS تنها ۱۵ مورد در روش آگلوتیناسیون و اکتن انجام داده و به عنوان MS شناسایی گردیدند. در روش PCR نیز ۲۵ نمونه به عنوان گونه MS شناسایی گردید. نتایج به دست آمده حاکی از حساسیت بالاتر PCR در مقایسه با کشت می‌باشد. این مسأله به دلیل توانمندی روش PCR در ردیابی DNA است که در حضور MS حتی بعد از مرگ هم قابلیت ردیابی دارد، در حالی که جواب‌های مثبت روش کشت صرف مشتمل بر مواردی است که در هنگام اخذ و تقدیر و انتقال نمونه آسیبی که منجر به نابودی عامل گردد وارد نشود و نیز شرایط مناسب رشد آن در محیط کشت به طور کامل فراهم باشد. پژوهشنامه دامپزشکی، ۱۳۸۹، دوره ۶، شماره ۱، ۳۱-۳۵.

واژه‌های کلیدی: مایکوپلاسمای سینوویه، کشت، PCR، جداسازی.



درجه سانتیگراد به مدت ۵-۳ روز تحت نظر قرار گرفت. پس از گذشت ۴ پاساژ متوالی نمونه‌ها در محیط کشت PPLO براث، تمامی موارد بروی محیط Agar PPLO کشت گردید. سپس نمونه‌های کشت شده بروی آگار با گذشت ۷ تا ۱۰ روز با کمک میکروسکوپ نوری و با بزرگنمایی ۴۰X بررسی گردیدند. در صورت مشاهده پرگنه، آلوگری جنس مایکوپلاسمما تأیید می‌گردد. همزمان محیط‌های کشت PPLO براثی که از نظر رشد مایکوپلاسمما ثابت بودند سانتریفیوژ شده و رسوب آن با آنتی‌سرم SPAFAS اختصاصی مایکوپلاسمما سینوویه متعلق به شرکت کانادا مواجه شده و مثبت یا منفی بودن آگلوتیناسیون آن مورد ارزیابی قرار گرفت.

آزمایش مولکولی با PCR مخصوص گونه MS بر روی پرگنه‌های موجود بروی آگار PPLO اجرا گردید تا پاسخ‌های آنتی‌سرم استاندارد MS نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. به این منظور از پرگنه‌های رشد پیدا نموده به تعداد یک کلونی از پلیت آگار ۲۴ PPLO انتخاب و در محیط براث BHI وارد نموده و به مدت ۲۴ ساعت در ۳۷ درجه سانتیگراد قرارداده و سپس نیم سی از آن را به میکروتیوب جهت بررسی با کمک روش PCR انتقال دادیم. به منظور استفاده از روش PCR از نمونه‌های اصلی دریافت شده، استخراج DNA به روش فل و کلروفورم صورت پذیرفت و PCR بر روی عصاره حاصله به منظور ردیابی DNA مایکوپلاسمما سینوویه با کمک پرایمرهای اختصاصی گونه MS طراحی شده بر اساس ژن rRNA 16s پیشنهادی Lauerman و همکاران (۱۹۹۳) اجرا گردید (جدول ۱) که در صورت وجود محصول PCR موردنظر در هنگام الکتروفورز ژل آگارزد ردیف ۲۰۷bp باشد تشکیل می‌نماید (۱۳).

جدول ۱- پرایمرهای اختصاصی گونه MS ارائه شده توسط Lauerman و همکاران (۱۳).

توالی	جاگاه
MS-1(5'-GAAGCAAAATAGTGATATCA-3')	۱۱۹۴-۱۲۱۳
MS-2(5'-GTCGTCTCCGAAGTTAACAA-3')	۱۳۸۱-۱۴۰۰

مخلط اصلی به منظور واکنش PCR برای هر نمونه آماده گردید. مقادیر لازم برای تهیه مخلوط اصلی شامل ۲/۵ میکرولیتر PCR Buffer (10X) و ۴ میکرولیتر (25mM) MgCl₂--، ۰/۵ dNTPs (10 mM) و ۰/۱ میکرولیتر از هر یک از پرایمرها

مقدمه

مایکوپلاسمما سینوویه از عوامل مهم ایجاد کننده بیماری در ماکیان و بوکلمون در سراسر دنیا است که موجب عفونت تحت بالینی دستگاه تنفسی فوکانی می‌گردد. در مواردی که عفونت سیستمیک گردد موجب سینوویت عفونی شده و یک بیماری عفونی حاد تامزمن ماکیان و بوکلمون که مشتمل بر درگیری اولیه غشاء سینوویال مفاصل، غلاف تاندون‌ها است را بوجود می‌آورد که به صورت سینوویت اکسوداتیو، تنوازانیت، بورسیت دیده می‌شود.

مایکوپلاسمما سینوویه در صورت همراه بودن با بیماری نیوکاسل و یا بیماری برون‌شیت عفونی و یا هردی آنها می‌تواند موجب ایجاد ضایعات در کیسه‌های هوایی گردد.

با توجه به اینکه مایکوپلاسمما سینوویه علاوه بر انتقال افقی، دارای انتقال عمودی نیز بوده و به نتایج انتقال می‌یابد، از این رو شناسایی و ردیابی دقیق مایکوپلاسمما سینوویه در گله‌های مرغ مادر اولین مرحله در کمک به جلوگیری از انتشار عامل پاتوژن در سطح گله‌های گوشتی می‌باشد (۱۱، ۱۰، ۱۲).


هدف از این تحقیق، جداسازی و شناسایی مایکوپلاسمما سینوویه از مزارع مرغ مادر با استفاده از تکنیک PCR و کشت می‌باشد.

مواد و روش کار

در این تحقیق به تعداد ۳۰ نمونه از گله‌هایی که دارای پاسخ مثبت تست سرولوژیک بودند به عنوان گله‌های مورد آزمایش انتخاب گردیدند. از هر گله حداقل ۱۰ سواب شکاف کامی حلقی و نایی اخذ گردید و سواب‌های شیشه‌های در پوش دار (بیونیورسال) حاوی محیط PPLO براث انتقال داده شد و در دمای ۴ درجه سانتیگراد در کناریخ به آزمایشگاه منتقل شدند.

نمونه‌های ابده منظور کشت برای یک دوره کوتاه مدت ۶ ساعته در دمای انکوباسیون ۳۷ درجه سانتیگراد قرار داده شد تا غنی سازی اولیه صورت پذیرد. سپس PPLO براث حاوی نمونه فیلتراسیون MW گردید و این عمل توسط فیلترهای مخصوص سرسرنگی Type ۴۵/۰ میکرومتراند، انجام شد. به این منظور با استفاده از سرنگ‌های استریل، ۲ میلی لیتر از محلول براث کشت شده را برداشته و سرنگ را در دهانه فیلتر قرار داده و با فشار کم و به آرامی محلول را وارد محیط کشت دوم که PPLO براث بود منتقل کرده و در انکوباتور CO₂ دار (۷ درصد) در دمای ۳۷





شکل ۲- پرگنه رشد یافته بر روی محیط PPLO Agar


(Bio RAD, California, USA) کمک دستگاه UV transilluminator نتایج قرائت گردید.

نتایج


پس از قرارگیری کشت‌ها در مجاورت آنتی سرم استاندراد اختصاصی MS تنها ۱۵ مورد از موارد رشد یافته بر روی آگار PPLO در آزمایش آگلوتیناسیون با آنتی سرم اختصاصی مایکوپلاسما سیننوفیه واکنش انجام داده و به عنوان گونه MS شناسایی گردیدند (تصویر ۱). با استفاده از روش PCR بر روی پرگنهای موجود بر روی PPLO Agar نیز همین نتایج بدست آمد. در روش PCR بر روی نمونه‌های اصلی دریافت شده، تنها ۲۵ نمونه در هنگام الکتروفورز محصول PCR بر روی ژل آگارز در دیف ۲۰۷ bp (شکل ۱) باند ایجاد نمودند و به عنوان گونه MS شناسایی گردیدند (شکل ۳).

بحث و نتیجه‌گیری

مایکوپلاسما سیننوفیه به عنوان یکی از عوامل ایجاد کننده عفونت‌های تنفسی و نیز ایجاد کننده تنوواژنیت، سیننوفیت و بورسیت در ماکیان و بوقلمون شناخته شده است. حضور درگیری‌های همزمان این عامل با سایر عوامل ایجاد کننده بیماری‌های تنفسی می‌تواند به پیچیده تر شدن وضعیت پرندۀ منجر گردد. علاوه بر آن خسارات ناشی از انتقال عمودی بیماری به نتاج گله‌های مولدنیز بسیار مهم و جبران ناپذیر است و در گسترش عفونت در سطوح مختلف پرورشی موثر می‌باشد. گله‌های گوشتی مبتلا شده به بیماری (به صورت انتقال عمودی از گله‌های مرغ مادر و یا به صورت انتقال افقی) نتایج وزنی مطلوبی بدست



شکل ۱- Ladder 100pb plus DNA Ladder (Ruler 100pb plus DNA Ladder) مورد استفاده در این مطالعه (Gene PPLO Agar) . پرگنهای رشد یافته بر روی محیط (Gene)



شکل ۳- محصول PCR ژن 16S rRNA با استفاده از پرایمرهای MS-1 و MS-2 (نمونه‌های گله‌های مختلف: Lane 3-12, شاهد مثبت: Lane 2, شاهد مثبت: Lane 1) . (L: Gene Ruler 100bp plus DNA Ladder,

Taq DNA polymerase unit ۱۰۰ pM)

پس از آماده شدن نمونه‌ها، مخلوط حاصل در حجم نهایی ۲۵ میکرو لیتر برای هر نمونه به دستگاه ترموسایکلر (آلمان، Eppendorff Gradient Master) که از قبل برنامه ریزی گردیده بود منتقل شد. این برنامه شامل مراحل و اسرشت اولیه در دمای ۹۵ درجه سانتیگراد به مدت ۵ دقیقه و سپس ۳۰ سیکل به صورت و اسرشت ثانویه در دمای ۹۴ درجه سانتیگراد به مدت ۱ دقیقه و اتصال پرایمرها در دمای ۵۰ درجه سانتیگراد به مدت یک دقیقه و گسترش اولیه در ۷۲ درجه سانتیگراد به مدت یک دقیقه که در نهایت به یک گسترش نهایی در دمای ۷۲ درجه سانتیگراد به مدت ۵ دقیقه ختم می‌شود.

محصول PCR با کمک روش الکتروفورز بر روی ژل آگارز ۱٪ در ولتاژ ۱۰۰ و آمپراژ ۵۰ به مدت یک ساعت قرارداده شده و در نهایت با



همین دلیل امکان رویت نتایج متفاوت وجود دارد (۵، ۴). تحقیقات بیشتر در این زمینه می‌تواند با بررسی شرایط مختلف منظور انتخاب بهترین نحوه نمونه برداری و بهینه سازی شرایط کشت و نیز ارزیابی توفیق واکنشگرهای مختلف روش PCR در ردیابی مناسبتر کمک کننده باشد.

منابع

- ۱- اوسط حسینی، ع. (۱۳۸۶) تعیین هویت مولکولی مایکوپلاسمای سینوویه جدا شده از مرغداری‌های صنعتی استان مازندران. پایان نامه برای دریافت دکتری تخصصی بیماری‌های طیور، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
- ۲- حسینی، ح. (۱۳۸۵) مطالعه مولکولی جدایه‌های مایکوپلاسمای گالیسپتیکوم از طیور. پایان نامه برای دریافت دکتری تخصصی بیماری‌های طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران.
- 3-Dallo, S F., Baseman, J B. (2000) Intracellular DNA replication and long- term survival of pathogenic mycoplasmas, *Microb.Patholog.*, **29**: 301-309.
- 4-Evans, J.D., Thornton, D.L., Branton, S.L. (2009) Diagnosis of *Mycoplasma gallisepticum* from a Broiler Breeder Flock: Comparison of Three Diagnostics Methods. *International Journal of Poultry Sciences*, **8** (2): 104-107.
- 5-Hess, M., Neubauer, C., Hackl, R. (2007) Interlaboratory comparison of ability to detect nucleic acid of *Mycoplasma gallisepticum* and *Mycoplasma synoviae* by polymerase chain reaction. *Avian Pathol.*, **36** (2):127-133.
- 6-Hill, D. (1995) Mycoplasma field issues, diagnostics. *Poultry Digest*, **54**: 32-34.
- 7-Kempf, I., Blanchard, A., Gesbert, F., Guittet, M., Bennejean, G. (1993) The polymerase chain reaction for *Mycoplasma gallisepticum* detection. *Avian Pathology*, **22**: 739-750
- 8-Kempf,I., Gesbert, F., Guittet, M., Bennejean, G. (1994) Mycoplasma gallisepticum infection in drug-treated chickens: comparison of diagnosis methods including polymerase chain reaction. *Zentralblatt für Veterinärmedizin, Reihe B.*, **41**: 597-602.
- 9-Kleven, S.H. (1994) Summary of discussions, Avian

نیاورده و ضریب تبدیل قابل قبولی ندارند.

از این رود یابی و پایش سریعتر و دقیق تر عدم حضور عفونت مایکوپلاسمای سینوویه در گله‌های مولد می‌تواند به پیشگیری و کنترل بیماری و ضررها اقتصادی ناشی از آن در گله‌های دیگر کمک شایانی نماید (۱۰، ۱۱، ۱۲).

مایکوپلاسماهای سخت رشد بوده و نیازمند به شرایط ویژه‌ای به منظور کشت می‌باشد که در گونه‌های مختلف مقداری متغیر می‌باشد و باید نیازمندی هر گونه به دقت بررسی و شرایط کشت آن فراهم باشد (۱۱، ۱۰، ۱۲). در حضور عفونت‌های پیچیده کننده امکان رشد موفق مایکوپلاسمای سخت کاهش می‌یابد.

علاوه بر آن روش کشت روش وقت گیری نیز می‌باشد (۱، ۴). نتایج حاصله از تحقیق مذکور که به منظور پایش گله‌های مرغ مادر گوشتی و بر اساس روش کشت و PCR در ۳۰ گله دارای واکنش سرمی مثبت طراحی گردید حاکی از حساسیت بیشتر و سرعت بالاتر روش PCR در مقایسه با کشت در ردیابی و پایش آلودگی بامايكوپلاسمای سینوویه می‌باشد. این مسئله با یافته‌های حاصل از تحقیقات دیگر قربات و همخوانی دارد (۱۶، ۱۷) با این تفاوت که در آن مطالعات به صورت تجربی و آزمایشی به بررسی انتقال غیرمستقیم مایکوپلاسمای سینوویه پرداخته شده است.

محققین در توضیح یافته‌های خود بیان نمودند که تفاوت در میان پاسخ‌های حاصله از روش کشت و PCR می‌تواند به دلیل وجود سلول‌های مایکوپلاسمای مرده و یا مایکوپلاسمای غیرقابل کشت باشد (۳، ۱۶، ۱۷).

به هر حال نتایج بدست آمده از تحقیق فوق بانتایج بدست آمده از تحقیقات مشابه بر روی مایکوپلاسمای گالیسپتیکوم که عامل دیگر مایکوپلاسمایی مشکل آفرین در صنعت پرورش طیور است نیز همخوانی دارد (۸، ۷، ۹، ۴، ۱۹).

نکته قابل توجه آن است که پاسخ مثبت روش PCR بیانگر حضور مایکوپلاسمای DNA مایکوپلاسمادر محیط می‌باشد در حالیکه پاسخ مثبت روش کشت صرفًا مشتمل بر موادی است که مایکوپلاسمای زنده قابل رشد در محیط In Vitro در نمونه‌ها وجود داشته باشد و همه مراحل روش کشت با دقت پایه ریزی و بی‌گیری گردد (۱، ۱۵، ۱۶، ۱۷). به هر حال روش PCR نیز می‌تواند حاوی پاسخ‌های منفی کاذب و مثبت کاذب (۶) باشد که بستگی کامل به شرایط آزمایشگاه و روش انجام PCR و نوع و مقدار مواد واکنش و واکنشگرهای انتخاب شده هر آزمایشگاه دارد (۵) و به



- Mycoplasma Team, International Research Program on Comparative Mycoplasmology, University of Ljubljana, Domzale, Slovenia, *Avian Pathology*, **23**: 587-594.
- 10-Kleven, S.H. (2008) Mycoplasmosis. In: Diseases of Poultry, 12th edition. Saif, Y.M., Iowa State University Press, PP:805-807
- 11-Kleven, S.H., Ferguson-Noel, N. (2008) Mycoplasma synoviae Infection. In: Diseases of Poultry, 12th edition. Saif, Y.M., Iowa State University Press, PP: 845-856.
- 12-Kleven, S.H., Ferguson-Noel, N (2008) Other Mycoplasmal Infection. In: Disease of poultry., 12th edition. Saif, Y.M., Iowa State University Press, PP:862-864.
- 13-Lauerman, L.H., Hoerr, F.J., Sharpton, A.R., Shah, S.M., van Santen, V.L. (1993) Development and application of a polymerase chain reaction assay for Mycoplasma synoviae. *Avian Diseases*, **37**:829-834
- 14-Levisohn, S., Dykstra, M.J. (1987) A quantitative study of single and mixed infection of the chicken trachea by Mycoplasma gallisepticum. *Avian Diseases*, **31**: 1-12.
- 15-Marois,C., Oufour-Gesbert,F., Kempf, I. (2000) Detection of mycoplasma synoviae in poultry environment samples by culture and polymerase chain reaction. *Veterinary microbiology*, **73**: 311-318.
- 16-Marois,C., Picault,P., Kobisch,M., Kempf, I. (2005) Experimental evidence of indirect transmission of Mycoplasma synoviae. *Vet, Res.*, **36**:759-769.
- 17-Marois, C., Savoye, C., Kobisch, M., Kempf, I. (2002) A reverse transcription-PCR assay to detect viable mycoplasma synoviae in poultry environmental samples. *Veterinary microbiology*, **89**:17-28.
- 18-Salisch, H., Hinz, K-H., Graack, H-D., Ryll, M. (1998) A comparison of a commercial PCR-based test to culture methods for detection of Mycoplasma gallisepticum and Mycoplasma synoviae in concurrently infected chickens. *Avian Pathology*, **27**: 142-147.
- 19-Yagihashi, T., Tajima, M. (1986) Antibody responses in sera and respiratory secretions from chickens infected with *Mycoplasma gallisepticum*. *Avian Diseases*, **30**: 543-550.

