

بررسی اثرات تزریق گرلین بر تغییرات غلظت سرمی اوره و کراتینین موش های صحرایی در شرایط اندوتوكسمی

جواد چراغی^{۱*}، غلامحسن واعظی^۲، احسان عبدالله پور^۳

۱- استاد بار گروه علوم پایه آموزشکده دامپزشکی دانشگاه ایلام، ایلام - ایران.

۲- دانشیار گروه علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان - ایران.

۳- دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار - ایران.

*نویسنده مسئول: eilam-accopting9@rose-net.co.ir

دریافت مقاله: ۲۶ دی ۱۴۰۰ پذیرش نهایی: ۸۸ تیر ۱۴۰۰

Study on the Injection of Ghrelin on the Serum Urea and Creatinine Concentration in Rats Exposed to Endotoxemia Condition

Cheraghi, J.^{1*}, Vaezi, GH.², Abdollahi Poor, E.³

¹Assistant Professor of Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Ilam University, Ilam - Iran.

²Associate Professor of Department of Basic Sciences, Islamic Azad University, Semnan Branch, Semnan- Iran.

³Graduated from Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Garmser Branch, Garmser- Iran.

Abstract

In this research it is mostly paid attention to the effect of physiologically ghrelin and the role of Ghrelin in renal function which is the result of bacterial lipopolysaccharids (LPS) in rats. The number of 70 rats which have divided in 7 group for the experiment. firstly rats were IP injection of (LPS) by the amount of 20mg/kg B.W induced endotoxemia effects. Moreover Ghrelin by the amount of 4nmol befor and after the injection of LPS which is done by injection IP method. The result clearly illustrate that injection of Ghrelin could prevention the effects of LPS in renal function. In fact, with compared that of indicator group, the injection of two dose Ghrelin befor and after the injection of LPS leads to the deacrese significantly in the serum Creatinine concentration and also the injection of one dose Ghrelin before and 5 dose after the injection of LPS due to the reduce considerably in the serum Urea concentration ($P<0/05$). It would appear from the result that treatment with Ghrelin could correct the abnormalities of situation renal nephrotoxicity in endotoxemia with reduce the level of Urea and Creatinine concentration in blood serum. *Vet. Res. Bull. 6,1: 37-43,2010.*

Keywords: Ghrelin , Urea , Creatinine , Endotoxemia , Rat.

طریق ادرار از بدن دفع می شوند. چنانچه در اثر اختلالات کلیوی دفع مواد سمی بخوبی صورت نگیرد تجمع آنها در جریان خون عوارض و آسیب های غیر قابل جبرانی را به اندامها و ارگان های حیاتی بدن مانند دستگاه عصبی، دستگاه گردش خون، دستگاه

چکیده

گرلین لیبوپتیدی است که اولین بار از معده رت جداشد و مهمترین نقش آن ترشح GHS-R از طریق رسپتور می باشد که با توجه به گستردگی این رسپتور در بدن بررسی اثرات آن بر عملکرد فیزیولوژیک و شرایط پاتولوژیک حائز اهمیت است. اندوتوكسمی هاسبب بروز استرس هاس اکسیداتیو و اختلالات ارگانیک در بدن می شود. تاکنون تحقیق در زمینه بررسی اثرات درمانی Ghrelin در شرایط اندوتوكسمی و خصوصاً آسیب های کلیوی گزارش نشده است. احتمالاً گرلین از طریق منجر به بروز پاسخ درمانی می شود. تعداد ۷۰ سرموش صحرایی کاهش سنتز NOS منجر به بروز پاسخ درمانی می شود. رت ها ۱۰ ساعت قبل از خون نزد Albino Wistar جمعیت مورد مطالعه بودند. رت ها ۲۰mg/kg لیبوپلی ساکارید (LPS) به روش IP دریافت کردند. تزریق Ghrelin نیز به مقدار ۰.۲ml قبیل و بعد از تزریق LPS در دوزها و زمان های متفاوت به روش IP انجام گرفت. تغییرات احتمالی در غلظت سرمی Urea خون رت ها به روش فتو متري مورد آنالیز قرار گرفت. تزریق یک دوز گرلین ۳۰ دقیقه قبیل و ۵ دوز گرلین در زمان های ۶۰، ۱۲۰، ۲۴۰، ۱۸۰ و ۳۰۰ دقیقه بعد از تزریق LPS غلظت سرمی Urea را به طور معنی داری کاهش و نیز تزریق دو دوز Ghrelin به فاصله ۳۰ دقیقه قبیل و ۶۰ دقیقه بعد از تزریق LPS به طور معنی داری سبب کاهش غلظت سرمی Creatinine گردید ($P<0/05$). تزریق شش دوز Ghrelin برای کاهش غلظت سرمی Urea و تزریق دو دوز LPS برای کاهش غلظت سرمی Creatinine کافی بنتظر میرسد. به طور خلاصه گرلین می تواند به عنوان یک عامل مهار کننده اثرات پاتولوژیک LPS در بهبود شرایط ناشی از اندوتوكسمی خصوصاً طریق کاهش غلظت سرمی Urea و Creatinine در موش های صحرایی عمل کند. پژوهشنامه دامپزشکی، ۱۳۸۹، دوره ۶، شماره ۱، ۴۳-۳۷.

واژه های کلیدی: گرلین، اوره، کراتینین، اندوتوكسمی، موش صحرایی.

مقدمه

مواد سمی از قبیل Creatinine و Urea که حاصل متابولیسم مواد غذایی بخصوص پروتئین ها می باشند توسط کلیه ها و از



سرمی رت انجام شد اثرات LPS بر افزایش فاکتورهای نظری BUN، ASAT، ALAT، LDH و Glucose را به اثبات رساند.

Ghrelin یک هورمون پپتیدی ۲۸ اسید آمینه‌ای است که نخستین بار توسط Kojima و همکاران در سال ۱۹۹۹ به جهان پیشیده‌امعرفی شد^(۹). واژه Ghrelin از Drzban فرانسوی و از ریشه کلمه (Grow) به معنی رشد و relin به معنی رهایی گرفته شده است. Ghrelin یک لیپوپیتید مغزی-روده‌ای است که پس از ترشح وارد گردنش خون شده و خود را به مغز می‌رساند. Ghrelin به طور عمده از سلول‌های اکسینتیک موکوس فوندوس معده ترشح می‌شود اما در بافت‌های مختلف به طور وسیع وجود دارد، بنابراین احتمال می‌رود اثرات اندوکرینی و پاراکرینی نیز داشته باشد. گرلین یک لیگاند اندوژن است که از طریق رسپتور جفت شونده G-Protein سبب ترشح GH می‌شود^(۱۰، ۱۱). در خون به دوفرم متفاوت آسیله (n-Octanoyl) و آسیله نشده وجود دارد که قسمت اعظم Ghrelin موجود در خون (۹۰-۸۰%) به فرم آسیله نشده است اما فرم آسیله از نظر زیستی فعال بوده و از اهمیت بیشتری برخوردار است^(۱۱). همچنین به نظر می‌رسد برای ترشح GH فرم آسیله آن ضروری باشد. با وجود این برای فرم آسیله نشده Ghrelin نیز وظایفی مانند حفظ و ادامه حیات دستگاه قلبی-عروقی قائلند. انتشار وسیع رسپتورهای GHS-R که Ghrelin بر آنها موثر واقع می‌شود در بافت‌های مختلف از جمله بافت عصبی، معده، قلب، ریه، پانکرا، کلیه، روده و بافت چربی نشان دهنده وسعت عمل Ghrelin در بدن انسان و حیوانات می‌باشد. این هورمون با افزایش ترشح IGF-1 و GH نقش خود را در سیستم‌های بیولوژیکی ایفا می‌نماید. همچنین گزارشاتی مبنی بر اثرات حفاظتی آن از طریق GH و IGF-1 در مقابل انواع مختلفی از آسیبهای بافتی منتشر شده است، همانطور پر که بهبود فعالیت سلول‌های اندوتیال کلیوی از مسیر سیگنالینگ IGF به انجام می‌رسد^(۱۲، ۱۳). نتایج بررسی روی موش‌هایی که در شرایط محرومیت غذایی قرار داشتند حاکی از این است که گرسنگی سبب افزایش ترشح Ghrelin می‌شود. همچنین آثار مثبت آن بر رفع استرس ناشی از افسردگی به اثبات رسیده است. افزایش ترشح Ghrelin اثرات جانبی دیگری نیز دارد که باعث افزایش اشتها و اضافه وزن می‌شود و محققان نیز در تلاشند از این ویژگی در درمان Nervous Anorexia استفاده کنند. همچنین Ghrelin به طور موضعی در کلیه تولید می‌شود که این موضوع خود نشان دهنده اثرات مستقیم آن بر عملکرد کلیه‌ها است

تنفس، دستگاه ادراری، کبد و غیره وارد می‌سازد. کراتینین در سلول‌های کبدی و پانکراس از آمینواسیدهای Gly، Arg و Met تشکیل می‌شود. این سه آمینواسید ماده‌ای به نام کراتینین فسفات تولید می‌کنند. این ماده همراه با ATP در واکنش‌های انرژی زای عضلات شرکت می‌کند و در عضلات دهیدراته شده و تبدیل به کراتینین می‌شود که وارد خون شده و از کلیه ترشح می‌شود. کراتینین روزانه و بطور ثابت در عضلات تولید و از کلیه‌ها ترشح شده وارد ادرار می‌شود. نیز در کلیه سنتز می‌شود و آمونیاکی که در بافت وجود دارد از طریق سیاهرگ باب وارد کبد می‌شود و در کبد وارد سیکل اوره می‌شود و تبدیل به اوره شده و به خون بر می‌گردد. این اوره از طریق خون وارد کلیه می‌شود.^{-۵۰%} آن در کلیه باز جذب می‌شود و بقیه از طریق کلیه‌ها دفع می‌شود. اندوتوكسین باکتری‌های گرم منفی سبب بروز واکنش‌های بیولوژیکی و آسیبهای بافتی به وسیله تولید آنافیلاکسی و آزاد شدن واسطه‌های بیوشمیایی از قبیل هیستامین، سروتونین، کینین، فاکتورهای فعال کننده پلاکتی و سایتوکالین‌هایی از قبیل IL-1B و اینترفرون γ می‌شوند. از طرف دیگر LPS به طور مستقیم متabolیسم گلوكز و لیپیدها را مهار می‌کند. هپاتوکسیستی، اختلال عملکرد کلیوی و پراکسیداسیون لیپیدی از طریق تولید رادیکال‌های آزاد نظری O_2^- ، H_2O_2 و NO و O_2^- ایجاد می‌شود^(۱۰). تحقیقات Takeda و همکاران در سال ۲۰۰۶ نشان داد بروز اندوتوكسی از طریق افزایش غلظت سرمی فاکتورهای نظری BUN، SGPT، SGOT و موجب بروز اختلالاتی در عملکرد کبد و کلیه می‌شود. همانطور که از عملکرد کبد و کلیه مشخص است بروز اختلال در این ارگان‌ها فرآیند سرم‌زدایی در بدن را دچار اشکال می‌کند. معمولاً در ارتباط با نارسایی مزمن کلیوی علائمی از قبیل اورمی، اسیدوز مزمن و سوء‌تعذیب نیز بروز می‌یابد. به دنبال کاهش کلیرانس $IGFBP3$ ، $IGF-1$ نیز کم می‌شود^(۱۶). مطالعات تجربی نشان داده است که با استفاده از دوز از سوپرافیزیولوژیک GH می‌توان به بهبود اختلالات کلیوی کمک کرد. همچنین سوء‌تعذیب‌هایی که متعاقب اندوتوكسی می‌شود می‌آید دلیلی بر افزایش ترشح Ghrelin می‌باشد. اما تا کنون در این خصوص مطالعه‌ای به منظور ارزیابی اثرات افزایش Ghrelin اندوژن و نیز تزریق Ghrelin اگزوژن در ارتباط با اختلالات کلیوی صورت نگرفته است. تحقیقاتی که در زمینه میکروبیولوژی توسط Rahman Abdel Rahman و همکاران در سال ۲۰۰۵ بر روی تعدادی از متabolیت‌ها و آنزیم‌های



دقیقه بعد از تزریق LPS دریافت کردند.
(۴-۴) LPS+Ghrelin6 شش دوز Ghrelin را بصورت یک دوز ۳۰ دقیقه قبل و ۵ دوز دیگر به ترتیب در زمان های ۱۲۰، ۶۰، ۳۰ و ۰ دقیقه بعد از تزریق LPS دریافت کردند.
۱۰ ساعت پس از پایان تزریقات در هر کدام از گروه ها موش ها جهت خونگیری مقید شدند. حدوداً ۱۵ml خون توسط سرنگ از قلب هر کدام از رت ها اخذ شد. نمونه های خونی اخذ شده در لوله های غیر هپارینه سریعاً با حفظ سیکل سرما جهت آنالیز به آزمایشگاه بیوشیمی و پاتولوژی آموزش کده دامپزشکی دانشگاه ایلام ارسال شدند. جهت جداسازی سرم، نمونه های خونی به مدت ۱۰ دقیقه در دستگاه سانتریفیوژ (3000 rpm) قرار داده شدند. در گام بعدی با استفاده از متدهای روتین اقدام به سنجش غلظت سرمی Urea و Creatinine توسط کیت های Co₂ ZiestChem گردید. از بین متدهای منطقی که برای تعیین مقدار اوره و یا ازت اوره پیشنهاد شده، روش دی استیل مونوکسیم فراگیری خاص دارد و به طور عام مورد پذیرش قرار گرفته است. بر پایه این روش دی استیل مونوکسیم در محیط اسیدی با آب ترکیب شده و تولید دی استیل می نماید که از ترکیب آن با اوره مشتق دیازین زرد رنگ ایجاد می شود. حضور تیوسومی کاربازید در محیط عمل موجب پیدایش رنگ صورتی پر رنگی خواهد شد. شدت رنگ حاصل با غلظت اوره نسبت مستقیم دارد. در ادامه غلظت Urea در طول موج ۵۲۰nm قرائت گردید. همچنین روش Jaffe مورد استفاده برای سنجش غلظت کراتینین متد مدل می باشد که بر پایه این روش کراتینین با بی کربنات قلیایی تشکیل کمپلکس نارنجی رنگ می دهد. (این رنگ مربوط به کراتینین و سایر مواد غیر اختصاصی موجود در ماتریس سرم است). با سیدی کردن محیط، رنگ ناشی از کراتینین از بین می رود، ولی رنگ مربوط به مواد غیر اختصاصی باقی می ماند تفاوت شدت رنگ حاصل در ۵۰۰nm با مقدار کراتینین موجود در نمونه نسبت مستقیم دارد. این اعمال توسط دستگاه اسپکترو فنومتر و ترسیم نمودارهای مربوط به نمونه روی دستگاه کامپیوتر با دقت هر چه تمام تر صورت پذیرفت و داده ها با استفاده از فرمول های مربوطه محاسبه گردید. نتایج حاصل از بررسی ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد آنالیز قرار گرفت و تمامی داده ها به صورت **Mean±SE** بیان شدند. جهت تعیین اختلاف بین میانگین ها از **Dunnet Test** (روش آنالیز واریانس دو طرفه) استفاده شد و همچنین (P<0.05) به عنوان سطح معنی دار در نظر گرفته شد.


(۱۴-۵). با توجه به مطالب فوق الذکر این احتمال می رود که Ghrelin با خاصیت آنتی اکسیدانی خود در بهبود شرایط اندوتوكسمی و اختلالات کلیوی موثر واقع شود و بتواند غلظت سرمی Urea و Creatinine را به سطح Standard باز گرداند.

مواد و روش کار


تعداد ۷۰ سرموش صحرابی نر نژاد Albino Wistar با وزنی معادل ۱۵۰gr - ۲۰۰gr از موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی کرج تهیه و به Animal House آموزش کده دامپزشکی دانشگاه ایلام منتقل شدند. همچنین موش هایه منظور جلوگیری از بروز استرس به مدت ۲ هفته تحت شرایط جدید نگهداری شدند تا برای انجام تحقیقات مهیا شوند. در طی این مدت رتر هادر دمای ۲۲۰C تا ۲۴۰C، رطوبت ۶٪، تهویه فضای ۱۵ بار در ساعت، چرخه نوردهی ۱۲ ساعت روشناختی و ۱۲ ساعت تاریکی تنظیم و در قفس نگهداری شدند و همچنین به جیره غذایی استاندارد شامل پلت های مخصوص و آب آشامیدنی به صورت ad libitum دسترسی داشتند. موش هایه در ۳ گروه اصلی و ۴ زیر گروه به طور تصادفی تقسیم شدند که هر گروه شامل ۱۰ رت بود. در تمامی گروه های جز گروه Control از LPS (سروتاپیک B4: ۱۱۱) به مقدار ۰.۵mg/kg حل شده در ۰.۵ml سرم فیزیولوژی به صورت IP استفاده گردید. پیشتر اثرات اندوتوكسمی و کشنده LPS به میزان ۲۰mg/kg تعیین شد که پس از گذشت ۵-۴ ساعت موجب تلف LPS شدن موش های مورد آزمایش گردید. بنابراین دوز مناسب به میزان ۲۰mg/kg جهت انجام تحقیق انتخاب گردید. همچنین گرلین در سرم فیزیولوژی حل شده و به میزان ۶۵g/kg معادل ۴nmol/Rat قبل و بعد از تزریق LPS به صورت IP تزریق شد. استراتژی درمانی و پروتکل تزریقات مورد استفاده در این تحقیق به شرح زیر می باشد:

- ۱- گروه Control که Normal Saline دریافت کردند.
- ۲- گروه تیماری بین یک تاشش دوز Ghrelin دریافت کردند.
- ۳- گروهی که تنها LPS دریافت کردند.
- ۴- گروه Ghrelin + LPS که به چهار زیر گروه تقسیم شدند:
 - ۱- یک دوز Ghrelin را ۳۰ دقیقه قبل از تزریق LPS دریافت کردند.
 - ۲- یک دوز Ghrelin را ۶۰ دقیقه پس از تزریق LPS دریافت کردند.
 - ۳- تزریق LPS دریافت کردند.
 - ۴- دوز Ghrelin را ۳۰ دقیقه قبل و ۶۰ دقیقه پس از تزریق LPS دریافت کردند.





نمودار ۱: اثرات Ghrelin بر تغییرات غلظت سرمی Urea که در گروه LPS+Ghrelin6 به طور معنی داری ($P<0.05$) کاهش یافته است (n=10).



نمودار ۲: اثرات Ghrelin بر تغییرات غلظت سرمی Creatinine که در گروه LPS+Ghrelin2 و LPS+Ghrelin6 بطور معنی داری ($P<0.05$) کاهش یافته است (n=10).

براساس داده‌های فوق برای ممانعت از اثر نفروتوکسیک LPS، تزریق دو دوز Ghrelin برای ممانعت از افزایش غلظت سرمی Creatinine کافی به نظرمی‌رسد (نمودار ۲).

بحث و نتیجه‌گیری

القاء شوک سپتیک در اثر تزریق LPS در موش‌ها پارامترهای همودینامیک را دچار تغییر می‌کند و با توجه به اینکه بافت قلبی-عروقی نیز محل اثر Ghrelin می‌باشد، تزریق آن توانست نرخ مرگ و میرت‌های سپتیک را به طرز چشمگیری کاهش و سیستول و دیاستول قلبی را افزایش دهد (۱۲). امروزه محققان بسیاری از بیماری‌های شایع جوامع بشری را به نوعی با استرس اکسیداتیو مرتبط می‌دانند. اندوتوكسمی یک عارضه تهدید کننده حیات است که به صورت عفونت سیستمیک سراسری در بدن متعاقب

نتایج

نشان داد که اختلاف معنی داری در مقایسه غلظت سرمی Urea و Creatinine بین گروه‌های Control و Ghrelin وجود ندارد. گروهی که شش دوز NS دریافت کردند نتایج تقریباً مشابهی با گروه تیماری Ghrelin داشتند. نمودار شماره ۱ نشان می‌دهد در گروه Ghrelin6 تزریق شش دوز LPS+Ghrelin با اثرات LPS برآفایش توансه است بطور معنی داری ($P<0.05$) از اثرات LPS مقایسه غلظت سرمی Urea پلاسما ممانعت به عمل آورد. مقایسه میانگین غلظت Urea در گروه LPS ($73.9 \text{ mg/dl} \pm 8.1 \text{ mg/dl}$) با گروه کنترل ($29.54 \text{ mg/dl} \pm 3.1 \text{ mg/dl}$) حاکی از 2.5 برابر افزایش بوده که این اختلاف از نظر آماری معنی دار می‌باشد ($P<0.05$). موش‌های گروه تیماری که تنها ۶ دوز Ghrelin دریافت کردند، تغییر معنی داری در غلظت سرمی Urea آن‌ها نسبت به گروهی که ۶ دوز NS دریافت کرده بودند ایجاد نشد ($P>0.05$). دوزهای متفاوت دیگری از Ghrelin در گروه‌های LPS+Ghrelinb، LPS+Ghrelin2 و LPS+Ghrelin4 با تزریق LPS+Ghrelin1 هر چند موجب کاهش غلظت سرمی Urea گردید، ولی این کاهش از نظر آماری معنی دار نبود ($P>0.05$). برپایه نتایج به منظور کاهش غلظت سرمی Urea ناشی از شرایط اندوتوكسمی تزریق ۶ دوز Ghrelin ضروری به نظر می‌رسد (نمودار ۱).

نمودار ۲ تغییرات غلظت سرمی Creatinine بین گروه‌های مختلف تیماری را نشان می‌دهد. نتایج حاصل از تزریق LPS و Ghrelin در زمان‌های متفاوت نشان داد که غلظت سرمی Creatinine در بین گروه‌های LPS+Ghrelin2 و LPS+Ghrelin4 به ترتیب $0.94 \text{ mg/dl} \pm 0.05 \text{ mg/dl}$ و $1.02 \text{ mg/dl} \pm 0.07 \text{ mg/dl}$ بود که با نتایج حاصل از گروه کنترل ($0.86 \text{ mg/dl} \pm 0.03 \text{ mg/dl}$) تفاوت معنی داری ($P<0.05$) داشت. بدین ترتیب مقایسه غلظت سرمی Creatinine بین گروهی که LPS دریافت کرده بود تقریباً $2/3$ برابر غلظت گروه Control بود، در حالیکه تزریق توأم LPS و Ghrelin بطور معنی داری اثر افزایش یافته غلظت سرمی Creatinine را کاهش داد ($P<0.05$). اگر چه در گروه LPS+Ghrelinb و گروه LPS+Ghrelin4 غلظت سرمی Creatinine کاهش یافت اما این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود ($P>0.05$). نتایج نشان داد تزریق Ghrelin در گروه‌های LPS+Ghrelin2 و LPS+Ghrelin6 توانانسنه است در برابر آثار کلیوی LPS مؤثراً واقع شود. بدین ترتیب



کراتینین است که تماماً از طریق ادرار دفع می‌شود و آستانه دفع کلیوی آن پایین است و در شرایط پاتولوژیک میزان آن نسبت به Urea کمتر افزایش می‌یابد.

Ghrelin را نهایتاً برای یافتن یک پروتکل درمانی قطعی تزریق LPS+Ghrelin₆ به روشنی نشانگر این نکته است که تزریق ۶ دوز Ghrelin قادر است غلظت افزایش یافته فاکتورهای موردنطالعه را تا حد STD کاهش دهد. البته باید خاطر نشان کرد که برای کاهش غلظت سرمی Creatinine دریافت ۲ دوز Ghrelin طبق استراتژی اعمال شده در گروه LPS+Ghrelin₂ برای تحقق فرضیات این تحقیق کفایت می‌کند. احتمالاً اثرات آنتی اکسیدانی Creatinine منجر به کاهش غلظت سرمی Urea و Ghrelin می‌شود. در حالیکه افزایش غلظت متابولیت‌های مذکور شخصی برای آسیب بافتی کلیه و کاهش غلظت آن همانشنه روند بهبود شرایط اندوتوكسمی است، Tang و همکاران در سال ۲۰۰۳ نیز مطالعاتی در این زمینه روی رت‌های سپتیک انجام دادند. علامت کلیدی اندوتوكسمی هیپوتانسیون است که اغلب با نارسایی چندین ارگان مهم بدن از قبیل ریه، کلیه، کبد و مغز همراه است. یکی از علل عمدۀ ایجاد حالات پاتولوژیک ناشی از اندوتوكسمی ها بخش گلیکولیپیدی غشای خارجی باکتری‌های گرم منفی است که موجب تولید سایتوکایین‌ها و ازوادیلاتورهایی از قبیل NO می‌شود. تولید مقادیر زیاد NO بدنبال القای iNOS وابسته به سایتوکایین‌ها اتفاق می‌افتد که در وخت شرایط موجود موثر است. عارضه جدی ایجاد شده در اندوتوكسمی نارسایی حاد کلیوی می‌باشد که عامل اساسی در مرگ و میر بالای آن است (۱۷، ۱۹). Zhang و همکاران در سال ۲۰۰۰ ثابت کردند که eNOS و iNOS سلول‌های پروگزیمال هر دو قادر به تولید سوپراکسید و NO هستند و این اعتقاد برخلاف سایرین می‌باشد که معتقدند پس از القاء iNOS و ترشح فراوان NO در واقع با مهار eNOS صدمات بافتی اتفاق می‌افتد، چنانچه Schultz و همکاران در سال ۱۹۹۲ بیان می‌کنند که مقادیر کمی از NO برای مهار در مقایسه با iNOS امروز نیاز است (۲۰). LPS بادو مکانیسم تولید مقادیر فراوان NO به دنبال القای iNOS و ایجاد رادیکال‌های آزاد اکسیژن (OFR) سبب بروز شرایط اندوتوكسمی می‌شود. این سندروم معمولاً بنا بر ارگان‌های حیاتی بدن همراه است که در اثر هیپوتانسیون و کاهش جریان خون کلیوی نارسایی کلیوی حادث می‌شود، اما در مدل‌های حیوانی مشاهده شده که LPS

گشادی پاتولوژیکی عروق، اختلالات هماتولوژیکی و نارسایی عملکردی اندام‌های حیاتی، ترشح مدبایتورهای التهابی توسط سیستم ایمنی موجود می‌آید. شوک سپتیک سالانه تا ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت بیماران در USA را مبتلا می‌کند که علیرغم وسیع در پاتوفیزیولوژی این سندروم، مرگ و میر آن حدوداً ۲۰٪ تا ۵۵٪ درصد است. اگر این عارضه با نارسایی چندین ارگان نیز همراه شود مرگ و میر آن ۷۰٪ افزایش می‌یابد. در تحقیق حاضر تزریق داخل صفاقی LPS منجر به بروز اندوتوكسمی باکتریایی در موش‌ها گردید. بر پایه نتایج این تحقیق در گروه LPS غلظت سرمی Urea و Creatinine نسبت به گروه Control به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت. LPS از طریق القاء اندوتوكسمی سبب بروز اختلال کلیوی شده و افزایش غلظت فاکتورهای مذکور نیز ممکن است. مطالعات پیشین توسط Takemura و Crespo همکاران در سال ۲۰۰۰ نشان داد که افزایش غلظت NO منجر به بروز جراحات گسترش‌کننده می‌شود، که بموجب آن سیکل اوره را دچار اختلال می‌کند. اما با توجه به این یافته‌ها و تحقیق حاضر اختلافی از این نظر که افزایش غلظت Urea صرفاً در مقابل آسیب‌های کلیوی است مشاهده نمی‌شود، بلکه در تکمیل آن کوشیدیم تا با توجه به این نکته که ۶۰٪ از مقادیر اوره سرم در کلیه باز جذب می‌شود، نقش گرلین را تحت شرایط اندوتوكسمی تعیین نماییم. همچنین نتایج این بررسی در تایید مطالعات و همکاران در سال ۱۹۹۹ نیز بود (۲، ۴).

در گروه‌های LPS+Ghrelin_b و LPS+Ghrelin_a تزریق یک دوز Ghrelin کاهش اندکی در غلظت سرمی Urea و Creatinine نسبت به گروه Control و LPS بوجود آورد. با توجه به مطالعه مذکور تزریق یک دوز Ghrelin برای کاهش غلظت سرمی Urea و مطالعه مذکور تزریق کافی به نظر نمی‌رسد و تزریق دوزهای بیشتری از Creatinine قابلیت مهار اثرات LPS را دارد. اگرچه در گروه Ghrelin LPS+Ghrelin₂ آن گونه که انتظار می‌رفت کاهش قابل ملاحظه‌ای در غلظت سرمی Urea نسبت به گروه Control بوجود نیامد، اما در مورد غلظت سرمی Creatinine کاهش چشمگیری بوجود آمد. با توجه به بالا بودن متابولیسم تولید اوره نسبت به کراتینین غلظت سرمی اوره به حدی افزایش می‌یابد که در مقایسه با غلظت کراتینین تزریق دودوز گرلین برای کاهش آن کافی نیست و به مقادیر بالاتری از گرلین تا حدشش دوز برای بروز پاسخ درمانی لازم است. دلیل دیگر در توجیه این امر مربوط به سمی بودن



References

- 1-Arvat, E., Di Vito, L., Broglio, F., Papotti, M., Muccioli, G., Dieguez, C., Casanueva, F. F., Deghenghi, R., Camanni, F., Ghigo, E. (2000) Preliminary evidence that ghrelin, the natural GH secretagogue (GHS) - receptor ligand, strongly stimulates GH secretion in humans. *Endocrinol Invest*, **23**: 493-495.
- 2-Barron, R. L. (1993) pathophysiology of septic shock and implications for therapy. *Clin.pharm*, **12**: 829-845.
- 3-Choi, K. et al. (2003) The role of ghrelin and growth hormone secretagogues receptor on rat adipogenesis. *endocrinology*, **144**: 754-759.
- 4-Crespo, E. et al. (1999) Melatonin inhibits expression of inducible NO synthase in liver and lung and prevent endotoxemia in lipopolysaccharide - induced multiple organ dysfunction syndrome in rats. *FASEB J.*, **13**: 1537 - 1546.
- 5-Cummings, D.E., Frayo, R.S., Marmionier, C., Aubert, R., Chapelot, D.(2004) Plasma ghrelin levels and hunger scores in humans initiating meals voluntarily without time - and food-related cues. *Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab*, **287**:E297-E304.
- 6-Gualillo, O. et al. (2001) Gender and gonadal influences on gherelin mRNA levels in rat stomach. *Eur. J. Endocrinol*, **44**: 687 - 690.
- 7-Iuvone, T., D Acqissto, F., Carnuccio, R., Di Rosa, M. (1997) Nitric oxid inhibits LPS - induced tumore necrosis factor synthesis in vitro and in vivo. *Life Sci*, **59**: PL 207 - PL 211.
- 8-Kawczynska - Drozdz, A., Olszanecki, R., Jawien J., Brozowski, T., Pawlik, WW., Korbut, R., Guzik, T.J. (2006) Gherelin inhibits vascular superoxide production in spontaneously hypertensive rats. *Am. J. Hypertens*, **19**:764 - 767.
- 9-Kojima, M., Hosoda, H., Date, Y., Nakazato, M., Matsuo, H., Kangawa, K. (1999) Ghrelin is a growth - hormone - releasing acylated peptide from stomach. *Nature*, **402**: 656-660.
- 10-Maestroni, G.J.M. (1996) Melatonin as a therapeutic agent in experimental endotoxic shock. *J. Pineal Res*, **20**: 84 - 89.
- 11-Mori, K. et al. (2000) Kidney produces a novel acylated peptide, gherelin. *FASEB Lett*. **486**: 213-216.
- 12-Nagaya, N., Kojima, M., Uematsu, M., Yamagishi, M., Hosoda, H., Oya, H., et al. Hemodynamic and hormonal effects of human ghrelin in healthy volunteers. *Am J Physiol*, **280**: R1483-R1487.
- 13-Sakaguchi, O., Sakaguchi, S. (1979) Alteration of lipid metabolism in mice injected with endotoxin. *Microbiol. Immunol*, **23**: 71 - 85.
- 14-Seoane, L.M., Lo'pez, M., Tovar, S., Casanueva, F., Sen~ar's, R., Die'guez, C. (2003) Agouti - relatedpeptide, neuropeptide Y, and somatostatin - producing neuronsare targets for ghrelin actions in the rat hypothalamus. *Endocrinology*, **144**:544-551.
- 15-Szabo, C. (1995) Alterations in nitric oxide production in various forms of circulatory shock. *New Horiz*, **3**: 2 - 32.
- حتی در غیاب افت قابل توجه فشار خون سیستمیک می تواند آسیب کلیوی ایجاد کند. LPS از طریق افزایش فعالیت iNOS و ROS موجب تولید NO در کلیه شده و همچنین موجب افزایش تشكیل رادیکال های آزاد اکسیژن نظیر سوپراکساید و رادیکال های هیدروکسیل در کلیه می شود(۸،۱۶). انتظار می رو د با توجه به اینکه متعاقب اندوتوكسمی تولید NO و رادیکال آزاد اکسیژن افزایش می یابد، عملکرد آنتی اکسیدانی کلیوی نیز دستخوش قرار گیرد احتمالاً مهار OFR، تولید NO، رادیکال های آزاد و سلول های التهابی سبب بروز اختلال کلیوی در این مدل تحقیقاتی شود. Ghrelin با حذف NO تولید پراکسی نیتریت را مهار می کند، پراکسی نیتریت در انواع آسیب های سلولی که توسط رادیکال های آزاد اکسیژن میانجی گری می شود شرکت دارد. Ghrelin (15) یک Scavenger قوی رادیکال های آزاد می باشد که قابلیت حذف آنیون سوپراکسید، هیدروکسیل، پراکسی نیتریت، پراکسیل آبی، اکسیژن تک، ازن، نیتروژن دی اکسید، رادیکال نیتروواکسید و اسید هیپوکلروس را دارد. در واقع Ghrelin به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی قادر است با خاصیت برداشت رادیکال های آزاد، پراکسیداسیون لیپیدی را نیز مهار کند. نهایتاً در این تحقیق نقش Ghrelin به عنوان یک فاکتور موثر در بهبود شرایط اندوتوكسمی و کاهنده غلظت سرمی فاکتورهای Creatinine و Urea اثبات گردید.



- 16-Takada, R. et al. (2006) gherelin improves renal function in mice with ischemic acute renal failure. *J. Am. Soc.*, **26**: 201-55.
- 17-Takemura, S., Minamiyama, Y., Inoue, M., Kubo, S., Hiro-hashi. K., Kinoshita, H. (2000) Nitric oxide synthase inhibitor increases hepatic injury with formation of oxidative DNA damage and microcirculatory disturbance in endotoxemia rat. *Hepatogastroenterology*, **47**: 1364-1370.
- 18-Tang, C., Liu, M.S. (2003) Initial externalization followed by internalization of beta-adrenergic receptors in rat heart during sepsis. *Am J Physiol*, **270 (1 Pt 2)**: R254-63.
- 19-Tschop, M., Weyer, C., Tataranni, P.A., Devanarayyan, V., Ravussin, E., Heiman, M.L. (2001) Circulating ghrelin levels are decreased in human obesity. *Diabetes*, **50**:707-709.
- 20- Zhang, C., Walker, L.M., Mayeux, P.R. (2000) ole of nitric oxide in lipopolysaccharide-induced oxidant stress in the rat kidney. *Biochem Pharmacol*, **59** : 203-209.