

مطالعه بافت شناسی روده‌ها در تاسماهی شیپ

محمد تقی شیبانی^{۱*}، مجید بتیار^۲

۱- گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران - ایران.
۲- دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار - ایران.
*نوبنده مسئول: tsheibani@yahoo.com

دریافت مقاله: ۹ مهر ۸۸ پذیرش نهایی ۱۲ اسفند

Histological study of intestines in Acipenser nudiventris

Sheibani, M.T. ^{1*}, Battiar, M.²

¹Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine University of Tehran, Tehran-Iran.

²Graduated from the Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Garmsar Branch, Garmsar-Iran.

Abstract

In the present study the absorptive portion of digestive tract that is intestines are studied by hematoxylin and eosin. For this study a total of six adult ship sturgeons were freshly prepared from southern shores of the Caspian Sea in Saari. The intestines were removed from the GI tract, transferred to the histology laboratory and fixed in 10% formalin. Then the specimens were transferred to an autotechnicon for histological processing. Then the prepared blocks were sectioned at 6 microns by a microtome, stained with hematoxylin and eosin and studied under light microscope. The results showed that the epithelium covering mucosa in the caecum, intestines, and rectum was of pseudostratified columnar with goblet cells. Abundance of goblet cells from the beginning to the end of the intestines until the rectum was increased and intestinal glands especially in the distal intestine were large and highly folded. Moreover here some spiral valves with structures similar to mucosae of intestines are present. Another structure was presence of lymphatic tissues and follicles in submucosae of intestines and in the spiral valves. The muscular layers of the intestines are in two layers of smooth muscle covered by a serosa. *Vet. Res. Bull.* 6,1: 49-56, 2010.

Key words:sturgeons, *Acipenser nudiventris*, Intestines, Histology.

در جامعه جانوری دریاچه خزر ماهیان خاویاری بدلیل ارزش غذایی گوشت و خاویار و ارز اوری اقتصادی آن، یکی از مهمترین گروه ماهیان به حساب می‌آیند و در حال حاضر دریاچه خزر و حوضه آبریز آن دارای ^{۱۰} جمعیت بزرگ از شش گونه تاسماهیان شامل تاسماهی شیپ، تاسماهی ایرانی، تاسماهی روسی، ازون برون، فیل ماهی و استرلیاد می‌باشد. یکی از گونه‌های بسیار مهم و کمیاب از ماهیان خاویاری، تاسماهی گونه شیپ می‌باشد که به

چکیده

مطالعه حاضر بر روی بخش جذبی لوله‌های گوارشی تاسماهی شیپ یعنی روده‌ها با استفاده از رنگ آمیزی هماتوکسیلین و انوزین صورت گرفته است. جهت انجام این مطالعه شش قطعه تاسماهی شیپ بالغ از صیدگاه‌های واقع در شهرستان ساری، بصورت تازه صبیدشده تهیه گردید. سپس روده‌های دستگاه گوارش جاذبه و بلافاصله در ظروف حاوی فرمالین تجاري قرار گرفتند و به آزمایشگاه بافت‌شناسی منتقل گردیده و در محلول فرمالین ^{۱۰}٪ قرار گرفتند. سپس جهت انجام مراحل تهیه بافت نمونه‌ها را به دستگاه اوتوكسیلکون منتقل نموده و پس از تهیه بلوكهای پارافینی بافتی بدست آمده را به روشن هماتوکسیلین و انوزین رنگ آمیزی و توسط میکروسكوب نوعی مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصله نشان داد که ابی تلیوم مفروش کننده مخاطرات در سکوم پیلوئی، روده‌ها و رکتوم، از نوع استوانه‌ای شبیه مطبق همراه با سلولهای ترشحی جامی بودند. فراوانی سلولهای ترشحی جامی از ابتداء انتهای روده‌های ابتدایی رکتوم افزایش یافته و غدد روده‌ای نیز بیزه در روده خلفی بزرگ و بسیار چین خورده می‌باشند. بعلاوه در روده خلفی دریچه‌های مارپیچی متعددی با ساختارهایی مشابه مخاطر روده حضور دارند. از ساختارهای مهم دیگر وجود بافتی و فولیکولهای لنفاوی است که در زیر مخاط روده‌ها و بیزه در دریچه‌های مارپیچی مشاهده می‌گردند. طبقات عضلانی روده‌ها از نوع صاف و درود و لا یه بوده که توسط یک پوشش سروزی از خارج احاطه گردیده اند. پژوهشنامه دامپزشکی، ۱۳۸۹، دوره ۴۹-۵۶، شماره ۱، کلیدی: ماهیان خاویاری، تاسماهی شیپ، روده‌ها، بافت‌شناسی.

مقدمه

با توجه به فراوانی گونه‌های بسیار متنوع ابیزیان و جایگاه ویژه‌ای که پروتئین ماهیهای در مصرف غذایی دارا می‌باشد مطالعات میکروسکوپی ارگانهای مختلف احشایی انها در جهت روشن سازی ساختار بدنی و خصوصیات بافتی این اندامها از اهمیت خاصی برخوردار است.



شدن کامل، نمونه‌ها جهت انجام مراحل تهیه بافت به دستگاه اتوتکنیکون یا پاساز بافت منتقل گردیده و مراحل آبگیری بالکل اتیلیک با درجه افزایشی، تا الكل مطلق، شفاف سازی با گزیل و آغشتنگی با پارافین در آنها انجام گرفت. سپس بلوكهای پارافینی از نمونه‌ها تهیه و برشهایی به ضخامت ۶ میکرون توسط میکروتوم دوارتهیه گردید. مقاطع بافتی بدست آمده به روش هماتوکسیلین وائزین رنگ آمیزی و توسط میکروسکوب‌نوری مورد مطالعه قرار گرفتند.

نتایج

سکوم: در مجاورت و ابتدای روده‌ها عضومتراکمی به شکل هرمی مشاهده می‌شود که بعنوان بخشی از ساختار جذبی روده‌ها محسوب می‌گردد. این عضو کاملاً لوبوله بوده که انشعابات همبندی ضخیمی این لوبوله را از هم مجزا می‌نماید. اپی‌تیلوم مخاط داخلی از نوع استوانه‌ای شبه مطبق می‌باشد در پارین غدد چین خورده منشعب و بسیار بزرگ مشاهده می‌گردد، که اپی‌تیلوم آنها مشابه اپی‌تیلوم مخاطی است. بنابراین دارای مخاط و زیرمخاطی مشابه روده‌هایی باشد (شکل ۲۰۱).

روده‌ها: روده قدامی و میانی: سطح داخلی روده قدامی و میانی دارای برآمدگیها و چینهای بسیار قطور می‌باشند که طول روده را از سکوم تا روده خلفی طی می‌کند. چینهای مذکور در بعضی قسمتها بلندتر و در برخی غدد کوتاهتر می‌باشند. اپی‌تیلوم مخاط هر دو قسمت از نوع استوانه‌ای شبه مطبق می‌باشد که حاوی سلولهای ترشحی فراوانی می‌باشند. اپی‌تیلوم مذکور تا قاعده کریپتهای روده‌ای نیز امتداد یافته که با رنگ آمیزی هماتوکسیلین وائزین سلولهای استوانه‌ای آن کمی اسیدوفیلی رنگ گرفته ولی سلولهای ترشحی مزبور حاوی گرانولهای اوزینوفیلیک بسیار پررنگ و درشت می‌باشند.

در پارین و زیرمخاط، غدد روده‌ای متعددی دیده می‌شوند که بسیار منشعب بوده و اپی‌تیلوم این غدد مشابه اپی‌تیلوم مخاطی یعنی از نوع استوانه‌ای شبه مطبق می‌باشد. سلولهای ترشحی گرانول موجود در اپی‌تیلوم مخاطی نیز در غدد روده‌ای حضور گستردگی دارند که فزوئی ترشحات آنها به فضای داخلی غدد ریخته و از آنجا از طریق قاعده کریپتها به سطح داخلی روده راه می‌یابند. علاوه در پارین و زیر مخاط حضور گستردگی بافت‌های لنفاوی و فولیکولهای لنفاوی به چشم می‌خورد که بافت لنفاوی منتشر موجود در بین غدد و زیر اپی‌تیلوم مخاطی را نیز شامل

دلیل اینکه نسبت به سایر گونه‌های تاسماهیان کمیاب تر است کمتر مورد مطالعات مختلف قرار گرفته و لذا در این تحقیق این گونه ارزشمند از ماهیان خاویاری مورد بررسی و مطالعه بافتی قرار گرفته است.

تاکنون مطالعاتی زیادی بر روی دستگاه گوارش ماهیان استخوانی صورت گرفته از جمله توسط وررت (۱۹۹۲)، ساراسکوئت (۱۹۹۳)، زگنر (۱۹۹۴)، ورونینا (۱۹۹۷) و ریپیرو (۱۹۹۹). از مطالعات انجام شده بر روی گونه‌های مختلف تاسماهیان می‌توان به مطالعه بر روی دستگاه گوارش لارو تاسماهی سفید، توسط بادینگتون و دوروشف در (۱۹۸۵ و ۱۹۸۶)، هانگ و همکاران (۱۹۹۰)، گاولیکا و همکاران (۱۹۹۵) و دنگ و همکاران (۲۰۰۲) و همچنین بررسی مراحل لاروی دستگاه گوارش تاسماهی سبیری که توسط گیسبرت و همکاران در (۱۹۹۷) انجام گرفته است، اشاره نمود. مطالعاتی نیز بر روی تاسماهی روسی توسط ویوتسکایا و همکاران (۱۹۹۲)، بیولوژی تاسماهیان توسط دیلاف و همکاران (۱۹۹۳) و هولچیک و همکاران (۱۹۸۹)، و بیولوژی تاسماهی آمریکای شمالی، توسط بینکوفسکی و همکاران (۱۹۸۵) و تکامل لاروی تاسماهی آدریاتیک توسط بولیونه و همکاران در (۱۹۹۹) و مطالعه لاروی دستگاه گوارش تاسماهی سبز توسط دنگ و همکاران (۲۰۰۲) و گیسبرت و دوروشف (۲۰۰۳) صورت گرفته است.

از جمله مطالعات انجام شده در ایران می‌توان به مطالعاتی بر روی دستگاه گوارش قره برون، ازون برون، چالباش و فیل ماهی بالغ دریایی خزر توسط شبیانی و همکاران (۱۳۸۵ تا ۱۳۷۵) و همچنین مطالعه بافت شناسی مراحل تکامل لاروی غدد ضمیمه گوارشی در بچه تاسماهی ایرانی صورت گرفته است اشاره نمود (۶-۱).

مواد و روش کار

جهت انجام مطالعه حاضر شش قطعه تاسماهی شبیه بالغ از صیدگاههای واقع در شهرستان ساری، بصورت تازه صید شده تهیه گردید. برای جدا سازی روده‌ها از دستگاه گوارش ابتدا در سطح شکمی از دهان تا مخرج ماهیان یک برش طولی داده شده و تمامی قسمتها از آن خارج گردید. سپس روده‌ها از دستگاه گوارش جدا شده و بلا فاصله در ظروف حاوی فرمالین تجاری قرار گرفتند و به آزمایشگاه بافت شناسی منتقل گردیدند. سپس نمونه‌های قطعات کوچکتری تقسیم شده و به منظور فیکس شدن بمدت سه روز در محلول فرمالین ۱۰٪ قرار گرفتند. پس از فیکس



همراه با بافت لنفاوی گستردۀ مشاهده می‌گردد. در نواحی بالاتر و پائین تر غدد روده‌ای ندولهای لنفاوی متعددی حضور دارند که هر یک توسط لایه‌ای از بافت همبندی همراه با رشته‌های عضلانی صاف پوشیده شده‌اند. بعلاوه غدد لوله‌ای ساده‌ای که از قاعده کریپتها حاصل شده است نیز در زیر اپی تلیوم مخاط و جود دارند. در زیر ماهیچه مخاطی، زیر مخاط از بافت همبند سخت با عروق فراوان تشکیل شده است. طبقات عضلانی در دولایه و ازان نوع صاف می‌باشند که توسط لایه‌ای از پوشش سروزی مشابه روده قدامی احاطه گردیده است (شکل ۱۰، ۹، ۸).

رکتوم: در انتهای روده مارپیچ، لوله گوارشی تغییر قطر داده و باریک تر می‌شود و بعلاوه در فضای داخلی از ابتدای رکتوم دریچه‌های مارپیچ و طناب مرکزی محو گردیده و بنابراین با تمام دریچه‌های فوق شروع ساختمان رکتوم قابل تشخیص می‌باشد. سطح داخلی مخاط رکتوم دارای چینهای طولی ضخیمی است که تام خرج امتداد می‌یابند.

اپی تلیوم مفروش کننده مخاط رکتوم نیز از نوع استوانه‌ای شبه مطبق بوده که سلولهای استوانه‌ای آن در راس دارای مژه‌های بلند و فراوانی می‌باشد. در دید میکروسکوپیک نیز مخاط رکتوم دارای چینهای ظرفی است که کریپتها را همراهی نموده و اپی تلیوم نیز تا انتهای کریپتها ادامه دارد. پارین در رکتوم فاقد هرگونه غدد بزرگ منشعب روده‌ای مانند بخش‌های قبلی، بوده و زیر مخاط و طبقه عضلانی مشابه قسمتهای قبلی می‌باشد (شکل ۱۱).

بحث و نتیجه‌گیری

در یک مطالعه که بر روی مرفوولوژی اندام‌های گوارشی تاسماهی سفید بالغ توسط دو منگینی و همکاران صورت گرفته روده‌هارا شامل سه بخش روده قدامی، روده مارپیچ یا میانی و روده خلفی یا رکتوم ذکر نموده و سکوم پیلوئی را کروی توصیف کرده است (۱۵). و در تاسماهیان مختلف سکوم پیلوئی دارای ساختارهای غده‌ای مشاهده شده که با اپیتالیوم مخاط روده مفروش شده است، و چنین وضعیتی در تاسماهی شیپ نیز دیده می‌شود. سکوم پیلوئی و روده قدامی از نظر ساختار میکروسکوپی بسیار شبیه یکدیگر بوده که چنین نتیجه‌ای در مورد تاسماهی سفید، دریچه‌ای و تاسماهی سیبری نیز گزارش گردیده و با نمونه‌های مورد مطالعه از تاسماهی شیپ منطبق می‌باشد (۲۰-۱۱، ۹).

در اغلب تاسماهیان نشان داده شده که بخش خلفی روده‌ها

می‌شوند.


ماهیچه مخاطی بصورت یک تا دو لایه عضلانی صاف در حدفاصل پارین و زیر مخاط مشاهده می‌گردد که گاهی قطعات پراکنده‌ای از آنها در بالا یا زیر غدد مشاهده می‌گردد. طبقات عضلانی از نوع صاف و در دو لایه داخلی طولی و خارجی حلقوی می‌باشد (شکل ۳، ۴، ۵، ۶، ۷).

روده خلفی: سطح داخلی این قسمت از روده‌ها دارای تفاوت مشخصی با قسمتهای مجاور خود می‌باشد بدن ترتیب که سطح داخلی مخاط دارای چینهای بسیار بلند دریچه مانندی است که بصورت مارپیچ از سطح مخاط بر جسته شده و تا فضای میانی روده را در بر می‌گیرد و تمام طول خلفی را تا ابتدای رکتوم طی می‌کند. راس دریچه‌های مارپیچی مذکور به روی خود برگشته و قطعه‌تر می‌شود که در طول روده تشکیل یک طناب مرکزی را می‌دهد. اپی تلیوم مخاط روده‌ای از نوع استوانه‌ای شبه مطبق می‌باشد که حاوی سلولهای اپی تلیوم در حال عبور به لنفوسيتهای زیادی نیز در بین سلولهای اپی تلیوم در سطح داخلی روده‌ها مشاهده می‌گردد.


دریچه‌های مارپیچ: این دریچه‌ها یا تیغه‌های مخاطی دارای اپی تلیوم از نوع استوانه‌ای شبه مطبق بوده که در امتداد و ادامه اپی تلیوم مخاطی می‌باشد. در بافت همبند زیر اپی تلیوم و همچنین محور مرکزی دریچه‌های مزبور علاوه بر عروق خونی و لنفاوی متعدد، دستجات پراکنده‌ای از عضلات صاف نیز مشاهده می‌گردد. همچنین در پارین مخاط این قسمت توده‌های لنفاوی ممکن است مشاهده گردد که این ساختارهای لنفاوی عمده‌تر در قسمت راسی دریچه‌های مارپیچ تجمع یافته‌اند. بافت‌های فوق هر چه به سمت خلف روده پیش می‌رویم بر تعداد و سمعت آنها افزوده می‌گردد که بیشترین میزان آنها در ناحیه انتهایی روده مارپیچ می‌باشد. اطراف ندولهای مزبور بافت لنفاوی گستردۀ ای به چشم می‌خورد که لنفوسيتهای آن به آسانی به سطح داخلی روده راه می‌یابند. پارین مخاط روده خلفی محل قرار گرفتن کریپتها روده‌ای بوده که قاعده کریپتها دهانه‌های غدد بزرگ روده‌ای را دریافت می‌دارند.

غدد روده‌ای بسیار بزرگ و چین خوردۀ بوده و اپی تلیوم آنها از استوانه‌ای شبه مطبق همراه با سلولهای ترشحی فراوان تراز سطح مخاط و سلولهای گرانولار اتوژنوفیلیک متعدد تشکیل شده است. دهانه هر غده بطور مستقل به قاعده یک کریپت باز شده که محتويات ترشحی غدد را به سطح داخلی روده هدایت می‌نمایند. در بین غدد روده‌ای انشعاباتی از رشته‌های عضلانی صاف







شکل ۲- دیواره عضلانی ضخیم سکوم با غدد کیسه ای منشعب (H * E $\times 32$).




شکل ۱- سکوم بصورت یک عضو هرمی شکل دارای غدد منشعب (H * E $\times 32$).




شکل ۴- بخشی از مخاط روده بالپتلیوم شبیه مطبق همراه با پارین و زیر مخاط همبند سخت (H * E $\times 100$).



شکل ۳- بخشی از کرکهای روده قدامی و دیواره عضلانی سبیا ضخیم (H * E $\times 100$).



شکل ۶- روده میانی با کرکهای باریک و دیواره نازکتر از روده قدامی (H * E $\times 32$).







شکل ۵- اپتلیوم استوانه ای شبیه مطبق حاوی گابلت سلولهای متعدد، و پارین از نوع بافت همبند سخت حاوی یافته لنفاوی منتشر (H * E $\times 400$).

رأس سلولهای استوانه‌ای در روده قدامی، سلولهای این بخش دارای بیشترین ظرفیت جذبی مواد غذایی می‌باشند و انتقال به تغذیه فعال با افزایش فعالیت آنزیمی در روده خلفی یا مارپیچ نیز


دارای حداقل ظرفیت جذب و دریافت مواد معذی کلی جیره می‌باشد (۸، ۱۵-۲۰، ۲۵) و این در حالی است که در مورد تاسماهی سفید بیان شده که با حضور بلندترین میکرووکرکها در



شکل ۸- کریبنهای عمیق روده‌ای منشعب در روده خلفی ($H \cdot E \times 320$).شکل ۷- کریبنهای عمیق روده‌ای با گابلت سلهای فراوان ($H \cdot E \times 100$).شکل ۱۰- اپیتلیوم شبیه مطبق در دریچه‌های مارپیچ ($H \cdot E \times 400$).شکل ۹- غدد بزرگ کیسه‌ای در روده خلفی ($H \cdot E \times 100$).

خنثی یا اسیدی را ترشح می‌نماید. بیشترین ترشحات گلوكونژوگه‌های سولفاته در سلولهای ترشحی بخش‌های خلفی روده‌ها مشاهده می‌گردد. در پارین و زیرمخاط دریچه‌های مارپیچ روده خلفی، بافت لنفاوی منتشر و ندولهای لنفاوی بزرگی دیده شده که در تاسماهی شیپ نیز در مطالعه حاضر چنین یافته‌ای در دریچه‌های مارپیچ روده مشاهده می‌گردد (۵، ۱۱، ۱۵). (۱۶)

در مطالعه دیگری که بر روی دستگاه گوارش لارو تاسماهی سفید امریکای شمالی توسط گاولیکاو همکاران در (۱۹۹۵) صورت گرفته در یک روزگی پس از تفریخ ساختمان روده‌ای مشاهده شده و در روز دوم پس از تفریخ اپیتلیوم روده‌ها حاوی سلولهای استوانه‌ای ساده همراه با تعدادی گابلت سلهای قدامی و خلفی حاوی و اکتوئلهای فراوان گزارش شده است (۱۶). و در تاسماهی آدریاتیک نیز مخاط روده‌ها در روز سوم پس از تفریخ دارای سلولهای استوانه‌ای با مژه‌های بسیار کم به همراه سیتوپلاسم

شکل ۱۱- رکتوم، اپیتلیوم مژه دار با گابلت سلهای فراوان ($H \cdot E \times 400$).

همزمان و منطبق با آن می‌باشد. (۱۶، ۱۱، ۹).

در بسیاری از تاسماهیان از جمله تاسماهی سفید و چالباش نشان داده شده که مخاط روده‌ها دارای چینهایی است که اپیتلیوم آن حاوی سلولهای ترشحی متعدد می‌باشد که گلوكونژوگه‌های



ماهیان مختلف مطالعه نموده و متذکر گردیده اند که نقش تکاملی روده خلفی زودتر و بیشتر از سایر قسمتهای لوله‌های گوارشی است، منطبق می‌باشد. که این امر نشان دهنده اهمیت فراوان روده‌هادر جذب مواد غذایی و بویژه روده خلفی نسبت به سایر قسمتهای دستگاه گوارش می‌باشد (۲۴-۲۵-۲۹).

افزایش تعداد سلولهای ترشحی از ابتداء به انتهای روده‌ها در تاسمه‌ای ایرانی، تاسمه‌ای سفید و تاسمه‌ای سیبری نیز گزارش گردیده که از آنجائیکه در مطالعات هیستوشیمیایی حضور گلوكوکونزروگه‌های سولفاته فراوان در آنها مشاهده گردیده است. افزایش بیشتر آنها نمایانگر وجود بیشتر این مواد در قسمت‌های انتهایی تر روده‌ها بوده که چنین وضعیتی نیز در سایر ماهیان گزارش شده که این امر می‌تواند در ارتباط با نقش حفاظتی بیشتر ترشحات مخاطی در این قسمت‌ها از دستگاه گوارش تاسمه‌ایان می‌باشد (۱۵). وجود بافت‌های اندولهای لنفاوی در قسمت خلفی روده‌ها و دریچه‌های مارپیچی در ارتباط با نقش دفاعی وايمی این بافت‌های روده‌ها که بامداد پاتوئن در تماس بیشتر می‌باشند، بوده که چنین ساختارهایی که در این مطالعه یافت شده با یافته‌های مشابه در سایر تاسمه‌ایان نیز مطابقت کامل دارد.

منابع

- ۱- آذری تاکامی، ق. (۱۳۷۱) اصول تکثیر و پرورش ماهی. انتشارات وزارت جهاد کشاورزی شماره ۱۵۴، ص ۱۵۲.
- ۲- پوستی، ا.، صدیق مرستی، س. ع. (۱۳۷۸) اطلس بافت شناسی ماهی. انتشارات دانشگاه تهران، شماره ۲۴۳۶، ص ۱۳۰-۱۲۹.
- ۳- شیبانی، م. ت.، ادیب مرادی، م. (۱۳۷۸) ساختمان بافت شناسی پیلوروسکوم پیلوری قره برون. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، دوره ۵، شماره ۴، ص ۷۹-۸۲.
- ۴- شیبانی، م. ت.، پوستی، ا. (۱۳۷۹) بافت شناسی روده‌هادر ماهی قره برون. مجله پژوهش و سازندگی، شماره ۴۹، ص ۸۹-۹۱.
- ۵- شیبانی، م. ت. (۱۳۸۲) مطالعه ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک بخش خلفی لوله گوارش تاسمه‌ای چالباش. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، شماره ۱، دوره ۵، ص ۴۵-۴۸.
- ۶- کیوان، ا. (۱۳۸۲) ماهیان خاویاری ایران، شرکت سهامی شیلات ایران، انتشارات نقش مهر، شماره ۱۳۰۷

واکوئوله در اپیتلیوم بوده است (۸).

در اپیتلیوم مخاط روده‌ها تعداد زیادی گابلت سل وجود داشته که ترشحات آنها غنی از اجزاء سولفاته و موكوسابتنس‌های اسیدی و سولفاتی می‌باشند. بعلاوه در تاسمه‌ای سفید مطالعات هیستو شیمیایی نشان داده است که انتقال به تغذیه فعال با افزایش فعالیت آنزیمی در روده خلفی یا مارپیچ نیز همزمان و منطبق با آن می‌باشد. (۱۵ و ۱۶).

بر طبق گزارش دلال و همکاران (۱۹۹۳) در تاسمه‌ای و گیسبرت و همکاران (۱۹۹۸) در تاسمه‌ای سیبری تکامل آناتومیکی قسمتهای مختلف دستگاه گوارش مشابه آنچه در تاسمه‌ای بالغ مشاهده می‌گردد که همزمان با شروع تغذیه خارجی نیز می‌باشد رابین روزهای نهم و دهم پس از تفریخ گزارش نموده، (۱۳، ۱۴، ۱۸) در حالیکه طبق گزارشات با دینگتون و دوروشف، (۱۹۸۶) و گاولیکا و همکاران (۱۹۹۵) در تاسمه‌ای سفید و (بادینگتون ۱۹۹۱) در تاسمه‌ای این درجه از تکامل بترتیب تا روزهای دوازدهم و شانزدهم پس از تفریخ مشاهده نگردیده است (۱۶، ۱۲، ۹). و در مطالعه‌ای بر روی تکامل لا روی دستگاه گوارش تاسمه‌ای سبز توسط گیسبرت و دورشف (۲۰۰۳) شروع اولین تغذیه خارجی را چهاردهمین روز پس از تفریخ گزارش نموده اند، و ذکر شده که در هنگام شروع تغذیه خارجی، تکامل آناتومیکی و هیستولوژیک دستگاه گوارش در این تاسمه‌ای مشابه سایر ماهیان می‌باشد (۷، ۸، ۱۳، ۲۰، ۲۲، ۲۵، ۲۸).

تمایز بخش قدامی روده‌ها و سکوم در تاسمه‌ای سبز بر اساس مطالعات گیسبرت و دورشف در روزهای ششم تا دهم پس از تفریخ مشاهده شده است، در حالیکه در مطالعه‌ای که بر روی لا رو تاسمه‌ای سیبری توسط گیسبرت و همکاران صورت گرفته، ظهور و تمایز روده‌ها و سکوم پیلوری از روز پنجم پس از تفریخ مشاهده و گزارش گردیده است (۱۸، ۲۰).

در مطالعات هیستوشیمیایی بر روی دستگاه گوارش تاسمه‌ایان مختلف مانند تاسمه‌ای سیبری و تاسمه‌ای سفید حضور مواد موكوئیدی اسید و خنثی و موكوسابتنس‌های سولفاته و سیالوموسینها در سلولهای ترشحی مخاطات قسمت‌های مختلف دستگاه گوارشی نشان داده شده است (۱۰، ۱۲، ۲۰). فعالیت آنزیمی در روده خلفی نشان می‌دهد که این آنزیمهای بسیار تکامل یافته تر از سلولهای مشابه یا آنزیمهای موجود در سکوم و روده قدامی می‌باشند. این مشاهدات با یافته‌های محققینی که بر روی همزمانی و نیز تقدم و تأخیر اندام زایی در



- 7- Binkowski,F.P., Doroshov, S.I. (1985) North American sturgeon: Biology and aquaculture potential W. Junk publishers, Dordrecht.
- 8- Boglione, G., Bronzi, P., Cataldi, E. Serra, S., Galiardi, F., Cataudilla, S. (1999) Aspects of early development in the Adriatic sturgeon *Acipenser naccarii*. *Journal of Applied Ichthyology*, **15**:207-213.
- 9- Buddington, R.K. (1985) Digestive secretion in lake sturgeon during early development. *Journal of fish Biology*, **26**:715-723.
- 10- Buddington, R. K., Doroshov, S.I. (1986) Structural and functional relations of the white sturgeon alimentary canal of *Acipenser transmontaneus*. *Journal of Morph*, **190**:201-213.
- 11-Buddington, R. K., Doroshov, S.I. (1986a.) Development of digestive secretions in white sturgeons Juveniles *Acipenser transmontaneus*. *Comp.Biochem.Physiol*, **83A**:233-238.
- 12- Buddington, R.K. (1991) Ontogenetic development of sturgeons: selected physiological examples in Acipensers. Edited by P.Williot. CEMAGREF, Bordeau. 53-63.
- 13-Dettalaff, T. A., Ginzburg, A.S., Shmalgauzen, O.I. (1981) Sturgeon development. Nauka Press. Moscow (in Russian), 224
- 14-Dettalaff, T.A, Ginsburg, A.S., Schmalhausen, D.I. (1993) Sturgeon fishes, developmental biology and aquaculture. Springer Verlag, P:300.
- 15- Domenghini, C., Arrighi, S., Radaelli, G., Bosi, G., Mascarello, F. (1999) Morphological and histochemical peculiarities of the gut in the white sturgeon, A. Trans. EUR. *Journal of Histochem*, **43**:135-145.
- 16- Gawlicka, M.A., The, S.J. Hung, S.S.O., Hinton, D.E., d la Noue, J. (1995) Histological and histochemical changes in the digestive tract of white sturgeon larvae during ontogeny. *Journal of Fish physiol. Biochem*, **14**:357-371.
- 17- Gisbert,E.,Williot,P. (1997) Larval behavior and effect of the timming of initial feeding on growth and survival of Siberian sturgeon larvae under small scale.Hatchery production.*Aquaculture*, **156**:63-76.
- 18- Gisbert, E., Rodriguez, A., Castello- Orvay, F., Williot, P. (1998) A histological study of the development of the digestive tract of siberian sturgeon during early ontogeny. *Aquaculture*, **167**:195-209.
- 19- Gisbert, E., Sarasquete, M.C., Williot, P., Castello, Orvay, F. (1999) Histochemistry of development of the digestive system of the siberian sturgeon during early ontogeny. *J. Fish Biology*, **55**:595-616.
- 20- Gisbert, E., Doroshov, S.I. (2003) Histology of the developing digestive system and the effect of food deprivation in larval green sturgeon. *Journal of Aquatic living resources*, **16**: 77-89.
- 21- Holcik, J. (1989) The fresh water fishes of Europe. vol. I/II. General introduction to fishes_ *Acipenseriformes* Aula,Verlag, Berlin.
- 22- Hung, S.S.O, Groff, J.M., Lutes, P.B., Fynn aikins, F.K. (1990) Hepatic and intestinal histology of Juvenile white sturgeon fed different, carbohydrates. *Journal of Aquaculture*, **85**:349-366.
- 23- Kawai, S., Ikeda, S. (1971) Studies on digestive system of fishes. I. Carbohydrases in digestive organs of several fishes. *Bull. Jap. Soc. Sci. Fish*, **37**: 333-337.
- 24-Legeza, M. I. (1973) The present distribution of sturgeons (the family Acipenseridae) in the Caspian Sea. *Journal of Voprosy Ichthyologii* (Problems of Ichthyology). (in Russian), **13 (63)**: 1008-1015
- 25- Plotnikov, G.K., Proskoryakov, M.T. (1984) Sturgeon digestive enzyme during early stages of ontogeny. Kuban state university, Krasnodar, *Journal of Evol. Biochem. Physiol*, **20(1)**: 16-18.
- 26-Ribeiro, L., Sarasqete, M.C., Dinic, M.T. (1999) Histological and histochemical development of digestive system of solea senegalensis larvae. *Journal of Aquaculture*, **171**:293-308.
- 27- Sarasquete, M.C., Polo, A., Gonzalez de canales, M. L. (1993) A histochemical and immunohistochemical study of digestive enzymes and hormones during the larval development of the sea bream. *Journal of Histochem*, **25**: 430-437
- 28- Schmalgauen, O. I. (1968) Development of digestive system in sturgeons. In: Morphologieal Studies of fish development. Edited by N.N.Disler. Nauka, Moscow (in Russian), 40-70.



- 29- Smith, L. S. (1989) Digestive function in teleost fishes. In: *Fish nutrition*. J. E. Halver (Ed.) academic press, San Diego, 331-421.

