

اعتبار سنجی دستگاه گلوکومتر EasyGluco در سنجش میزان گلوکز خون در طب اسپ

^۱*میثم تهرانی شریف ، سهیل جعفر طهرانی^۲ ، علیرضا قادردان مشهدی^۳ ، سوگند مشفقی^۱

^۱- استادیار گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپرورشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار - ایران.

- گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز - آیان.

۲- دانش آموخته دانشکده دامپردازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گهره مسار، گه مساد - آبرآزان:

maysamtehrai@yahoo.com : \مسام تھرائی*

دریافت مقاله: ۱۹ اسفند ۸۸، بذرگان نهاد: ۱۵ تا ۸۹

Evaluation validity of Easygluco glucometer to determine Glucose in Equine practice

Tehrani sharif, M.^{1*}, Jafar tehrani, S.², Ghadrdan
mashhadi, A.R.³, Moshfeghi, S.¹

¹Faculty of Veterinary Medicine, Department of Clinical Science, Islamic Azad University, Garmsar Branch, Garmsar- Iran.

²Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Garmser Branch, Garmser- Iran.

³Faculty of Veterinary Medicine, Department of Clinical Science, Shahid Chamran University, Ahwaz-Iran.

Abstract

Abstract
Serum glucose level considered as a prognostic indicator in a variety of equine diseases such as colic, hypoglycemic conditions, septicemia, diarrhea, diabetes mellitus. Considering the emergency nature of disorders mentioned above, fast and accurate measurement of this parameter is necessary. Self-monitoring of blood glucose (SMBG) allows diabetic patients to achieve and maintain specific glycaemic goals. There are several glucometer devices in the market, all of human kind and there's high competition between companies ,several studies has performed to evaluate efficacy of this device in medicine. Unfortunately limited studies has been done in veterinary medicine . The aim of this study was to evaluate validity of validation EasyGluco glucometer to measure blood glucose levels and it's application in equine clinical practice. Fourthly five horses warm blooded healthy and sick horses (horses in the hospital) with different ages were selected . 3 ml of blood were collected in the tube containing sodium fluoride anticoagulant .Glucose concentration of capillary and venous blood samples were determined Immediately with glucometer Plasma immediately separated and transferred , on ice to the laboratory & kept at - 20 °C until laboratory examination . The level of plasma glucose were determined by photometric method using Pars Azmoon kit. To evaluate repeatability, accuracy and Within run imprecision of Easygluco glucometer , one sample were analyzed for 15 consecutive time at intervals of 15 seconds and CV were determine & were compared with control samples. CV in blood samples taken, low and high controls were 4.1, 3.3 and 4.4 percent respectively in which all were acceptable with NCCLS standards. In order to Evaluate the diversion of glucometer results with standard methods, Bland - Altman Plot was performed. Bias levels in venous and capillary glucometer methods with standard methods, respectively, were -9.4 and -34.8 . To determine the correlation between the results of the glucometer and laboratory method , correlation coefficient determined. In this study, the correlation coefficient (r) between photometer method and venous blood glucometer device was 0.823. The results of this study revealed lower correlation compare to human studies .It Seems that it might be due high level of hematocrite in the horse & human calibrated device . In order to overcome this problem , Correction Factor(CF) should be calculate. CF obtained in this study In this study WAS 1.1. Th results of this study indicates that correction factor should be applied ,then after glucometer results can be trusted. **Vet. Res. Bull.** 6:155-159,

Keywords: Validation, glucometer, equine.

حکایت

میزان گلوکز سرم به عنوان شاخص پیش آگهی دهنده در برخی از بیماری های اسب نظری کولیک، هپیو گلیسمی، سپتی سمی، اسهال، دیابت ملیتوس و کوششیگ مطرح می باشد. با توجه به ماهیت اورژانسی اختلالات فوق الذکر، اندازه گیری سریع و دقیق این پارامتر ضروری است. دستگاه های گلوکومتر رایج در بازار، همگی از نوع انسانی بوده و با توجه به رقابت بالایی در این بخش، مطالعات متعددی جهت بررسی کارآیی این دستگاه ها انجام پذیرفته است. متأسفانه در بخش طب دامپزشکی مطالعات چندانی انجام نشده است. هدف از این مطالعه ارزیابی اعتبار سنجی دستگاه گلوکومتر EasyGluco جهت اندازه گیری میزان گلوکز خون و استفاده بالینی از آن در طب بالینی اسب می باشد. تعداد ۴۵ راس اسب خون گرم از اسب های سالم و بیمار (بستری در بیمارستان اسب داری) با شرایط مناسب مختلف انتخاب شدند. از هر راس دام میزان ۳ سی سی خون از طریق ورید و داج اخذ و به لوله حاوی ماده ضد انعقاد فلورورسدیم متنقل می گردید . بالا فاصله در همان محل، مقادیر گلوکز با دستگاه گلوکومتر Easygluco از نمونه های خون مویرگی و ووریدی تعیین مقدار و ثبت می گردید . پلاسما در اسرع وقت جدا و با حفظ زنجیره سرم باه آزمایشگاه منتقل و تا زمان آزمایش در ۲-۰ درجه سانتی گراد نگهداری گردید . میزان گلوکز پلاسما با روشن فوتومتری و با استفاده از کیت شرکت پارس آزمون تعیین گردید . جهت بررسی تکرار پذیری، دقت و متوالی و از فواصل ۱۵ ثانیه تکرار و میزان C.V تعیین و با C.V. نمونه های کنترل مقایسه شد. میزان در نمونه خون اخذ شده، کنترل های پایین و بالا به ترتیب ۴.۱ و ۳.۴ درصد بود که همگی با مقادیر NCCLS هم خوانی داشت. جهت Plot بررسی میزان انحراف نتایج روشن گلوکومتری با روشن استاندارد، Bland-Altman ترسیم شد . میزان Bias در روشن های گلوکومتری وریدی و مویرگی با روشن از دستگاه و روشن فوتومتری ضریب همبستگی تعیین شد. در میان نتایج حاصل از دستگاه و روشن فوتومتری ضریب همبستگی تعیین شد. در این مطالعه ضریب همبستگی (r) بین روشن فوتومتری و دستگاه گلوکومتری خون وریدی، ۸۲۳، -۰.۸۴-۰.۹۴ بود جهت بررسی همبستگی در این مشکل (r²) عدم کالیبراسیون دستگاه را نشان می دهد. به نظر می رسد علت پایین بودن r، عدم کالیبراسیون دستگاه برای اسب و همچنین بالا بودن میزان هم تاکریت در اسب باشد. پایستی جهت برآمدن بر این مشکل از فاکتورهای اصلاح کننده بهره جست. فاکتور اصلاح کننده در این تحقیق ۱.۱ بدل است آمد. نتایج این تحقیق بیانگر این نکته است که پس از اعمال فاکتور اصلاح کننده می توان به نتایج حاصل از گلوکومتر اعتماد نمود. پژوهشنامه دامپزشکی، ۳۸۹، ۱؛ دوره ۶، شماره ۱-۱۵۵.

واژه‌های کلیدی: اعتبارسنجی، گلوکومتر، اسپ.



در کره اسب ها و پونی ها عدد (۴) مورد استفاده قرار گرفت.

بلافاصله در همان محل، مقادیر گلوكز با دستگاه گلوكومتر Easygluco از نمونه های خون مویرگی و وریدی تعیین مقدار و ثبت می گردید. پلاسما در اسرع وقت جدا و با حفظ زنجیره سرما به آزمایشگاه منتقل و تا زمان آزمایش در (۲۰-۲۰) درجه سانتی گراد Germany نگهداری گردید. میزان گلوكز پلاسما با دستگاه فوتومتر (RIELLE 5010، run imprecision) و با استفاده از کیت شرکت پارس آزمون تعیین گردید. جهت بررسی تکرار پذیری، دقت و Within دستگاه گلوكومتر، ۱ نمونه خون برای ۱۵ بار متوالی و از فواصل ۱۵ ثانیه تکرار و میزان CV تعیین و با مقایسه های کنترل Bland PC میزان mean difference plot تعیین شد. جهت اعتبار سنجی دستگاه معادله رگرسیون، Analyse it ® NCCLS تعیین شد. کارآیی دستگاه با مقادیر تعیین شده توسط ADA و مقایسه شد. نتایج توسط نرم افزار ® دسته بندی و مورد بررسی آماری قرار گرفت.

نتایج

میانگین میزان گلوكز پلاسما و دستگاه گلوكومتر در جدول ۱ نشان داده شده است. میزان CV در نمونه خون اخذ شده، کنترل های پایین و بالا به ترتیب ۴.۱، ۳.۳ و ۴.۴ درصد بود که همگی با مقادیر NCCLS هم خوانی داشت.

جهت بررسی میزان انحراف نتایج روش گلوكومتری با روش استاندارد، Bland - Altman Plot ترسیم شد (شکل ۱). میزان Bias در روش های گلوكومتری وریدی و مویرگی با روش استاندارد به ترتیب -۳۴.۸ و -۹.۴ بود.

جهت بررسی میزان همبستگی میان روش های مختلف، Plot Regression ترسیم و ضریب همبستگی با آزمون پیرسون و T جفتی تعیین گردید (شکل ۲). ضریب همبستگی (r) بین روش های مختلف در جدول ۲ آورده شده است.

بحث و نتیجه گیری

امروزه استفاده از آزمون های تشخیص آزمایشگاهی نقش مهمی را در تشخیص، پیشگیری و پیگیری روند درمان بیماری های دامی ایفا می کند. با توجه به اهمیت اسب به عنوان تنها حیوان ورزشی، تشخیص سریع و به موقع بیماری، نقش مهمی را در درمان دارد.

یکی از اهداف پاتولوژی نوین دامپزشکی دسترسی به

مقدمه

امروزه استفاده از آزمون های آزمایشگاهی در طب بالینی اسب رو به فزونی گزارده است. کلیدی ترین نقطه در طب آزمایشگاهی، صحبت نتایج آزمایشگاهی است. با توجه به بعد مسافت میان باشگاه های سوارکاری و آزمایشگاه، در برخی از موارد آنالیز نمونه ها با تأخیر انجام می پذیرد لذا لزوم استفاده از آزمون های سریع آزمایشگاهی بیش از پیش احساس می شود.

اکثر روش های قدیمی اندازه گیری گلوكز خون بر اساس خاصیت احیا کنندگی گلوكز استوار است. این روش ها از محلول قلیایی مس که دارای Cu⁺⁺ است و به شکل احیا می شوند استفاده می کنند (۲). در سال های اخیر روش های آنزیمی نیز برای سنجش گلوكز خون جایگزین شده است که به علت دقت بالاتر مرسم شده است (۲). میزان گلوكز سرم به عنوان شاخص پیش آگهی دهنده در برخی از بیماری های اسب نظری کولیک، هیپو گلیسمی، سپتی سمی، اسهال، دیابت ملیتوس و کوشینگ مطرح می باشد (۱). با توجه به ماهیت اورژانسی اختلالات فوق الذکر، اندازه گیری سریع و دقیق این پارامتر ضروری است. دستگاه های گلوكومتر رایج در بازار، همگی از نوع انسانی بوده و با توجه به رقابت بالای در این بخش، مطالعات متعددی جهت بررسی کارآیی این دستگاه ها انجام پذیرفته است. متأسفانه در دامپزشکی مطالعات چندانی انجام نشده است. هدف از این مطالعه ارزیابی اعتبار سنجی دستگاه گلوكومتر EasyGluco جهت اندازه گیری میزان گلوكز خون و استفاده بالینی از آن در طب بالینی اسب می باشد.

مواد و روش کار

پس از انجام معاینات فیزیکی، اخذ تاریخچه و ثبت مشخصات دام، تعداد ۴۵ راس اسب خون گرم از اسب های سالم و بیمار (بستری در بیمارستان اسب داری) با شرایط سنی مختلف انتخاب شدند. از هر راس دام میزان ۳ سی سی خون از طریق ورید و داج اخذ و به لوله حاوی ماده ضد انعقاد فلورورسدیم منتقل می گردید.

به منظور جلوگیری از همولیز و همچنین جلوگیری از آسیب به عروق یا ایجاد درد بیش از حد برای اسب سرسوزن با گیج (18) انتخاب گردید. بلافاصله پس از اخذ خون مورد نیاز از هر اسب با کمک لنست سوراخ بسیار کوچکی را بر روی لب بالای اسب ایجاد کرده تا خون مورد نیاز برای سنجش گلوكز توسط دستگاه گلوكومتر به دست آید. به علت ضخیم بودن پوست اسب، مداد در اسب ها بروی عدد (۵) که ایجاد عمقی ترین سوراخ را خواهد نمود تنظیم گردید و




جدول ۲- ضریب همبستگی بین روش‌های مختلف.

روش / روش	Intercept	r	Slope	95% cl	T stat	PC
فوتومتری / گلوكومتر وریدی	.۰۸۳	.۷	.۱۷۳	.۷۱-۰.۹	.۹.۷۱	.۰.۶۴۱
فوتومتری / گلوكومتر مویرگی	.۰۵۴	.۹	.۶	.۰.۷۲-۰.۳	.۴.۲۳	-.۰.۰۸۱
گلوكومتر وریدی / گلوكومتر مویرگی	.۰۵۳	-.۶۵	.۶۹	-.۰.۷۱-۰.۲۵	.۴.۰۸	.۰.۱۷۷


جدول ۱- میانگین میزان گلوکز پلاسمای دستگاه گلوكومتر با دور روش وریدی و مویرگی.

روش اندازه‌گیری	میانگین (میلی گرم بازای دسی لیتر)	Bias	Equations Regression
فوتومتری	89.3±6.4	-----	
Easygluco vein	80.4±7.2	-9.4	17.3+0.702X
Easygluco labial	66.7±6.8	-34.8	0.9+0.61X



شکل ۲- نمودار Regression Plot و معادله رگرسیون روش‌های گلوكومتری وریدی (نمودار بالا) و مویرگی (نمودار پایین) با روش فوتومتری.

امروزه استفاده از دستگاه‌های گلوكومتر جهت تعیین میزان گلوکز خون در افراد مبتلا به دیابت در طب انسانی رایج شده است. این دستگاه‌ها این امکان را به بیمار می‌دهند که همواره میزان قند خون را تحت کنترل نگاه دارد. متأسفانه تعداد گلوكومترهای اختصاصی دام بسیار محدود بوده و با توجه به قیمت بالای نوارهای تشخیص آن‌ها چندان مقرر به صرفه نیست. کلیدی ترین نکته در کاربرد یک روش یادداشتگاه درمانی،



شکل ۱- نمودار Bland Altman Plot نتایج گلوكومتر با روش استاندارد فوتومتری. (A) مقایسه بین روش فوتومتری با گلوكومتری از نمونه خون وریدی (B) مقایسه بین روش فوتومتری با گلوكومتری از نمونه خون مویرگی.

روش‌های سریع، آسان، ارزان و قابل اعتماد است. در این روش‌ها نتایج به سرعت و توسط خود تکنیسین تعیین می‌شود در نتیجه پروسه درمان سریع‌تر آغاز و از اتلاف زمان و وقت جلوگیری خواهد شد. تعیین میزان گلوکز خون یکی از پارامترهای تشخیص کلیدی است که در تشخیص، پیشگویی و پیگیری روند درمان در برخی از بیماری‌های اسپ اهمیت دارد.



خون وریدی، ۰/۸۲۳ بود که در مقایسه با مطالعات انسانی همبستگی بسیار پایین تری را نشان می دهد. نتایج این مطالعه با نتایج مطالعات مشابه در اسب های بستره در بخش مراقبت های ویژه هم خوانی داشت (۱۲ و ۱۳). به نظر می رسد علت پایین بودن (r)، عدم کالیبراسیون دستگاه برای اسب، وجود حالت رولودر گلوبول های قرمزو همچنین بالا بودن میزان هماتوکریت در اسب باشد. ضریب همبستگی میان روش فوتومتری و دستگاه گلوکومتری با خون مویرگی بسیار پایین و بیانگر همبستگی پایین میان دور و شد. این حالت با توجه به تجمع بالای گلوبول های قرمز در مویرگ ها و حالت رولودر خون اسب قابل توجیه است. به نظر می رسد جهت برآمدن بر این مشکل بایستی از فاکتورهای اصلاح کننده بهره جست. همانطور که پیش از این ذکر شد غلظت گلوکز خون تام (۱۰-۱۵ درصد) در مقایسه با پلاسموسرم کمتر می باشد. لذا بایستی جهت برآمدن بر این مشکل از فاکتورهای اصلاح کننده بهره جست. فاکتور اصلاح کننده در این تحقیق ۱/۱ بdest آمد. نتایج این تحقیق بیانگر این نکته است که پس از اعمال فاکتور اصلاح کننده می توان به نتایج حاصل از گلوکومتر اعتماد نمود.

تشکر و قدردانی

بر خود واجب می دانیم از جناب آقای دکتر مهر آسا، جناب آقای مهندس محمد قلی بیگی، جناب آقای رضا نبی و کلیه پرسنل محترم باشگاه سوارگاری چوگان تهران کمال تشکر را داشته باشیم.

منابع

- براؤن، ک. (۱۳۷۸) نکاتی پیرامون طب اسب، چاپ اول، انتشارات نوربخش، صفحه ۳۰۹-۲۷۳.
- مجابی، ع. (۱۳۷۹) بیوژنیمی درمانگاهی دامپزشکی، انتشارات نوربخش، پاییز، صفحه ۱۵۲-۱۱۵.
- Parry, B.W., Anderson G. A., Gay, C.C. (1983) Prognosis in equine colic: a comparative study of variables used to assess individual cases. *Equine Vet J.*, Jul, 15(3):211-5.
- Camilla, L., Lieske, M. (2002) Evaluation of 4 hand held blood Glucose Monitors for use in Seabird Rehabilitation, *JSTOR, Dec*, 16(4): 277 - 285.

مقرن به صرفه بودن و قابل اعتماد بودن آن است. با توجه به نکات ذکر شده، ضرورت بررسی صحبت و دقت دستگاه گلوکومتر انسانی واستفاده از آن در اسب احساس می شود.

شناسایی بالینی هیپوگلیسمی در کره اسب ها و همچنین تعیین میزان گلوکز خون در اسب های مبتلا به کولیک نقش مهمی را در پیشگویی وضعیت بیمار و پیگیری روند درمان ایفا می کند (۳). با توجه به بعد مسافت میان باشگاه های سوارکاری و آزمایشگاه های دامپزشکی، در بسیاری از موارد دامپزشک علی رغم میل باطنی، رغبتی به استفاده از آزمایشگاه از خود نشان نمی دهد. از طرفی به علت تأخیر در ارسال نمونه به آزمایشگاه در بسیاری از موارد، نتایج دستخوش تغییرات قابل ملاحظه ای می گردد.

عوامل مؤثر بر نتایج حاصل از گلوکومتر عبارتند از:

- هماتوکریت: نتایج نشان می دهد هر چه میزان هماتوکریت بالاتر باشد، نتایج حاصل از گلوکومتر کاهش یافته تر خواهد بود و برعکس (۵).
- دهیدراسيون: دهیدراسيون شدید سبب کاهش کاذب نتایج می شود.
- چربی: مقدار بر بالای کلسترول و تری گلیسرید سبب بروز اختلال در نتایج می گردد (۵).
- سایر ترکیبات: عواملی نظیر اسید اوریک، گلوتاتیون و اسید آسكوربیک سبب تغییر نتایج خواهند شد.

مطالعات گستردگی در زمینه اعتبار سنجی دستگاه های گلوکومتر انسانی انجام شده است (۱۰-۱۴). مطالعات اندکی در رابطه با اعتبار سنجی دستگاه در موارد دامی و جود دارد (۱۱، ۱۴). در مطالعه حاضر جهت اعتبار سنجی دستگاه Easy gluco مطابق دستورالعمل ADA عمل شد. جهت بررسی تکرار پذیری C.V. تعیین شد. میزان C.V. به دست آمده در حد قابل قبول بود و مطابق استاندارد ADA، میزان انحراف بایستی صفر باشد که تابه حال در هیچ یک از دستگاه های موجود در بازار این میزان حاصل نشده است. میزان C.V. در مطالعه حاضر ۴/۱ بود که در سایر مطالعات نتایج مشابهی وجود دارد C.V. دستگاه های Advantage، Accucheck active، one touch، Glucoplus به ترتیب Accucheck ۴/۳، ۴/۷، ۸/۷، ۲/۶ و ۱۵/۷ درصد بوده است (۸). جهت بررسی همبستگی میان نتایج حاصل از دستگاه و روش فوتومتری ضریب همبستگی تعیین شد. در این مطالعه ضریب همبستگی (r) بین روش فوتومتری و دستگاه گلوکومتری



5. Essack, Y., Hoffman, M., Rensburg, M., Van Wyk, J., Meyer, CS., Erasmus, R. (2009) A Comparison of five glucometers in South Africa. *JEMDSA*, **14** (2): 102 - 105.
6. Florkowski, C., Budgen, C., Kendell, D., Lunt, H., Moore, P. (2009) Comparison of blood glucose meters in a New Zealand diabetes center. *Annals of clinical Biochemistry*, **46(4)**: 302 - 305.
7. Koratchev, B., Heinemann, L., Anderson, S., Clarke, W. (2008) Comparison of the Numerical and Clinical accuracy of Four Continuous Glucose Monitors. *Diabetes Care*, **31(6)**: 1160 - 1164.
8. Solnica, B., Naskalski, J. W., Gernand, W. (2008) Analytical evaluation of the Optium Xido blood glucose meter. *Clinical Chemistry and Laboratory medicine*, **46**: 143 - 147.
9. Vanavanant, S., Santanirand, P., Chaichanajarernkul, U., Dubois, J., Shirey, T., Heinz, M. (2010) Performance of a new interference - resistant glucose meter. *Clinical Biochemistry, Jan*, **43(1-2)**: 186 - 192.
10. Wu, MH., Fang, MY., Jen, LN., Hsiao, HC., Hsu, CT., Muller, A. (2008) Clinical Evaluation of Bionime Rightest GM310 Biosensors with a simplified Electrode Fabrication for Alternative - site blood Glucose tests. *Clinical chemistry*, **54(10)**: 1689.
11. Cohen, T., Nelson, R., Kass, P., Feldman, E. (2008) evaluation of six portable blood glucose meters in dogs, ACVIM: Abstract.
12. Hollis, A. R., Dallap, B. L., Boston, R. C., Wilkins, P. A. (2008) Comparison of the Accu - chek Aviva Point - of - care glucometer with Gas and laboratory methods of Analysis of glucose measurement in Equine Emergency patients. *Journal of veterinary internal medicine*, **22**: 1189 - 1195.
13. C. Russell, J. E., Palmer, Boston, R. C., Wilkins, P. A. (2007) Agreement between point-of-care glucometry, blood gas and laboratory-based measurement of glucose in an equine neonatal intensive care unit. *Journal of Veterinary Emergency and Critical Care*, **17** (3): 236 - 242.

