





ISSN ۹۸۸۰-۱۷۳۵

**فصلنامه فیزیولوژی و تکوین جانوری
علمی-پژوهشی**

جلد ۱۴، شماره ۱، زمستان ۹۹**شماره پیاپی ۵۲**

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

مدیر مسئول: مهدی رهنما

سردبیر: محمد مرادی

اعضاء هیئت تحریریه (به ترتیب حرف الفبا):

پیروز ابطحی

جواد بهار آرا

محمد رضا بیگدلی

زهرا دیلمی خیابانی

مهدی رهنما

شهربانو عربان

محمد مرادی

مخترع مختاری

هیات اجرایی:

مدیر داخلی: دکتر شهرزاد نصیری سمنانی

دکتر احمد مجد: ویراستار علمی

دکتر سعید آبریان: ویراستار انگلیسی

دکتر تورج عقدایی: ویراستار ادبی

دکتر حامد علیزاده: ویراستار استنادی

دکتر آرش شمس: کارشناس مجله

انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان: ناشر

دکر آرش شمس: مسئول نمایه سازی

حسن بابایی: طراحی و صفحه آرایی

نشانی: زنجان، اعتمادیه، خیابان معلم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، دفتر مجله فیزیولوژی و تکوین جانوری

۴۵۱۹۵-۱۴۶۴: صندوق پستی

۳۳۴۶۵۸۹۰-۰۰۲۴: تلفاکس

qjaphd@iauz.ac.ir: آدرس پست الکترونیکی

Qjaphd.sinaweb.net: آدرس وب سایت

۲۰۰۰۰۰: قیمت

نقل مطالب با ذکر مأخذ بلامانع است

مقالات این فصلنامه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) و بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran) نمایه می گردند.

براساس نامه شماره (۹۲/۱۰/۲۲-۳/۱۸/۵۳۷۱۱۳) وزارت علوم تحقیقات و فناوری، به این فصلنامه رتبه علمی
پژوهشی اعطا گردیده است.

راهنمای تنظیم و تدوین مقاله در فصل نامه فیزیولوژی و تکوین جانوری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

مقالات‌های پژوهشی در زمینه‌های مختلف مرتبط با فیزیولوژی و تکوین جانوری منوط به این که دارای نوآوری بوده و تاکنون متن کامل آن در سایر مجلات به چاپ نرسیده باشند، برای چاپ پذیرفته می‌شوند.

نحوه پذیرش مقاله

الف- مقاله به زبان فارسی و چکیده آن به زبان انگلیسی تدوین شود.

ب- مطالب هر مقاله به صورت زیر تنظیم شود:

عنوان مقاله می‌بایست کوتاه و بیان گر محتوای مقاله و حداکثر در ۲۰ کلمه تنظیم شده باشد.

اسامی‌نویسنده‌گان در زیر عنوان مقاله آورده شود. نشانی کامل محل کار نویسنده‌گان، با ذکر شماره در زیر اسامی‌نویسنده‌گان در صفحه اول آورده شود. لازم است که نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول مکاتبات به طور کامل ذکر شود. اسم نویسنده مسئول Bold و زیر آن خط دار باشد.

چکیده مقاله به زبان فارسی و انگلیسی باید مجموعه‌ای فشرده و گویا از مقاله با تاکید بر زمینه و هدف، روش کار، یافته‌ها و نتیجه گیری به دست آمده باشد و از ۲۵۰ کلمه (حدود ۲۰ سطر) بیشتر نباشد.

واژه‌های کلیدی در انتهای چکیده مقاله متناسب با متن مقاله به تعداد ۳ الی ۵ واژه آورده شود.

مقدمه با طرح مساله و بیان پژوهش‌های انجام شده، لزوم انجام پژوهش را توجیه نماید.

مواد و روش‌ها شیوه اجرای پژوهش و نحوه پردازش آماری داده‌ها در این بخش ارائه گردد.

نتایج در این بخش از توضیحات مختصری استفاده شود و آنالیز آماری آن‌ها به صورت متن، شکل، نمودار و یا جدول ارائه شود. نتایج به یک شیوه ارائه گردد. شکل‌ها، نمودارها و جدول‌ها باید گویا و دارای شماره باشند و مشخصات آماری و اطلاعات لازم از قبیل نام محورها، مقیاس و راهنمای نمودار روی آن‌ها مشخص باشد.

عنوان جدول‌ها در بالا و توضیح شکل‌ها و نمودارها در زیر آن‌ها به فارسی نوشته شود. اصل نمودارها به صورت دو بعدی بدون حاشیه و تزیینات اضافی تنظیم شود و ابعاد آن‌ها از ۸×۱۲ سانتی متر بزرگ‌تر نباشد. عکس‌ها به صورت فایل‌های مجزا و با کیفیت مناسب جهت چاپ با نامهای مشخص روی CD ضبط و به دفتر مجله ارسال شود.

عکس‌ها باید دقیق و روشن و به نحوی تهیه شوند که از نظر فنی چاپ آن‌ها با کیفیت مطلوب در مجله مقدور باشد. عکس‌ها و تصاویر باید دارای شماره گذاری متوالی بوده و ترتیب آن‌ها بر اساس ارجاع به آن‌ها در متن باشد.

ابعاد عکس‌های ارائه شده باید در یک اندازه و از ۸×۱۲ سانتی متر بزرگ‌تر نباشد. در پشت اصل عکس، عنوان مقاله و نویسنده و شماره عکس ذکر گردد. عکس‌ها باید اصل بوده و از ارسال فتوکپی و عکس‌های با کیفیت پایین خودداری و محل دقیق عکس‌ها در متن مشخص شود. بهتر است به صورت یک فایل جداگانه jpg تهیه شود.

بحث و نتیجه گیری با توجه به هدف تحقیق و مقایسه با یافته‌های سایر پژوهش‌ها، تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده انجام شود.

تشکر و قدردانی (در صورت لزوم)

منابع به صورت الفبایی (نام خانوادگی اولین مولف) تنظیم گردد و شماره هر مورد در متن داخل پرانتز آورده شود (مقاله) در نوشتن منابع، در صورت استفاده از منابع فارسی ابتدا این منابع و سپس منابع خارجی آورده شود.

مقاله: نام خانوادگی و نام نویسنده (نویسنده)، تاریخ انتشار، عنوان مقاله، نام اختصاری مجله، شماره و دوره مجله، صفحات اول و آخر مقاله استفاده شده.

نمونه فارسی:

۱- پورغلام ، رء، اسماعیلی، ف، فرهمند، ه، سلطانی، م، یوسفی، پ، مهداد، ح. ۱۳۸۰. بررسی مشخصه های خونی ماهی کپور علفخوار (*Ctenopharyngodon idella*) بعد از تماس با سم ارگانوفسفره دیازیتون. مجله علمی شیلات ایران. سال سوم . شماره ۱-۱۸ .۲

نمونه انگلیسی:

1. Frieman, S.G., Pearce, F.J. (1982). The role of blood glucose in defense of plasma volume during hemorrhage. J Trauma, 22 (3);86-92.

کتاب: نام خانوادگی و حروف اول نام نویسنده یا نویسندهان. عنوان کتاب. شماره چاپ. شهر محل چاپ: ناشر؛ سال انتشار، شماره صفحات.

Philips, S. J., Whisnant, J. P. Hypertension and Stroke. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. P.85-93.

مقاله کنفرانس: نام خانوادگی و حروف اول نام نویسنده یا نویسندهان. تاریخ انتشار، عنوان مقاله کنفرانس، نام کنفرانس..

Jamshidi, J., Pouresmaeili, F. (2012). Association of vitamin D receptor gene BsmI polymorphisms with bone mineral density in a population of Iranian women. European Human Genetics Conference, p. 390.

پایان نامه: نام خانوادگی و حروف اول نام نگارنده. تاریخ انتشار، عنوان پایان نامه. مقطع پایان نامه. دانشگاه و دانشکده. شماره صفحات.

Kaplan, S. J. (1995). Post-hospital home health care: the elderly access and utilization (dissertation). St Louis (MO): Washington University.

پ- اصطلاح. et al پس از نام شش نویسنده می آید. بنابراین اگر تعداد نویسندهان بیش از شش نفر باشد پس از نوشتن نام کامل شش نویسنده et al جایگزین نام نویسندهان بعدی گردد.

ت- معادل اصطلاحات در متن مقاله به زبان فارسی یا لاتین در داخل پرانتز آورده شود (مقاله نباید دارای زیر نویس باشد).

ث- شماره گذاری مقاله از چکیده مقاله شروع شده و تا پایان مقاله ادامه یابد.

ج- مقاله ترجیحاً کمتر از ۵ و بیش از ۱۵ صفحه نباشد و با نرم افزار Word2007 تایپ شود. ارسال CD الزامی است.

ج- مسئولیت صحت و سقم مطالب هر مقاله بر عهده نویسنده (نویسندهان) آن خواهد بود. ضمناً اسامی نویسندهان مقاله (اولویت قرار گرفتن و یا هر گونه تغییر تا پایان بررسی مقاله) صرفاً با امضای نویسنده مسئول امکان پذیر است.

ح- مجله حق رد، قبول، اصلاح، ویرایش و خلاصه نمودن مقاله را برای خود محفوظ می دارد. مقالات دریافتی به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.

خ- کلیه مقالات منطبق با شرایط فوق، بلاfaciale پس از وصول توسط هیئت تحریریه مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تائید مقاله ضمن اعلام به نویسنده، جهت داوری ارسال می گردد.

د- مقاله در یک نسخه اصل و سه نسخه کپی از مقاله (نسخ کپی فاقد اسم، آدرس نویسنده و تشکر و قدردانی باشد) به دفتر مجله ارسال گردد. ضمناً توجه گردد همراه مقاله در یک صفحه مجزا عنوان مقاله (فارسی و انگلیسی)، نام و نام خانوادگی نویسندهان (فارسی و انگلیسی)، مرتبه علمی و محل اشتغال آنها به همراه شماره تلفن محل کار و آدرس پست الکترونیکی نویسنده مسئول جهت تسریع در مکاتبات بعدی ذکر شود و یک تعهدنامه با امضای تمام نویسندهان به پیوست آن ارسال گردد.

ذ- در کلیه مراحل بررسی مقاله، ایرادات و اصلاحات مورد نیاز جهت تامین نظر داوری برای نویسنده ارسال می شود و در صورت تایید نهایی مقاله ضمن اعلام به نویسنده، در نوبت چاپ قرار می گیرد. نسخه های مجله پس از چاپ به تعداد نویسندهان هر مقاله به آدرس نویسنده مسئول ارسال خواهد شد.

فهرست مطالعه

- ◀ اثر سطوح مختلف عصاره بارهنگ کبیر (*Plantago major*) بر عملکرد رشد در جیره غذایی کپور معمولی
۱.....(Cyprinus carpio)
عبدالبیش واحدی، حامد پاکنژاد، محمد سوداگر، علی شعبانی، علی جافر
- ◀ برسی چند شکلی ۳۰ نشانگر ریزماهواره در بز مرخز.....
سجاد بادبرین، رضا سید شریفی، حسن خمیس آبادی، جواد احمد پناه
- ◀ برسی تاثیر کوئرستین بر تکثیر و تمایز سلول های بنیادی پیش ساز عصبی ناحیه زیر بطنی(svz) مغز رت های بالغ..
علی ابراهیمی، کاظم پریور، نسیم حیاتی روباری، اکرم عبدی
- ◀ هیستومورفولوژی طحال، کبد و پانکراس چکاوک طرقه.....
مهرداد ملائی، جلیل پور حاجی موتاب
- ◀ طراحی و ساخت دستگاه تجمعی ارزیابی انواع حافظه و یادگیری به همراه جهت یابی آگوستریک و آلوستریک
برای موش.....
ملیکا نادری، محمدرضا ییگدلی
- ◀ برسی تاثیر روغن مغز گردو غنی شده با β -sitosterol در شاخص های خونی و عملکرد کبدی رت های مبتلا به
دیابت.....
منیره قربانی، عبدالحسین شیروی، غلامحسن واعظی، ویدا حجتی، حمید سپهری
- ◀ اثر شوری های مختلف بر فاکتورهای رشد ، بقا و شاخص های خون شناسی بچه ماهی ماهی قزل آلای رنگین کمان
۸۷.....(Oncorhynchus mykiss)
میلاد رنجبر، مجید محمدنژاد، محمدرضا قمی
- ◀ برسی اثر عصاره هیدروالکلی پوست موز بر بروز ستگ کلیه اگزالت کلسیمی در موش های نر صحرایی نژاد ویستار
۹۹.....القاء شده توسط اتیلن گلیکول.....
سمیرا بابای نوروزی، پرستو رحیمی، مهدی رهنما
- ◀ مطالعه بافت شناسی استخوانچه های گوش میانی در گاومیش رودخانه ۶ ای بالغ.....
سید رشید هاشمی ، رسول شهروز، فرهاد سلطانعلی نژاد، غلامرضا نجفی

اثر سطوح مختلف عصاره بارهنگ کبیر(*Plantago major*) بر عملکرد رشد در جیره غذایی کپور معمولی(*Cyprinus carpio*)

DOR: <https://dorl.net20.1001.1.17359880.1399.14.1.1.4>

عبدالبشار واحدی^۱، حامد پاکنژاد^۲، محمد سوداگر^۳، علی شبانی^۳، علی جافر^۳

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد(پوهنیار، دانشکده کشاورزی دانشگاه کندز-افغانستان)، گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم

کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گلستان.ایران. bashir512wahidi@yahoo.com

۲- دانشیار، گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گلستان.ایران.

۳- دکتری تکثیر و پرورش، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گلستان.ایران.

تاریخ دریافت: ۹۹/۸/۵ تاریخ پذیرش: ۹۹/۹/۳۰

چکیده

زمینه و هدف: بارهنگ کبیر یکی از گیاهان طبی بوده که در طب سنتی برای درمان بیماری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سطوح مختلف عصاره بارهنگ کبیر *L. Plantago major* بر بخش از شخص‌های رشد و کارایی تغذیه در بچه ماهی‌های کپور معمولی (*Cyprinus carpio*) انجام شد.

روش کار: بدین منظور تعداد ۲۰۴ قطعه بچه ماهی کپور معمولی با میانگین وزنی ($18/69 \pm 2/09$ گرم) در ۴ تیمار و هر تیمار با ۳ تکرار شامل: شاهد(بدون عصاره)، تیمار عصاره بارهنگ کبیر ($1/05$ ، $0/05$ و $0/05$ درصد عصاره بارهنگ کبیر در کیلوگرم غذا) توزیع گردید. تغذیه بچه ماهیان ۲ بار در روز و به میزان ۳ درصد وزن بدن و دوره آزمایشی ۴۵ روز به طول انجامید. زیست سنجی بچه ماهیان هر ۲ هفته یک بار انجام شد.

یافته‌ها: نتایج پژوهش در پایان دوره آزمایش نشان داد شاخص‌های رشد(افزایش وزن، درصد افزایش وزن، ضریب چاقی، ضریب رشد ویژه، افزایش وزن روزانه و درصد افزایش وزن روزانه) و برخی شاخص‌های تغذیه‌ای (ضریب تبدیل غذایی و ضریب بازده غذایی) در تیمارهای مختلف تقاضوت معنی داری با گروه شاهد نداشتند($P > 0/05$). بیش ترین و کم ترین افزایش وزن، درصد افزایش وزن و ضریب چاقی به ترتیب در تیمار $1/0$ درصد عصاره بارهنگ و شاهد مشاهده شد. بیش ترین و کم ترین ضریب رشد ویژه به ترتیب در تیمارهای $1/0$ و $0/5$ درصد عصاره بارهنگ و شاهد مشاهده گردید. کم ترین ضریب تبدیل غذایی در تیمار 1 درصد عصاره و کم ترین ضریب بازده غذایی در شاهد مشاهده گردیده است.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج سطوح مختلف عصاره بارهنگ بر عملکرد رشد و کارایی تغذیه تأثیری قابل توجهی نداشته است.

واژه‌های کلیدی: عصاره بارهنگ کبیر، رشد، کپور معمولی.

مقدمه

گراد تغذیه می‌نمایند کپور معمولی جانوری همه چیز خوار است(۷) که از سال ۱۹۵۰ صنعت آبزی-پروری، با افزایش سالانه تقریباً 10% درصدی در بخش کشاورزی سریع ترین رشد را در جهان داشته است(۳۱). رشد سریع، کارایی تغذیه و افزایش مقاومت در برابر بیماری‌ها و استرس، از اهداف مهم در صنعت آبزی-پروری محسوب می‌شود(۳۶). مطالعات متعددی نشان داده که استفاده از افروزنی‌های غذایی

ماهی کپور معمولی از خانواده Cyprinidae با نام علمی *Cyprinus carpio Linnaeus* ۱۷۵۸- (۳۲). مهم ترین گونه ماہی پرورشی در بسیاری از مناطق جهان بوده که $71/9$ درصد تولیدات آب شیرین را تشکیل می‌دهند. این ماہی یک غذای لذیذ در سراسر دنیا برای مصرف کنندگان به شمار می‌رود(۳۳، ۴۱). دمای مناسب جهت رشد این ماہیان 18 تا 25 درجه سانتی گراد می‌باشد و در دمای $10-30$ درجه سانتی

بارهنگ به نام‌های بارهنگ کبیر (*Plantago major*) و بارهنگ سرنیزه‌ای (*Plantago lanceolate*) مورد استفاده قرار می‌گیرد. بارهنگ کبیر حاوی ترکیبات فعال بیولوژیکی مانند آلkalالوئیدها، پلی ساکاریدها، لیپیدها، مشتقات اسید کافئیک، فلاونوئیدها، گلیکوزیدها، ایریدوئید، ترپنوفئیدها، اسیدهای چرب، موسیلاژ، اسیدهای آلی، پلی ساکارید، ماده پلاتنتازین، فلاونوئید، کاروتونوئید، اکوبین، کاتالپین، ساپونین، اینورتین، اپی گنین، سوربیتول، مواد معدنی، ویتامین‌ها، تانن، رزین و صمغ بوده و ترکیبات فلاونوئیدها یکی از مشخص ترین ترکیبات در *Plantago* است (۵، ۲۲). هم چنین بارهنگ کبیر به عنوان یک ماده بی‌هوشی، ویروس‌کش، ضد التهاب، قابض، ضد انگل، ضد درد، محرك روحی، ضد هیستامین، ضد روماتیس، ضد تومور، ضد زخم، ادرار آور، خلط آور و پایین آورنده فشار خون در طب سنتی مورد استفاده قرار گرفته است. دانه‌های این گیاه برای مدت طولانی به منظور ضد عفونی، تعدیل کننده سیستم ایمنی، ضد التهاب، ضد درد، ضد میکروب، ضد زخم، آنتی اکسیدان، عامل ضد سرطان و هم چنین برای اهداف ترمیم زخم استفاده شده است (۱۷، ۲۷). با توجه این که بارهنگ کبیر به روی آبزیان کار نشده به مطالعات مشابه اشاره می‌گردد. مطالعات پژوهش باث و همکاران نشان داد که ۱۰ گرم بر کیلو گرم عصاره برگ چینکو بیلوبا در رژیم غذا ماهی در مقایسه با شاهد باعث افزایش عملکرد رشد در کپور معمولی شده است (۱۶). نتایج پژوهش بیلین و همکاران نشان داد که وزن نهایی، افزایش وزن WG و نرخ رشد ویژه SGR در تیمارهای ۰/۵ و ۱ گرم بر کیلو گرم در مقایسه با شاهد به طور معنی داری افزایش را نشان داده و در مقدار نرخ تبدیل غذایی FCR تفاوتی مشاهده نشد. عصاره صمغ لیمو تاثیر بر عملکرد رشد، ماهی قزل آلای رنگین

در مزارع پرورشی ماهی یک روش معمولی برای افزایش وزن، بازدهی غذایی و مقاومت در برابر بیماری بوده است. در میان افزودنی‌های غذایی، مواد گیاهی به دلیل منشأ طبیعی آن‌ها در صنعت آبزی پروری مورد توجه قرار گرفته است (۳۰، ۲۰). محققان برای جلوگیری از تلفات ماهی به دلیلی بیماری‌های عفونی یا غیر عفونی ناشی از استرس تمرکز خود را روی سیستم ایمنی بدن ماهی نموده و جایگزینی برای داروهای شیمیایی مانند: آنتی بیوتیک‌ها از گیاهان داروی استفاده نمودند (۱۹). استفاده از مکمل‌های غذایی مانند: پروبیوتیک‌ها، پری بیوتیک‌ها و سین بیوتیک‌ها به منظور افزایش رشد و کارایی مصرف جیره یکی از ایده‌های مطرح در این رابطه می‌باشد (۲). عصاره‌های گیاهی به جهت تقویت حالت آنتی اکسیدانی، عملکرد رشد بهتر و تولید محصولات سالم‌تر در جیوه ماهیان مورد استفاده قرار می‌گیرند. گیاهان دارویی و ترکیبات فعال زیستی آن‌ها از قبیل آلkalالوئیدها، ترکیبات فنولی و استروئیدها برای ارگانیزم‌های آبزی به منظور افزایش عملکرد رشد، پاسخ به استرس و ایمنی بدن ماهی مورد استفاده قرار می‌گیرد (۲۱). محصولات دارویی گیاهان به عنوان تقویت کننده سیستم ایمنی در انسان، موش و سایر جانوران مورد مطالعه قرار گرفته است و از آن‌ها به عنوان مواد افزودنی و درمانی برای ماهی استفاده شده است (۱۶). عصاره و پودر درخت پر *Tetra Cotinus*, *Lactuca indica*, *coggyna* عصاره‌های قارچ صدف *Pleurotus ostreatus* و *Capparis spinosa*, عصاره گیاه *Urtica dioica* در برابر عوامل بیماری زای ماهی موثر بوده و گزارش‌ها نشان می‌دهد که برخی گیاهان دارویی بر عملکرد رشد، بقا و فعل شدن سیستم ایمنی در ماهی اثر گذار است (۱۶). در طب سنتی ایران دو گونه‌ای

محلول حاصله را در لوله فالکن ریخته و در سانتریفیوژ(۵۶۰۰ دور در دقیقه، ۱۰ دقیقه زمان و دمای ۴ درجه سانتی گراد) قرار داده و سوپرناتانت جدا شده را به دستگاه روتاری منتقل کرده تا در دمایی ۵۰ درجه سانتی گراد الکل از محلول جدا گردد. به منظور تغییط بیشتر عصاره، از دستگاه آون با دمای ۵۰ درجه سانتی گراد استفاده شد(۲۳).

آماده سازی غذا

غذای مورد استفاده در این پژوهش از غذای تجاری (خوراک ماهی کپور، شرکت سلین) استفاده شد. به منظور انتقال عصاره به غذا هر دو هفته یک بار با محاسبه میزان غذا و مقدار عصاره بر اساس تیمارهای آزمایش، ابتدا عصاره با میزان مشخص الکل مخلوط و بعد از محلول شدن به جیره غذایی هر تیمار اسپری می-گردید. به منظور جلوگیری از تاثیر الکل به گروه شاهد فقط میزان محاسبه شده الکل اسپری گردید به منظور حذف الکل جیره غذایی به مدت ۲۴ ساعت در محیط قرار داده شد. میزان غذادهی ۲ بار در روز و به میزان ۳ درصد وزن بدن انجام شد(۲۳).

زیست سنجی

در طول دوره آزمایش هر ۱۵ روز یک بار زیست سنجی ماهیان انجام شد. ۲۴ ساعت قبل و بعد از زیست سنجی غذادهی قطع شده و برای زیست سنجی ابتدا با استفاده از اسانس گل میخک، با غلاظت ۱۰۰ میلی گرم در لیتر بچه ماهیان را بیهوش کرده(۸) و با استفاده از خط کش با دقت ۰/۱ میلی متر طول ماهیان و ترازوی دیجیتال با دقت ۰/۰۱ میلی گرم وزن ماهیان مورد سنجش و ثبت قرار گرفت.

اندازه گیری شاخص های رشد

در پایان دوره آزمایش، با توجه به زیست سنجی های انجام شده در طول دوره پرورش شاخص های رشد، و تغذیه شاملافراش وزن(WG)،

کمان داشته است(۱۹). بارهنگ سرنیزه ای باعث افزایش شاخص های رشد، افزایش پاسخ های ایمنی و فعالیت آنزیم آنتی اکسیدانی در ماهی قزل آلای رنگین کمان شده و هیچ تاثیر در خون شناسی ماهی قزل آلای رنگین کمان ندارد(۲۱). از آن جا که اثر محرک رشد بارهنگ کمیر در ماهیان مورد بررسی قرار نگرفته است، پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر سطوح مختلف عصاره الکلی بارهنگ کمیر بر شاخص های رشد و تغذیه در بچه ماهی کپور معمولی انجام شده است.

مواد و روش ها

این پژوهش، بهمن ۱۳۹۸ در مرکز آبزی پروری شهید ناصر فضلی بر آبادی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. تعداد ۲۰۴ قطعه بچه ماهی کپور معمولی با میانگین وزنی ($18/69 \pm 2/09$ گرم) از یکی از کارگاه های پرورش ماهیان استخوانی بخش خصوصی تأمین و به محل انجام آزمایش منتقل شدند. پس از دوره سازگاری ده روزه، مخزن ها با نمک ضد عفنی گردید. این آزمایش در یک طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار و هر تیمار با سه تکرار شامل: شاهد (بدون عصاره بارهنگ کمیر)، ۰/۱، ۰/۵ و ۱ درصد عصاره بارهنگ کمیر در کیلو گرم غذا(۱۹)، در ۱۲ مخزن فایبر گلاس ۴۰۰ لیتر با حجم آبگیری ۵۰ لیتر و در هر مخزن ۱۷ قطعه بچه ماهی توزیع گردید. جهت حذف فضولات ماهیان و بقایایی غذایی هر روز ۸۰ درصد آب مخزن تعویض شد.

آماده سازی عصاره

عصاره گیری تخم بارهنگ کمیر به روش Nhu و همکاران انجام شد(۲۹). به این ترتیب بذر گیاه بارهنگ کمیر از بازار محلی تهیه شده توسط آسیاب برقی پودر گردید. ۴۰۰ گرم پودر بارهنگ با ۱۲۰۰ میلی لیتر الکل ۹۶ به نسبت ۱:۳ مخلوط گردیده و به مدت ۷۲ ساعت در شیکر گذاشته شد تا کاملاً مخلوط گردد، سپس

آنالیز داده های رشد بعد از پژوهش دو شرط اصلی آزمون پارامتریک تجزیه واریانس (هموژن بودن واریانس و نرمال بودن داده ها) انجام شده و برای آنالیز داده ها از آزمون واریانس یک طرفه و آزمون مقایسه میانگین از نظر آماری در سطح $p \leq 0.05$ با استفاده از نرم افزار SPSS، نسخه ۲۵ انجام شد. نمودارها و جداول نیز با استفاده از نرم افزار اکسل نسخه ۲۰۱۶ تهیه گردید.

نتایج

نتایج آزمایش سطوح مختلف عصاره بذر بارهنگ کبیر تغذیه شده بر شاخص های رشد و تغذیه در ماهی کپور معمولی در جدول ۱ نشان داده شده است. در آغاز پژوهش شاخص های طول اولیه و وزن اولیه تیمارها در مقایسه با شاهد تفاوت معنی داری نداشت. در پایان آزمایش نتایج نشان داد که سطوح مختلف عصاره بارهنگ (۰/۱، ۰/۵ و ۱ گرم عصاره بارهنگ در کیلو گرم غذای تجاری) بر شاخص های رشد (وزن نهائی، طول نهائی، افزایش وزن، درصد افزایش وزن، ضریب رشد ویژه، فاکتور وضعیت، افزایش وزن روزانه، درصد افزایش وزن روزانه و بقا) و شاخص های تغذیه (ضریب تبدیل غذا و ضریب بازده غذایی) در مقایسه با شاهد تفاوت معنی داری نداشت، بیشترین افزایش وزن، درصد افزایش وزن، ضریب چاقی، ضریب رشد ویژه، افزایش وزن روزانه و درصد افزایش وزن روزانه در تیمار ۰/۱ درصد و کمترین ضریب تبدیل غذایی در تیمار ۱ درصد در مقایسه با سایر تیمارها و شاهد گزارش شد. در طول دوره نرخ بازماندگی در مقایسه با شاهد معنی دار نبوده است.

درصد افزایش وزن (PWG)، فاکتور وضعیت یا ضریب چاقی (CF)، ضریب رشد ویژه (SGR)، ضریب تبدیل غذایی (FCR)، افزایش وزن روزانه (DWG)، درصد میانگین رشد روزانه (ADG)، نرخ بازده غذایی (FER)، نرخ بقا (SR) با استفاده از فرمول ها زیر محاسبه شد (۳۳، ۳۷، ۴۰):

$$\text{افزایش وزن (گرم)} = \text{میانگین وزن نهائی (گرم)} - \text{میانگین وزن اولیه (گرم)}$$

$$\text{درصد افزایش وزن (درصد)} = [\text{میانگین وزن نهائی (گرم)} - \text{میانگین وزن اولیه (گرم)}] \div \text{میانگین وزن اولیه (گرم)} [100 \times]$$

$$\text{ضریب چاقی} = [\text{وزن بدن (گرم)} \div \text{طول بدن کل مکعب}] [100 \times]$$

$$\text{نرخ رشد ویژه} = [\text{لگاریتم طبیعی وزن نهائی} - \text{لگاریتم طبیعی وزن اولیه}] \div \text{طول دوره پرورش} [100 \times]$$

$$\text{ضریب تبدیل غذایی} = \text{میزان غذای مصرف شده (گرم)} \div \text{میزان افزایش وزن بدن (گرم)}$$

$$\text{افزایش وزن روزانه} = \text{میانگین وزن نهائی (گرم)} - \text{میانگین وزن اولیه (گرم)} \div \text{طول دوره پرورش}$$

$$\text{درصد میانگین رشد روزانه} = [\text{میانگین وزن نهائی (گرم)} - \text{میانگین وزن اولیه (گرم)}] \div \text{طول دوره پرورش} [100 \times]$$

$$\text{نرخ بازده غذایی} = \text{افزایش وزن تر بدن (گرم)} \div \text{مقدار غذایی خورده شده (گرم)}$$

$$\text{نرخ بقا} = ((\text{تعداد ماهیان نهائی} - \text{تعداد ماهیان اولیه}) \div (\text{تعداد ماهیان اولیه})) [100 \times]$$

تجزیه و تحلیل داده ها

جدول ۱- شاخص های کیفی آب

دمای آب (درجه سانتی گراد)	اکسیژن محلول (میلی لیتر در لیتر)	pH آب
۸/۷۲-۶/۹۰	۶-۵/۵	۱۹±۱/۰۲

جدول ۲- اثرات سطوح مختلف عصاره بارهنج کبیر بر عملکرد رشد و تغذیه‌ی بچه ماهی کپور معمولی در یک دوره ۴۵ روزه، با میانگین ± انحراف معیاری بیان گردیده است.

سطوح مختلف عصاره بذر بارهنج کبیر					شاخص‌های رشد
۱%	۵٪	۱۰٪	۲۰٪	۳۰٪	
^a ۱۸/۸۰±۰/۲۳	^a ۱۸/۶۰±۰/۱۶	^a ۱۸/۷۰±۰/۲۵	^a ۱۸/۶۷±۰/۱۵	^a ۱۸/۶۷±۰/۱۵	وزن اولیه(گرم)
^a ۲۴/۱۹±۲/۷۳	^a ۲۳/۹۵±۲/۰۷	^a ۲۴/۳۰±۳/۸۳	^a ۲۱/۸۸±۱/۳۴	^a ۲۱/۸۸±۱/۳۴	وزن نهایی(گرم)
^a ۱۰/۱۹±۰/۷۸	^a ۱۰/۲۷±۰/۷۸	^a ۱۰/۲۷±۰/۷۸	^a ۱۰/۲۷±۰/۷۸	^a ۱۰/۲۷±۰/۷۸	طول اولیه(سانتی متر)
^a ۱۱/۰۳±۰/۰۶	^a ۱۱/۰۵±۰/۰۹	^a ۱۰/۹۳±۰/۲۳	^a ۱۰/۸۳±۰/۳۲	^a ۱۰/۸۳±۰/۳۲	طول نهایی(سانتی متر)
^a ۱/۷۴±۰/۰۳	^a ۱/۷۱±۰/۰۲	^a ۱/۷۳±۰/۰۳	^a ۱/۷۳±۰/۰۲	^a ۱/۷۳±۰/۰۲	فاکتور وضعیت اولیه
^a ۱/۸۰±۰/۲۲	^a ۱/۷۷±۰/۱۳	^a ۱/۸۵±۰/۱۶	^a ۱/۷۷±۰/۰۵	^a ۱/۷۷±۰/۰۵	فاکتور وضعیت نهایی
^a ۵/۳۹±۲/۵۲	^a ۵/۳۷±۲/۰۱	^a ۵/۶۰±۴/۰۴	^a ۳/۲۲±۱/۲۲	^a ۳/۲۲±۱/۲۲	افزایش وزن بدن (گرم)
^a ۲۸/۵۵±۱۳/۰۱	^a ۲۸/۹۰±۱۰/۷۵	^a ۳۰/۱۲±۲۲/۱۲	^a ۱۷/۲۲±۶/۴۰	^a ۱۷/۲۲±۶/۴۰	درصد افزایش وزن بدن (درصد)
^a ۰/۰۵±۰/۱۹	^a ۰/۰۵۶±۰/۱۹	^a ۰/۰۵۶±۰/۳۶	^a ۰/۰۳۵±۰/۱۲	^a ۰/۰۳۵±۰/۱۲	ضریب رشد ویژه (درصد در روز)
^a ۲/۵۱±۱/۱۰	^a ۲/۹۶±۱/۲۹	^a ۳/۴۰±۱/۷۶	^a ۴/۷۴±۱/۶۲	^a ۴/۷۴±۱/۶۲	ضریب تبدیل غذا
^a ۰/۰۲۰±۰/۰۱۰	^a ۰/۰۲۲±۰/۰۰۸	^a ۰/۰۲۳±۰/۰۱۷	^a ۰/۰۱۴±۰/۰۱۵	^a ۰/۰۱۴±۰/۰۱۵	ضریب بازده غذایی
^a ۰/۱۱±۰/۰۶	^a ۰/۱۲±۰/۰۴	^a ۰/۱۲±۰/۰۹	^a ۰/۰۷±۰/۰۳	^a ۰/۰۷±۰/۰۳	افزایش وزن روزانه (گرم)
^a ۰/۶۳±۰/۲۹	^a ۰/۶۳±۰/۲۴	^a ۰/۶۷±۰/۴۹	^a ۰/۳۸±۰/۱۴	^a ۰/۳۸±۰/۱۴	افزایش وزن روزانه (درصد)
۱۰۰^a		۱۰۰^a		۱۰۰^a	
بقاء					

* حروف یکسان انگلیسی معنی دار نبودن $P < 0.05$ را بین تیمارهای پژوهش نشان می‌دهند.

تیمار ۱ درصد عصاره و کمترین ضریب بازده غذایی در شاهد مشاهده گردید. در کل یافته‌های پژوهش حاضر در مقایسه با یافته‌های پژوهش‌های پژوهشگران قبلی به احتمال زیاد نظر به دلایلی چون گونه ماهی، سن گونه پرورشی، گونه گیاه و ترکیبات آن، استفاده از قسمت‌های مختلف گیاه، زمان آزمایش، مدت آزمایش، شرایط و محیط پرورش، رفتارهای غذایی، دوره‌های غذادهی، خصوصیات فزیولوژیکی گونه پرورشی و خصوصیات آب و غیره در تناقض است. مطالعات بسیار محدودی در مورد تأثیر استفاده عصاره گیاهی بارهنج کبیر در جانوران و آبزیان موجود بوده است. با توجه به محدود بودن مطالعه حاضر به مواردی مشابه اشاره می‌گردد. پژوهش Awad and Awaad (۲۰۱۷) نشان داد که گیاهان از طریق تزریق، محلوت با خوراک بر عملکرد رشد ماهیان مهم بوده در رژیم غذایی ماهیان ضروری به نظر می‌باشد.

بحث و نتیجه‌گیری

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که سطوح مختلف عصاره الکلی بذر بارهنج کبیر (۱ گرم، ۵ گرم و ۱۰ گرم در کیلوگرام غذایی تجاری) بر شاخص‌های رشد (افزایش وزن، درصد افزایش وزن، ضریب رشد ویژه، ضریب چاقی، افزایش وزن روزانه و درصد افزایش وزن روزانه) و برخی شاخص‌های غذایی (ضریب تبدیل غذایی و ضریب بازده غذایی) در ماهی کپور معمولی در یک دوره ۴۵ روزه در مقایسه با شاهد تفاوت معنی داری را نشان نداد و همچنان نرخ بقا تمام تیمارها با شاهد مشابه بوده است. بیشترین و کمترین افزایش وزن، درصد افزایش وزن و ضریب چاقی در تیمار ۱/۰ درصد عصاره بارهنج و شاهد مشاهده شد. بیشترین و کمترین ضریب رشد ویژه در تیمارهای ۱/۰ و ۰/۵ درصد عصاره بارهنج و شاهد مشاهده گردید. کمترین ضریب تبدیل غذایی در

ملاحظه‌ای داشته است(۲۴). یوسفی و همکاران(۲۰۱۹)، بررسی اثر رژیم غذایی پودر برگ رزماری (*Salvia rosmarinus*) با تیمارهای شاهد(۰٪)، ۱، ۲ و ۳ درصد پودر برگ رزماری بر شاخص‌های رشد، در ماهی انگشت قد کپور معمولی با میانگین وزنی 0.09 ± 0.03 در مدت ۶۵ روز مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که پودر برگ رزماری به خصوص سطوح(۲ و ۳ درصد) در غذایی ماهی اثرات بالقوه‌ای بر افزایش شاخص‌های رشد داشته است(۴۱). مطالعات جهازی و همکاران(۲۰۱۹)، نشان داد که 0.02% عصاره پلی فنول در غذای ماهی نسبت به شاهد در شاخص‌های رشد ماهی کپور معمولی افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است(۲۵).

نتایج مطالعات حسن پور و همکاران(۱۳۹۶)، نشان داد که عصاره چای سبز شاخص‌های رشد را در تاس‌ماهی هیبرید بهبود بخشدید(۶). مطالعات پژوهش غلام پور و همکاران(۱۳۹۵) نشان داد که ماهیان تغذیه شده با جیره غذایی حاوی عصاره گیاهی در شاخص‌های رشد، تغذیه‌ای و بقاء نسبت به گروه شاهد در وضعیت بهتری قرار داشتند($p \leq 0.05$)(۱۰).

مطالعات پژوهش فرامرزی و همکاران(۱۳۹۵)، نشان داد که افزودن سطوح مختلف پودر یونجه تا میزان ۹ درصد جیره و عصاره الکلی تا میزان ۴ درصد منجر به رشد روزانه، نرخ رشد ویژه، ضریب چاقی، شاخص نسبت بازده غذایی با اختلاف معنی داری نسبت به تیمار شاهد در جیره غذایی ماهی کپور معمولی شده است($p \leq 0.05$)(۱۱). نتایج پژوهش برترینا و همکاران(۱۳۹۶)، نشان داد تقریباً تمام شاخص‌های رشد مورد مطالعه که شامل افزایش وزن، افزایش طول، نرخ رشد نسبی و درصد رشد در تیمار تغذیه شده با جیره حاوی ۱۰ گرم در کیلوگرم خوراک پودر دارچین

رسند(۱۵). نتایج مطالعات کاویانی فرد و همکاران(۱۳۹۵)، نشان داد که عصاره هیدروالکلی بارهنگ دارای اثر ضد تشنجی دارد. اثر عصاره بارهنگ سرینیزه‌ای با سطوح(۰٪، ۱، ۲ و ۳ گرم بر کیلوگرم عصاره بارهنگ سرینیزه‌ای)، با میانگین وزنی 36.1 ± 56.99 گرم ماهی قزل آلای رنگین کمان(*Oncorhynchus mykiss*)، مدت ۹۰ روز با هدف بررسی عملکرد رشد مورد مطالعه قرار گرفت(۱۲). نتایج نشان داد که وزن نهایی، افزایش وزن و ضریب رشد ویژه در تیمار ۱، ۲ و ۳ گرم بر کیلوگرم عصاره بارهنگ سرینیزه‌ای در مقایسه با شاهد به طور معنی داری افزایش یافته اما در مقدار FCR بین تیمارهای مختلف اختلاف معنی داری مشاهده شد(۲۱). بررسی اثر رژیم غذایی نعناع (*Mentha piperita*) را در چهار تیمار با سطوح شاهد(۰٪)، ۱٪، ۲٪ و ۳٪ عصاره نعناع بر عملکرد رشد، ماهی سفید کاسپین(*Rutilus frisii kutum*) با میانگین وزنی 0.14 ± 0.12 گرم در مدت ۸ هفته مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که رژیم غذایی نعناع باعث افزایش عملکرد رشد شده است(۱۳). مطالعات محمدی و همکاران(۲۰۲۰)، نشان داد که عصاره زنجیل با دوزهای 0.4 و 0.2 گرم بر کیلوگرم در غذای ماهی در مقایسه با شاهد در شاخص‌های رشد افزایش قابل ملاحظه داشته است در نتیجه عصاره زنجیل در سطح 0.2 گرم بر کیلوگرم دوز مطلوب بوده باعث بهبود عملکرد رشد در کپور معمولی شده است. و بیشترین اثرات بهبود دهنده سیستم ایمنی عصاره زنجیل در سطح 0.4 داشته که به طور موثر رشد و سلامتی کپور معمولی را بهبود می‌بخشد(۶). نتایج پژوهش حسینی و همکاران(۲۰۲۰)، نشان داد که پکتین استخراج شده پوست پرتقال به جیره غذایی ماهی در شاخص‌های رشد، SGR، FW، WG و افزایش قابل

عملکرد رشد در تمام گروه‌ها به طور معنی داری در مقایسه با شاهد افزایش یافته است (۳۹). بررسی تاثیر افزودنی نعناع فلفلی (*Mentha piperita*) با تیمارهای (شاهد، ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ گرم بر کیلو گرم رژیم غذایی نعناع فلفلی) بر عملکرد رشد، بقا، ماهی سیباس آسیایی (*Lates calcarifer*) (بلوچ) با میانگین وزنی 20 ± 1 گرم در برابر عفونت باکتری ویبروهرموی (*Vibrio harveyi*) در مدت ۴ هفته مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که رژیم غذایی نعناع فلفلی تغذیه شده باعث کاهش مرگ و میر شده و به طور معنی داری، بقا، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی در تیمارها نسبت به شاهد بهبود یافته است (۳۴). یافته‌های پژوهش گران متذکره با یافته‌های پژوهش حاضری هم خوانی نداشتند، ممکن است به دلایل هم‌چون: شرایط پرورش، استفاده از دوزهای نامناسب یا دوره‌های غذادهی با جیره تجاری، گونه‌های متفاوت ماهی، وزن، سن باشد. یافته‌های این پژوهش نشان داد که سطوح مختلف عصاره بارهنگ کمتر بر شاخص‌های رشد و تغذیه ماهی کپور معمولی اثر نداشتند و تفاوت قابل ملاحظه‌ای با سایر تیمارها مشاهده نشدند بنابراین نتایج پژوهش‌های ذیل با پژوهش حاضر هم خوانی دارد. در این مطالعات، پارائی و همکاران (۲۰۲۰)، بررسی تأثیر رژیم غذایی عصاره برگ بلوط (*Quercus castaneifolia*) با سطوح شاهد (۰، ۰/۵، ۱ و ۲ گرم بر کیلو گرم بر عملکرد رشد در کپور معمولی با میانگین وزنی ۲۰ گرم، مدت ۶۰ روز مورد مطالعه قرار گرفت. تاثیر معنی داری بالای شاخص‌های رشد نداشت (۳۰). نتایج پژوهش ییگی و همکاران (۱۳۹۷)، نشان داد که عصاره برگ بلوط تاثیر معنی داری بر شاخص‌های رشد ماهی نداشتند است. در پژوهش دیگر نشان می‌دهد که با افزایش پوست پرتقال در جیره غذایی تا ۵ گرم در کیلو گرم سبب بهبود تمام فاکتورهای مربوط

بودند، افزایش معنی داری نسبت به تیمار شاهد داشت ($p \leq 0/05$). اثرات عصاره الکلی برگ نیلوفر آبی با سطوح (۰/۰۷، ۰/۱۴ و ۰/۲۱ درصد) در جیره بر شاخص‌های رشد و وضعیت سلامتی کپور علف خوار (*Ctenopharyngodon idellus*، با میانگین وزنی 1 ± 34 گرم) در مدت ۸ هفته مورد مطالعه قرار گرفته نتایج نشان داد که به طور معنی داری در مقایسه با شاهد باعث افزایش رشد شده است (۴۳). بررسی اثر مکمل رژیم غذایی گیاهان شوید (*Lepidium sativum*) و شاهی (*graveolens*) عصاره‌های گیاه با دوز ۱ و ۲ گرم بر کیلو گرم در چهار تیمار (۱ گرم بر کیلو گرم، ۲ گرم بر کیلو گرم رژیم غذایی شوید و ۱ گرم بر کیلو گرم، ۲ گرم بر کیلو گرم رژیم غذایی شاهی) بر شاخص‌های رشد ماهی کپور معمولی با میانگین وزنی $3/46 \pm 0/1$ گرم، مدت ۴۵ روز مورد مطالعه قرار گرفته نتایج پژوهش نشان داد که وزن نهایی و نرخ رشد ویژه در تیمار ۲ گرم بر کیلو گرم رژیم غذایی شاهی در مقایسه با شاهد و گروه‌های دیگر افزایش معنی داری داشتند و در مقایسه با شاهد ضریب تبدیل غذایی هیچ تغییری نداشتند. به جز تیمار ۱ گرم بر کیلو گرم رژیم غذایی شوید که ضریب تبدیل غذایی به طور معنی داری افزایش یافته است (۱۸). مطالعات پژوهش بائو و همکاران نشان داد که ۱۰ گرم بر کیلو گرم عصاره برگ جینکو بیلوبیا در رژیم غذایی ماهی کپور معمولی در مقایسه با شاهد باعث افزایش عملکرد رشد شده است (۱۶). بررسی اثر عصاره و پودر خشک ریشه (*Rehmannia glutinosa*) با تیمارهای شاهد (۰/۰)، ۲ و ۴ درصد عصاره خشک، ۲ و ۴ درصد پودر آماده، ۰/۵ و ۱ درصد عصاره خشک، ۰/۵ و ۱ درصد عصاره آماده بر عملکرد رشد، در کپور معمولی با میانگین وزنی $7/46 \pm 1/06$ گرم در مدت ۸۰ روز مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که

گرم بر کیلوگرم) بر عملکرد رشد و پاسخ‌های اینمی غیر اختصاصی ماهی کوبیا (*Rachycentron canadum*) با میانگین وزنی $54/0 \pm 10/7$ گرم در مدت ۶ هفته مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که گیاهان بر عملکرد رشد تاثیر قابل توجه^{۲۶} ای نداشته است (۳۸). بررسی اثر پودر پیاز با شش تیمار شاهد (۰/۰)، ۵/۰، ۳، ۲، ۱ و ۰/۰۵ درصد بر رشد، ترکیب بدن و فعالیت لیزوژیم در ماهی کفشک زیتونی (*Paralichthys olivaceus*) با میانگین وزنی ۱/۵ گرم در مدت ۸ هفته مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که مکمل رژیم غذایی پودر پیاز برای کاهش مرگ و میر در برابری عفونت‌های *E.tarda* موثر بوده و هیچ تاثیری بر عملکرد رشد نداشت (۲۰). در کل می‌توان از پژوهش حاضر نتیجه گرفت که سطوح مختلف عصاره بارهنگ کبیر (۱/۰/۰)٪ و ۱٪ در مقایسه با شاهد بر شاخص‌های رشد و کارایی غذایی ماهی کپور معمولی تاثیر قابل ملاحظه^{۲۶} ای نداشته، نتایج پژوهش نشان داد که سطوح مختلف عصاره بارهنگ کبیر در تمام شاخص‌های رشد (ضریب افزایش وزن، درصد افزایش وزن، ضریب چاقی، ضریب رشد ویژه، افزایش وزن روزانه و درصد افزایش وزن روزانه) و برخی شاخص‌های تغذیه^{۲۶} ای (ضریب تبدیل غذایی و ضریب بازده غذایی) در مقایسه با شاهد تفاوت معنی داری مشاهده نشد (P>۰/۰۵). نرخ بازنandگی در تمام تیمارها در مقایسه با شاهد تفاوت معنی داری نداشته و هیچ گونه تلفاتی در طول دوره نشان داده نشد. در نتیجه می‌توان گفت که سطوح مختلف عصاره بارهنگ بر عملکرد رشد و کارایی غذایی تاثیری قابل توجهی نداشت است. پیشنهاد می‌گردد که اثرات این عصاره گیاهی به روی شاخص‌های اینمی و آنتی اکسیدانی مورد مطالعه قرار گیرد.

به رشد گردید اما هیچ گونه اختلاف معنی داری بین تیمارهای آزمایشی در تمام شاخص‌های رشد شامل وزن اولیه، وزن نهایی، طول اولیه، طول نهایی، افزایش وزن بدن، ضریب رشد ویژه، افزایش وزن روزانه، درصد افزایش وزن بدن، فاکتور وضعیت، ضریب تبدیل غذایی مشاهده نشد ($p \geq 0/05$). بررسی تاثیر عصاره متانولی زیره سیاه (*Nigella sativa*) با دوزهای شاهد ۰/۱، ۰/۵ و ۰/۱ گرم بر کیلوگرم عصاره زیره سیاه در قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزنی $15/02 \pm 0/01$ گرم در مدت ۳۰ روز مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که عصاره زیره سیاه بر عملکرد رشد تاثیر نداشته است (۱۴). تعیین تأثیر عصاره صمغ ییمو با سطوح ۰/۰۱، ۰/۰۵ و ۱ گرم بر کیلوگرم صمغ ییمو بر عملکرد رشد، ماهی قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزنی $23/03 \pm 0/07$ گرم مدت ۷۵ روز مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که وزن نهایی، افزایش وزن و نرخ رشد ویژه در تیمارهای ۰/۵ و ۱ گرم بر کیلوگرم در مقایسه با شاهد به طور معنی داری افزایش را نشان داده و در مقدار نرخ تبدیل غذایی تفاوتی مشاهده نشد (۱۹). بررسی اثر رژیم غذایی عصاره برگ ژینکگو (*Ginkgo biloba*) با تیمارهای شاهد (۰/۰)، ۱/۵۰، ۱/۱۰۰، ۲/۱۰۰، ۴/۱۰۰ و ۱۰/۱۰۰ گرم بر کیلوگرم عصاره برگ ژینکگو بر عملکرد رشد، ماهیان *Epinephelus lanceolatus* × *Epinephelus fuscoguttatus* (♀) با تغذیه بالای لیپید، با میانگینی وزنی $121/76 \pm 3/21$ در مدت ۸ هفته مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که عصاره ژینکگو در شاخص‌های رشد تاثیر نداشته است (۳۵). بررسی اثر گیاهان دارویی بارهنگ آسیاتیکا (*Plantago asiatica*) (*Houttuynia cordata*) و نعناع (*Mentha haplocalyx*) با سطوح شاهد (۰/۰)، ۵/۲۵، ۵/۰ و ۱۰/۰ با سطوح

- ۱- آموز حقیقی، س. ر.، باقری، خ. و شرفی، ع. ۱۳۹۷. کشت بافت و بازارایی درون شیشه ای گیاه دارویی *Plantago major*. مجله زیست فناوری گیاهان دارویی، شماره ۱، ص ۴۲-۳۸.
- ۲- باعثی، ف.، آبرومند، ع.، ضیائی نژاد، س. و جواهری بابلی، م. ۱۳۹۵. تأثیر عصاره هیدرولالکلی گیاه پنج انگشت (*Vitex agnus-castus L.*) بر شاخص های رشد و نرخ بقاء در گوهره خرماهی (*Danio rerio*). انتشارات یافته های نوین در علوم زیستی، شماره ۴، ص ۲۶۹-۲۷۸.
- ۳- فرامرزی، ز.، موسوی، س. م.، ذاکری، م. و زنگوبی، ن. ۱۳۹۵. اثرات سطوح مختلف پودر و عصاره الکلی یونجه لاش و برخی فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خونی ماهی کپور معمولی (*Cyprinus carpio*). مجله منابع طبیعی ایران، شماره ۲، ص ۲۲۵-۲۵۱.
- ۴- کاویانی فرد، س.، حیدریه، ن.، جمالو، ف.، علی نژاد، گ.، علی نژاد، م. و عینی، ع. م. ۱۳۹۵. اثر عصاره هیدرولالکلی بارهنگ بر آستانه تشنج ناشی از پتیلین ترازوول در موش های سوری. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، شماره ۲، ص ۴۱-۴۵.
۱۳. Adel, M., Amiri, A. A., Zorriehzahra, J., Nematolahi, A., Esteban, M. Á. (2015). Effects of dietary peppermint(*Mentha piperita*) on growth performance, chemical body composition and hematological and immune parameters of fry Caspian white fish (*Rutilus frisii kutum*). Fish & Shellfish Immunology, 45(2); 841-847.
۱۴. Altunoglu, Y. C., Bilen, S., Ulu, F., Biswas, G. (2017). Immune responses to methanolic extract of black cumin (*Nigella sativa*) in rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*). Fish & shellfish immunology, 1(67); 103-109.
۱۵. Awad, E., Amani A. (2017). Role of medicinal plants on growth performance and immune status in fish. Fish & shellfish immunology, 67 ; 40-54.

منابع

- ۱- آموز حقیقی، س. ر.، باقری، خ. و شرفی، ع. ۱۳۹۷. کشت بافت و بازارایی درون شیشه ای گیاه دارویی *Plantago major*. مجله زیست فناوری گیاهان دارویی، شماره ۱، ص ۴۲-۳۸.
- ۲- باعثی، ف.، آبرومند، ع.، ضیائی نژاد، س. و جواهری بابلی، م. ۱۳۹۵. تأثیر لاکتوپاسیل های پروپیوتیکی تجاری بر پارامترهای رشد، بقاء و شاخص های تغذیه ای ماهی کپور معمولی (*Cyprinus carpio*). نشریه توسعه آبزی پروری، شماره ۴، ص ۳۹-۴۹.
- ۳- برینیا، س. و چله مال دز فول نژاد، م. ۱۳۹۶. اثر پودر دارچین (*Cinnamomum zelianicum*) در جیره غذایی بر شاخص های رشد، بقاء و ترکیبات شیمیایی عضله ماهی کپور معمولی. مجله تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده، شماره ۱، ص ۸۰-۹۱.
- ۴- بیگی چم جنگلی، ج. ا.، حاجی مرادلو، ع. م. و پاک نژاد، ح. ۱۳۹۷. تأثیر سطوح مختلف پوست پرتقال (*Citrus sinensis*) در جیره بر عملکرد رشد ماهی کپور معمولی (*Cyprinus carpio*). انتشارات بهره برداری و پرورش آبزیان، شماره ۴، ص ۲۱-۲۸.
- ۵- جمشیدی، آ.، حاجتی، م. و بخشی خانیکی، غ. ر. ۱۳۹۶. تأثیر عصاره های الکلی و آبی گونه هایی از جنس بارهنگ در سینه ۳-۲ و ۵ ماهگی روی میکرووارگانیسم های مختلف. انتشارات پیک نور، شماره ۴، ص ۱-۹.
- ۶- حسن پور، س.، سلاطی، ا. پ.، فلاحتکار، ب. و محمدی آذر، ح. ۱۳۹۶. اثرات تغذیه با سطوح مختلف عصاره چای سبز بر رشد، ترکیب لашه و دفاع آنتی اکسیدانی در تاسماهی هیبرید (*Huso huso × ♂ Acipenser ruthenus*) جوان. مجله علمی و پژوهشی زیست شناسی دریا، شماره ۳۵، ص ۲۳-۳۲.
- ۷- ستاری، م.، شاهسونی، د.، شفیعی، ش. ۱۳۸۲. ماهی شناسی ۲ سیستماتیک. انتشارات حق شناس ۵۰۲ ص.
- ۸- صفاری، ص.، علیشاھی، م. ۱۳۹۳. تأثیر عصاره الکلی بره موم بر برخی فکتورهای ایمنی و خونی ماهی کپور معمولی.

- 16.**Bao, L., Chen, Y., Li, H., Zhang, J., Wu, P., Ye, K., Ai, h. (2019). Dietary *Ginkgo biloba* leaf extract alters immune-related gene expression and disease resistance to *Aeromonas hydrophila* in common carp *Cyprinus carpio*. Fish & Shellfish Immunology, 94 (1); 810-818.
- 17.**Behbahani, B. A., Yazdi, F. T., Shahidi, F., Hesarinejad, M. A., Mortazavi, S. A., Mohebbi, M. (2017). *Plantago major* seed mucilage: Optimization of extraction and some physicochemical and rheological aspects. Carbohydrate Polymers, 155 (2); 68-77.
- 18.**Bilen, S., Özkan, O., Alagöz, K., Özdemir, K. Y. (2018). Effect of dill (*Anethum graveolens*) and garden cress (*Lepidium sativum*) dietary supplementation on growth performance, digestive enzyme activities and immune responses of juvenile common carp (*Cyprinus carpio*). Aquaculture, 495 (1); 611-616.
- 19.**Bilen, S., Altief, T. A. S., Özdemir, K. Y., Salem, M. O. A., Terzi, E., Güney, K. (2020). Effect of lemon balm (*Melissa officinalis*) extract on growth performance, digestive and antioxidant enzyme activities, and immune responses in rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*). Fish Physiology and Biochemistry, 46(1); 471-481.
- 20.**Cho, S. H., Lee, S. M. (2012). Onion powder in the diet of the olive flounder, *Paralichthys olivaceus*: effects on the growth, body composition, and lysozyme activity. Journal of the World Aquaculture Society, 43(1); 30-38.
- 21.**Elbesthi, R. T. A., Özdemir, K. Y., Taştan, Y., Bilen, S., Sönmez, A. Y. (2020). Effects of ribwort plantain (*Plantago lanceolata*) extract on blood parameters, immune response, antioxidant enzyme activities, and growth performance in rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*). Fish Physiology and Biochemistry, 6;1-13.
- 22.**Genc, Y., Dereli, F. T. G., Saracoglu, I., Akkol, E. K. (2020). The inhibitory effects of isolated constituents from *Plantago major* subsp. major L. on collagenase, elastase and hyaluronidase enzymes: Potential wound healer. Saudi Pharmaceutical Journal, 28(1); 101-106.
- 23.**Giri, S. S., Sukumaran, V., Park, S. C. (2019). Effects of bioactive substance from turmeric on growth, skin mucosal immunity and antioxidant factors in common carp, *Cyprinus carpio*. Fish & shellfish immunology, 92(1); 612-620.
- 24.**Hosseini, S. M., Hoseinifar, S. H., Mazandarani, M., Paknejad, H., Van Doan, H., El-Haroun, E. (2020). The potential benefits of orange peels derived pectin on serum and skin mucus immune parameters, antioxidant defence and growth performance in common carp (*Cyprinus carpio*). Fish & Shellfish Immunology, 1-17. doi: <https://doi.org/10.1016/j.fsi.2020.04.019>.
- 25.**Jahazi, M. A., Hoseinifar, S. H., Jafari, V., Hajimoradloo, A., Van Doan, H., Paolucci, M. (2020). Dietary supplementation of polyphenols positively affects the innate immune response, oxidative status, and growth performance of common carp, *Cyprinus carpio* L. Aquaculture, 25;517. 734709.
- 26.**Saffidine, K., Sahli, F., Zerroug, M. M. (2015). Antioxidant and antimicrobial activities of *Plantago major*. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 7(5); 58-64.
- 27.**Kobeasy, I., Abdel-Fatah, M., Abd El-Salam, S. M., Mohamed, Z. E. O. M. (2011). Biochemical studies on *Plantago major* L. and *Cyamopsis tetragonoloba* L. International Journal of Biodiversity and Conservation, 31 (3); 83-91.
- 28.**Mohammadi, G., Rashidian, G., Hoseinifar, S. H., Naserabad, S. S., Van Doan, H. (2020). Ginger (*Zingiber officinale*) extract affects growth performance, body composition, haematology, serum and mucosal immune parameters in common carp (*Cyprinus carpio*). Fish & Shellfish Immunology, 99(1); 267-273.
- 29.**Nhu, T. Q., Hang, B. T. B., Hue, B. T. B., Quetin-Leclercq, J., Scippo, M. L., Phuong, N. T. (2019). Plant extract-based diets differently modulate immune responses and resistance to bacterial infection in striped catfish (*Pangasianodon hypophthalmus*). Fish & shellfish immunology, 92(1); 913-924.
- 30.**Paray, B. A., Hoseini, S. M., Hoseinifar, S. H., Van Doan, H. (2020). Effects of dietary oak (*Quercus castaneifolia*) leaf extract on growth, antioxidant, and immune characteristics and responses to crowding stress in common carp (*Cyprinus carpio*). Aquaculture, 27;735276.
- 31.**Pauly, D., ; Zeller, D. (2017). Comments on FAOs state of world fisheries and aquaculture (SOFIA 2016). Marine Policy, 77; 176-181.
- 32.**Saikia, S. K., Das, D. N. (2009). Feeding ecology of common carp (*Cyprinus carpio* L.) in a rice-fish culture system of the *Apatani plateau* (Arunachal Pradesh, India). Aquatic Ecology, 43(2); 559-568.

- 33.**Srichaiyo, N., Tongsiri, S., Hoseinifar, S. H., Dawood, M. A., Esteban, M. Á., Ringø, E. (2020). The effect of fishwort (*Houttuynia cordata*) on skin mucosal, serum immunities, and growth performance of Nile tilapia. *Fish & Shellfish Immunology*, 98(1); 193-200.
- 34.**Talpur, A. D. (2014). *Mentha piperita* (Peppermint) as feed additive enhanced growth performance, survival, immune response and disease resistance of Asian seabass, *Lates calcarifer* (Bloch) against *Vibrio harveyi* infection. *Aquaculture*, 420(15); 71-78.
- 35.**Tan, X., Sun, Z., Liu, Q., Ye, H., Zou, C., Ye, C. (2018). Effects of dietary *Ginkgo biloba* leaf extract on growth performance, plasma biochemical parameters, fish composition, immune responses, liver histology, and immune and apoptosis-related genes expression of hybrid grouper (*Epinephelus lanceolatus*♂×*Epinephelus fuscoguttatus*♀) fed high lipid diets. *Fish & shellfish immunology*, 72; 399-409.
- 36.**Tangestani, R., Alizadeh Doughikollaee, E., Ebrahimi, E., Zare, P. (2011). Effects of garlic of Essential oilasan immuno stimulant on hematological indices of juvenile beluga (*Huso huso*). *Journal Vetrenery Research*. 66(3);209-212.
- 37.**Van Doan, H., Hoseinifar, S. H., Chitmanat, C., Jaturasitha, S., Paolucci, M., Ashouri, G., Dawood, M.D.O. (2019). The effects of *Thai ginseng*, *Boesenbergia rotunda* powder on mucosal and serum immunity, disease resistance, and growth performance of Nile tilapia (*Oreochromis niloticus*) fingerlings. *Aquaculture*, 513(15); 734388 .
- 38.**Wu, Y. S., Chen, Y. Y., Ueng, P. S., Nan, F. H. (2016). Effects of medicinal herbs *Plantago asiatica*, *Houttuynia cordata* and *Mentha haplocalyx* on non-specific immune responses of cobia (*Rachycentron canadum*). *Fish & shellfish immunology*, 58(1); 406-414.
- 39.**Wang, J. L., Meng, X. L., Lu, R. H., Wu, C., Luo, Y. T., Yan, X.(2015). Effects of *Rehmannia glutinosa* on growth performance, immunological parameters and disease resistance to *Aeromonas hydrophila* in common carp (*Cyprinus carpio* L.). *Aquaculture*, 435(1); 293-300.
- 40.**Yanbo, W., Zirong, X. (2006). Effect of probiotics for common carp (*Cyprinus carpio*) based on growth performance and digestive enzyme activities. *Animal feed science and technology*, 127(3-4); 283-292.
- 41.**Yousefi, M., Hoseini, S. M., Vatnikov, Y. A., Kulikov, E. V., Drukovsky, S. G. (2019). Rosemary leaf powder improved growth performance, immune and antioxidant parameters, and crowding stress responses in common carp (*Cyprinus carpio*) fingerlings. *Aquaculture*,;505(30); 473-480.
- 42.**Zubair, M., Widén, C., Renvert, S., Rumpunen, K. (2019). Water and ethanol extracts of *Plantago major* leaves show anti-inflammatory activity on oral epithelial cells. *Journal of traditional and complementary medicine*, 9(3);169-171.
- 43.**Zhu, Y., Hu, P., Yao, J., Xu, D., Xu, Y., Tan, Q. (2019). Optimal dietary alcoholic extract of lotus leaf improved growth performance and health status of grass carp (*Ctenopharyngodon idellus*). *Fish & shellfish immunology*, 93(1); 1-7.

Effects of Different Levels of Plantain Major (*Plantago major L.*) Extraction of Diet On Growth of Common carp (*Cyprinus carpio*).

A.B. Wahidi¹, H.Paknejad², M. Sudagar², A. Shabani², A. Jafar³

1.MSc Student, Fisheries Department, Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources.Golestan.Iran. **bashir512wahidi@yahoo.com**

2.Associate Professor, Fisheries Department, Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. Golestan.Iran.

3.Doctor(Ph.D), Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. Golestan.Iran.

Received:2020.26. 10

Accepted: 2020.20.12

Abstract

Introduction & Objective: Major plantain is one of the medicinal plants that is used for treat diseases in traditional medicine. The aim of this study was to investigate the effect of different levels of plantain major (*Plantago major L*) extraction on several growth indices and nutritional efficacy in Common carp (*Cyprinus carpio*).

Materials and Methods: For this purpose, 204 common carps with an average weight (18.69 ± 2.09 g) in 4 treatments and each treatment with 3 replicas including: control (without Extract of plantain major Extract), 0.1, 0.5 and 1% of the extraction distributed in kilograms of food, feeding the fish twice a day, with 3% of body weight and the experimental period was 8 weeks. At the end of the experiment period.

Results: The results showed growth indices (weight gain, weight gain percentage, specific growth coefficient, daily weight and percentage of daily weight gain) and some nutrition indices (feed conversion coefficient and feed efficiency coefficient) with no significant difference with the control group ($P> 0.05$). The highest and lowest weight gain, weight gain percentage and condition factor were observed in the 0.1% extraction diet and control group, respectively. The highest and lowest specific growth coefficients were observed in 0.1% and 0.5% extraction diet and control groups, respectively. The lowest feed conversion coefficient was observed in 1% extraction diet and the lowest feed efficiency coefficient was observed in the control group.

Conclusion: According to the results, different levels of extraction had no significant effect on growth performance and nutritional efficiency.

Key word: Extraction Plantain major(*Plantago major L*), Growth, Common Carp (*Cyprinus carpio*).