

## مقاله کوتاه

### اولین گزارش گونه *Caudacheles khayae* (Acari : Cheyletidae) از ایران

رضا حقیقی<sup>\*</sup>، هادی استوان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه حشره شناسی، فارس، ایران

شهرام حسامی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، گروه گیاه‌پزشکی، شیراز، ایران

#### چکیده

در تحقیقاتی که در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ به منظور مطالعه فون کنه‌های مرتبط با سوسک‌های پوست خوار نارون زیرخانواده Scolytinae در فضای سبز دانشگاه آزاد مرکز علوم و تحقیقات فارس صورت گرفت، گونه *Caudacheles khayae* متعلق به خانواده Cheyletidae (Acari: Trombidiformes) جمع آوری و شناسایی شد. این گونه برای اولین بار از ایران گزارش می‌شود. این کنه از دالان سوسک‌های پوست خوار نارون جمع آوری گردید.

واژه‌های کلیدی: کنه‌ها، سوسک‌های پوست خوار نارون، ایران، *Caudacheles khayae*

#### مقدمه

کنه‌های خانواده Cheyletidae متعلق به راسته Trombidiformes، زیر راسته Prostigmata و در برگیرنده ۷۴ جنس و بیش از ۳۷۰ گونه توصیف شده هستند. کنه‌های این خانواده در زیستگاه‌های متفاوتی یافت شده اند و جزء کنه‌هایی هستند که با حشرات مرتبط با گیاهان ارتباط دارند و این ارتباط بصورت فورتیک، پارازیت یا شکارگر آفات گیاهان است (Krantz & Walter, 2009). کنه‌های این خانواده، دارای یک گناتوزوومای بزرگ و برجسته با یک زائد شست-ناخن قوی می‌باشند. این شکارگرها کنه‌هایی با زندگی آزاد، با حرکت آهسته و به رنگ زرد یا نارنجی دیده می‌شوند (Shishehbor, 2006).

\* مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: haghhighirk@yahoo.com

تاریخ دریافت: ۹۱/۸/۱۵، تاریخ پذیرش: ۹۲/۲/۲۴

گونه (Gerson 1968) برای اولین بار در دنیا از گیاه *Khaya* *Caudacheles khayae* Gerson (1968) گزارش گردید. در ایران اولین بار (Ahadiyat et al. 2004) این جنس را با گونه *C.lieni* گزارش کردند. اولین تحقیقات تخصصی در ایران روی کنه های مرتبط با سوسک های پوست خوار توسط (Ostovan & Kamali 1997) صورت گرفت که در این تحقیق ۱۸ گونه کنه مرتبط با سوسک های پوست خوار نارون از پارک های مختلف تهران جمع آوری و شناسایی شدند که ۱۳ گونه از آنها برای ایران گزارش جدید بودند.

سوسک پوستخوار *Scolytus multistriatus* علاوه بر خسارت مستقیمی که از طریق ایجاد دالان هایی در زیر پوست درخت می کند، یکی از ناقلین قارچ *Ophiostoma novo-ulmi* عامل بیماری مرگ نارون (DED) است (Moser et al., 2005). به دلیل کارآیی نداشتن روش شیمیایی و بالا بودن هزینه های کنترل به روش مکانیکی جهت کنترل سوسک های پوست خوار، شناسایی دشمنان طبیعی این آفات از اهمیت بالایی برخوردار است.

## مواد و روش ها

برای جمع آوری کنه های مرتبط با اسکولیت نارون، از اوایل شهریور تا پایان آبان ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ از نارون های آلوده به اسکولیت در فضای سبز واحد علوم و تحقیقات فارس نمونه برداری انجام گرفت. برای جمع آوری کنه ها، پوست قسمت هایی از تنه درختان که به اسکولیت های نارون آلودگی داشتند، جدا کرده و پس از ذکر مشخصات در داخل کیسه های پلاستیکی برای انتقال به آزمایشگاه قرار داده شدند. جداسازی کنه ها و لاروها و حشرات کامل اسکولیت به وسیله قیف برلیز انجام شد و پس از استخراج کنه ها وشفاف سازی در محلول لاکتوفنل به روش حرارت دهی، با استفاده از مایع هویر از آنها اسلاید میکروسکوپی تهیه شد. شناسایی کنه ها با استفاده از منابع موجود انجام و با استفاده از استریو میکروسکوپ از نمونه های شناسایی شده عکس تهیه گردید.

## نتایج

در این تحقیق که به منظور فون کنه های مرتبط با اسکولیت نارون در فضای سبز واحد علوم و تحقیقات فارس صورت گرفت گونه *Caudacheles khayae* (Cheyletidae) از زیر راسته Prostigmata جمع آوری و شناسایی شد. این اولین گزارش از وجود این گونه، برای فون کنه های ایران است.

جنس *Caudacheles* اولین بار توسط (Gerson 1968) توصیف شده است. پنجه پالپ با یک موی شانه وش و دو موی داس مانند (شکل های ۱ و ۲)، ناخن پالپی بدون دندانه (شکل ۲)، در قسمت پروپودوزوما چشم وجود ندارد، سطح پشتی دارای دو صفحه پروپودوزومایی و

هیستروزومایی بوده (شکل ۳)، پاهای دارای ناخن و بالشک بوده (شکل ۴)، موهای سطح پشتی بادبزنی و مهم ترین صفت این جنس وجود Caudal lobe در انتهای بدن و قرار گرفتن مخرج بر روی آن که احتمالاً علت نامگذاری نام جنس بوده است (شکل ۵). وجود ۵۰ جفت مو در سطح پشتی بدن از مشخصه گونه این کنه است (شکل ۶). در این تحقیق جنس نر این گونه نیز جمع آوری و شناسایی شده است که در آینده مقاله توصیف آن نوشته می شود (شکل های ۷ و ۸).



شکل ۲ - پنجه پالپ با یک موی شانه وش و ناخن پالپ بدون دندانه

**Figure 2.** Palpal tarsus with one comb-like seta and palpal claw edenate.



شکل ۱ - پنجه پالپ با دو موی داس مانند

**Figure 1.** Palpal tarsus with two sickle-like setae.



شکل ۴ - پاهای دارای ناخن و بالشک

**Figure 4.** Legs have a claw and empodia



شکل ۳ - سطح پشتی با دو صفحه پروپودوزومایی و هیستروزومایی

**Figure 3.** Dorsum with propodosomal and hysterosomal shields.



شکل ۶ - کنه ماده، *Caudacheles khayae*, Female  
Figure 6. *Caudacheles khayae*, Female



شکل ۵ - مخرج بر روی caudal lobe در کنه ماده  
Figure 5. Anus on caudal lobe in female



شکل ۸ - ادیاگوس کنه نر  
Figure 8. Aedeagus of male



شکل ۷ - کنه نر، *Caudacheles khayae*  
Figure 7. *Caudacheles khayae*, male

## سپاسگزاری

بدینوسیله از آقای دکتر Andre V. Bochkov در انسستیتو جانورشناسی آکادمی علوم روسیه به خاطر تأیید گونه و آقای مهندس بیضاوی به خاطر همکاری صمیمانه شان سپاسگزاری می‌گردد.

## منابع

Ahadiyat, A., Ostovan, H. & Saboori, A. 2004. Mites associated with *Scolytus amygdale* Guerin-Meneville, 1847 in Karaj region. *Proceedings of the 16<sup>th</sup> Iranian Plant Protection Congress*, Vol. 1, Pests, p. 251.

Gerson, U. 1968. *Caudacheles*, a new genus in the family Cheyletidae (Acarina: Prostigmata). *Acarologica*, 10(4): 645-649.

- Krantz, G.W & Walter, D. E. 2009. *A Manual of Acarology*. 3rd ed. Texas Tech University Press, USA.
- Moser, J. C., Konard, H., Kirisits, T. & Carta, L. K. 2005. Phoretic mites and nematode associates of *Scolytus multistriatus* and *Scolytus pygmaeus* (Col: Scolytidae) in Austria. *Agricultural and Forest Entomology*, 7, 169-177.
- Ostovan, H. & Kamali, K. 1997. Biodiversity of mites (Acari) associated with elm bark beetle *Scolytus multistriatus* (Marsh.) (Coleoptera: Scolytidae) in parks of Tehran. *Journal of Agricultural Sciences*, 3(11&12): 23-67.
- Shishehbor, P. 2006. *Mites (Acari) for Pest Control* (translation). Shahid Chamran University Press, Ahvaz, Iran.