

مقاله کوتاه

زنبور (Parasitoid) *Eurytoma iranicola* (Hym.: Eurytomidae) تجمعی- خارجی سوسک شاخص بلند رزاسه (*Osphranteria coerulescens* Col.: Cerambycidae) در ایران

عباس محمدی خرم آبادی*

بخش تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

حسین لطفعلی زاده

بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، تبریز، ایران

چکیده

در این مطالعه زنبور (*Eurytoma iranicola* (Hymenoptera: Eurytomidae)) به عنوان یک پاراسیتoid لاروی تجمعی- خارجی روی مراحل لاروی سوسک شاخص بلند رزاسه (*Osphranteria coerulescens* (Coleoptera: Cerambycidae)) شناخته شد که این پدیده برای نخستین بار از این خانواده گزارش می‌شود.

واژه‌های کلیدی: *Osphranteria coerulescens*, پاراسیتoid لاروی, *Eurytoma iranicola*

طی نمونه‌برداری از آفت سوسک شاخص بلند رزاسه (*Osphranteria coerulescens* (Coleoptera: Cerambycidae)) شیرکوه یزد، نمونه‌ای از یک لارو آفت در داخل شاخه درخت بادام (*Prunus amygdalus*) مشاهده گردید که تعداد ۱۸ عدد لارو کوچک زنبور پاراسیتoid در کنار آن در حال تغذیه بودند. این لاروها به آزمایشگاه منتقل و در دمای اتاق نگهداری شدند. سه عدد از لاروها به عنوان نمونه مرحله نابالغ در شیشه الکلی نگهداری شدند. شروع تبدیل لاروها به شفیره از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۷ مشاهده گردید. از این شفیره‌ها تعداد ۹ عدد زنبور نر و شش عدد ماده از

* مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: Mohamadk@Shirazu.ac.ir

تاریخ ۱۳۸۸/۱/۲۴ تا ۱۳۸۸/۲/۱ ظاهر گردیدند. این زنبورها توسط نگارنده دوم تحت نام گرفتند. این زنبور اولین بار توسط مهرنژاد در سال ۲۰۰۴ از منطقه سیرجان کرمان از روی همین آفت جمع آوری و توسط Zerova توصیف گردید (Zerova *et al.*, 2004, Zerova, 2007). سپس از استان چهارمحال و بختیاری گزارش شد (Lotfalizadeh & Khalghani, 2007). همچنین تعدادی نمونه که از استان خراسان رضوی ارسال شده بود توسط نگارنده دوم مورد شناسایی قرار گرفته است. از اینرو به نظر می‌رسد که این گونه در کلیه مناطقی که آفت E. rubusta group تعلق دارد که بجز گونه گیاهخوار *E. ermolenkoi*, سایر گونه‌های این گروه به عنوان پارازیتویید لاروی و خارجی بال غشاییان، سخت بال پوشان، بال پولکداران و دوبالان شناخته می‌شوند (Zerova & Seryogina, 2006). شکل یک لارو و حشره بالغ نر و ماده این زنبور را نشان می‌دهد. در این بررسی، درصد پارازیتیسم گونه *E. iranicola* کمتر از یک درصد (۰/۹) تعیین گردید. دشمن طبیعی دیگر این آفت *Xorides corycensis* Kriechbaumer, 1894 (Hymenoptera: Ichneumonidae) گردیده است، قادر است با تولید یک تا دو نسل حدود ۱۵-۱۸٪ جمعیت آفت را پارازیته نماید (Sharifi & Javadi, 1971). علاوه بر این گونه‌ای از زنبورهای خانواده Leucospidae تحت نام *Leucospis dorsigera* Fabricius, 1775 به عنوان پارازیتویید ثانویه فعالیت آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد (Hesami *et al.*, 2005). لذا در مجموع درصد پارازیتیسم طبیعی این آفت در حد پایینی می‌باشد.

زنبور *E. iranicola* در این مطالعه به عنوان یک پارازیتویید لاروی و تجمعی-خارجی شناخته شد که وجود پدیده پارازیتیسم تجمعی در زنبورهای خانواده Eurytomidae غیر معمول است. زنبورهای خانواده Eurytomidae دارای طیف گسترده‌ای از میزانهای گیاهی و جانوری هستند ولی عموماً به صورت انفرادی روی میزانهای خود فعالیت می‌کنند (*Eurytoma iranica* Narendran & Lotfalizadeh *et al.*, 2007). به طور مشابه، گونه *Eulecanium rugulosum* (Arch.) Hemiptera: Coccidae به صورت تجمعی زندگی می‌کند ولی به طور کامل مشخص نشده است که آیا یک پارازیتوئید خارجی-تجمعی است و یا این که از تخم‌های میزان تغذیه می‌کند (Narendran & Lotfalizadeh, 1999). یافته‌های این گزارش در زیست شناسی تکاملی زنبورهای خانواده Eurytomidae و همچنین تحقیقات کنترل بیولوژیک علیه آفت مذکور می‌تواند حائز اهمیت باشد. چهار عدد از حشرات کامل این زنبور در کلکسیون مرکز تحقیقات

کشاورزی و منابع طبیعی تبریز و بقیه در کلکسیون حشره شناسی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، دانشگاه شیراز نگهداری می شوند.



شکل ۱- زنبور پارازیتoid *Eurytoma iranicola*: A- لارو؛ B- حشره بالغ ماده؛ C- سر از نمای رو به رو؛ D- سر از نمای جانبی؛ E- شاخک حشره نر؛ F- شاخک حشره ماده؛ G- قفسه سینه و H- شکم حشره ماده.

Figuer 1. *Eurytoma iranicola*: A- Larve, B- Lateral habitus of female, C-D- Female head, anterior & Lateral, E-F-Antenna, Male & Female, G-H- Lateral mesosoma & metasoma of femal.

منابع

- Hesami, S., Akrami, M. A. & Baur, H. 2005. *Leucospis dorsigera* Fabricius (Hymenoptera, Leucospidae) as a hyperparasitoid of Cerambycidae (Coleoptera) through Xoridinae (Hymenoptera: Ichneumonidae) in Iran. *Journal of Hymenoptera Research*, 14: 66-68.
- Lotfalizadeh, H., Delvare, G. & Rasplus, J. Y. 2007. Phylogenetic analysis of Eurytominae (Chalcidoidea:Eurytomidae) based on morphological characters. *Zoological Journal of the Linnean Society*, 151: 441-510.
- Lotfalizadeh, H. & Khalghani, J. 2008. Hymenopterous parasitoids (Hym.: Chalcidoidea) of xylophagous beetles in Iran. *Entomofauna*, 29: 249-264.
- Narendran, T. & Lotfalizadeh, H. 1999. A new species of *Eurytoma* Illiger (Hymenoptera: Eurytomidae) parasitic on *Eulecanium rugulosum* Arch. (Homoptera: Coccidae) from Iran. *Iran Agricultural Research*, 18: 197-204.
- Sharifi, S. & Javadi, I. 1971. Biology of *Xorides corcyrensis* Kriech. (Hymenoptera: Ichneumonidae), a Parasite of the Rosaceae Branch Borer *Osphranteria coerulescens* Redt. (Coleoptera: Cerambycidae). *Zeitschrift für Angewandte Entomologie*, 68: 25-31.
- Zerova, M., Mehrnejad, M., Gharaei, B. & Seryogina, L. Y. 2004. Two new species of the genus *Eurytoma* (Hymenoptera, Eurytomidae) from Iran. *Vestnik Zoologii*, 38: 81-84.
- Zerova, M. & Seryogina, L. Y. 2006. A review of the Palaearctic species of the genus *Eurytoma*, belonging to the *E. robusta* species-group (Hymenoptera, Eurytomidae), with description of two new species. *Entomological Review*, 86: 695-705.
- Zerova, M. D. 2007. A new replacement in the genus *Eurytoma* (Hymenoptera: Eurytomidae). *Vestnik zoologii*, 41: 80.