

بررسی فونستیک کنه‌های (Acari) خاکزی راسته Mesostigmata در مزارع ذرت و کلزای منطقه گچساران

حسین مرادیان^{*}، هادی استوان^آ، مصطفی حقانی^آ

۱- کارشناسی ارشد حشره شناسی، گروه حشره‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات فارس

۲- استاد، گروه حشره‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات فارس

۳- استادیار، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج

چکیده

در یک بررسی فونستیک که طی سال‌های ۱۳۸۹-۱۳۸۸ روی فون کنه‌های خاکزی راسته Mesostigmata در مزارع ذرت و کلزای منطقه گچساران صورت گرفت، در مجموع ۲۰ گونه متعلق به ۱۴ جنس و ۸ خانواده جمع‌آوری و شناسایی شد. از این تعداد ۳ گونه و ۱ جنس برای فون کنه‌های ایران گزارش جدید بود که به ترتیب با علامت * و ** مشخص گردیده‌اند. در این بررسی تمام گونه‌ها برای فون کنه‌های استان کهگیلویه و بویراحمد گزارش جدید است. در زیر گونه‌های جمع‌آوری شده به ترتیب خانواده‌ها عبارتند از:

Ascidae

Antennoseius bacatus Athias – Henriot, 1961

Antennoseius masoviae Sellnick, 1943

Arctoseius cetratus (Sellnick, 1940)

*Arctoseius venustulus** (Berlese, 1917)

Asca aphidioides (Linnaeus, 1758)

Lasioseius lawrencei (Evans, 1957)

Digamasellidae

Dendrolaelaps sp.

Eviphididae

*Iphidosoma multiclavatum*** Willmann, 1956

Laelapidae

Hypoaspis (Geolaelaps) aculeifer (Canestrini, 1883)

Hypoaspis (Geolaelaps) nolli Karg 1962

Hypoaspis (Pneumolaelaps) sclerotarsa Costa, 1967

Hypoaspis (Pneumolaelaps) karawaiewi (Berlese, 1903)

Hypoaspis (Cosmolaelaps) vacua (Michael, 1891)

Parasitidae

Gamasodes spiniger (Tragardh, 1910)

Parasitus fimetorum (Berlese, 1904)

Vulgarogamasus oudemansi (Berlese, 1903)

Phytoseiidae

Neoseiulus barkeri (Hughes, 1948)

Rhodacaridae

Rhodacarellus silesiacus Willmann, 1935

Sessiluncus hungaricus * Karg, 1964

Veigaiidae

Veigaia nemorensis (Koch, 1839)

واژه‌های کلیدی: فون، کنه، Mesostigmata، ذرت، کلزا، گچساران، ایران

*نویسنده رابط، پست الکترونیکی: moradian_2009@yahoo.com

تاریخ دریافت مقاله (۸۹/۸/۱) – تاریخ پذیرش مقاله (۸۹/۱۱/۲۱)



مقدمه

ذرت (Zea mayse Linnaeus (Poaceae) گیاه بومی آمریکای مرکزی و یکی از غلات مهم جهان و از نظر مقدار تولید در سطح جهانی مقام دوم بعد از گندم را دارد. کلزا (Brassica napus Linnaeus (Brassicaceae) گیاه بومی آمریکای جنوبی که به عنوان یکی از گیاهان دانه روغنی مهم در مناطق معتدل دارای طیف نسبتاً وسیعی از سازگاری اقلیمی است (Emam, 2004).

کشاورزی بعد از دامپروری به عنوان مهمترین منبع در آمد در منطقه گچساران از اهمیت بالایی برخوردار است. خاک این منطقه عموماً دارای $\text{PH}=7/5$ و بافت سیلتی لومی می‌باشد. راسته Mesostigmata گروه بزرگی از کنه‌های Parasitiformes است که به طور وسیعی دارای تنوع در شیوه‌های زندگی و زیستگاه‌های گوناگون هستند. بیشتر گونه‌ها شکارچیانی با زندگی آزاد هستند، در صورتی که دسته دیگری از آن‌ها مرتبط با پستانداران، پرندگان، خزندگان و یا بندهای می‌باشند. تعداد کمی از آن‌ها از قارچ، گرده و شهد تغذیه می‌کنند. کنه‌های این راسته ممکن است در خاک، زباله، چوب پوسیده، کود گیاهی، کود جانوری، لاشه، آشیانه‌ها، خانه‌های کاه گلی، قارچ‌ها، حیوانات و در آشیانه‌های هوایی روی گیاهان زندگی و یافته شوند (Krantz & Walter, 2009).

نعمتی (۱۳۷۸) کلید شناسایی برای برخی از کنه‌های خانواده Laelapidae ارایه کرد. گونه *Neoseiulus barkeri* Hughes برای اولین بار از ایران گزارش شد (Rahmani et al., 2009). در بررسی دیگری روی کنه‌های خانواده Hypoaspis (Pneumolaelaps) dentipilosa Karg در شهرکرد گونه Laelapidae Karg (Babaeian et al., 2010) برای اولین بار از شهرکرد گزارش شد (Hypoaspis (Cosmolaelaps) vacua Michael 1971) در کتابی فون کنه‌های راسته Mesostigmata خاکزی در منطقه اروپا را به همراه کلید شناسایی ارایه کرد که از غنی‌ترین کلیدهای شناسایی این گروه از کنه‌ها به حساب می‌آید. (1981) (1981), Kandill, Salmane & Komlovszky (1987) در کتابی فون کنه‌های خانواده Eviphididae ارایه شد (Evans & Bregetova 1977) بررسی‌هایی مرتبط با فون کنه‌های راسته Mesostigmata انجام داده‌اند. (2006) Kortschan سیستماتیک کنه‌های خانواده Dendrolaelaspidae را بررسی و کلید شناسایی برای جنس‌های این خانواده ارایه نموده‌اند. در بررسی دیگری کلید شناسایی برای گونه‌های جنس Dendrolaelaspis Karg & Schorlemmer (2009). با توجه به جایگاه و اهمیت کنه‌های شکارگر در کنترل بیولوژیک و اهمیت مبارزه با آفات، این تحقیق به منظور شناسایی کنه‌های شکارگر که در آینده بتوان از آن‌ها در غالب برنامه‌های مدیریت تلفیقی مبارزه با آفات در مزارع ذرت و کلزا استفاده کرد، انجام گرفت.

مواد و روش‌ها

بررسی‌هایی طی سال‌های ۱۳۸۹-۱۳۸۸ به منظور جمع‌آوری و شناسایی فون کنه‌های خاکزی راسته Mesostigmata در مزارع ذرت و کلزا منطقه گچساران به عمل آمد. پس از جمع‌آوری نمونه‌های خاک، کنه‌های موجود در این نمونه‌ها با استفاده از قیف برلیز¹ جداسازی و در محلول AG (الکل ۷۵٪ و ۵٪ گلیسرین) نگهداری شدند. کنه‌ها با استفاده از محلول لاکتوفنل² شفاف و از نمونه‌های شفاف شده با استفاده از محلول هویر¹، اسلایدهای میکروسکوپی تهیه گردید. سپس اسلایدها به مدت ۱۰ روز در حرارت ثابت ۴۵ درجه سانتی‌گراد در آون قرار داده شدند.

1- Berlese funnels

1- Lactophenol solution

تا کاملاً خشک شوند. برای جلوگیری از جذب رطوبت محیط و کربستاله شده هویر، اطراف هویر با رنگ روغنی مخصوص گردید. اسلامیدهای تهیه شده با استفاده از منابع موجود (منابع موجود در گروه حشره‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس) تشخیص داده شدند و در مواردی که نیاز به تایید توسط متخصصین خارج کشور داشت، جهت شناسایی ارسال شدند. در این تحقیق اسلامیدها نزد دکتر فرید فرجی^۲ به دانشگاه Amsterdam در کشور هلند، دکتر Gwiazdowicz^۳ به دانشگاه Poznan و دکتر Kaczmarek^۴ به دانشگاه Bydgoszcz در کشور لهستان و دکتر Krantz^۵ به دانشگاه Corvallis در کشور آمریکا ارسال گردید.

نتایج

در تحقیقاتی که به منظور بررسی فونستیک کنه‌های خاکزی راسته Mesostigmata در مزارع ذرت و کلزای منطقه گچساران انجام گرفت، ۲۰ گونه از ۱۴ جنس و ۸ خانواده شناسایی گردید (جدول ۱). ویژگی‌های مهم جنس و گونه‌های جدید برای فون کنه‌های ایران (شماره‌های ۱ تا ۳) و همچنین تعدادی از گونه‌های جدید برای فون کنه‌های استان کهگیلویه و بویراحمد (شماره‌های ۴ تا ۱۱)، به شرح زیر است:

-۱ *Arctoseius venustulus* Berlese, 1917 (Ascidae) (شکل ۱-الف) موهای واقع روی صفحه پشتی خیلی کوتاه، به طوری که طول موهای j4 و J1 ۱۰ میکرومتر و طول موی Z5 ۱۳ میکرومتر است. طول صفحه مخرجي کمی از عرض آن بیشتر می‌باشد، در پاهای اول ناخن‌ها نازک و محکم به پیش پنجه متصل شده، ناخن و پیش پنجه پاهای دوم تا چهارم از لحاظ طول دو برابر ناخن و پیش پنجه پاهای اول و طول پنجه پای اول ۸۰ تا ۹۰ میکرومتر است. تکثوم در این گونه سه شاخه و در ماده‌ها انگشت ثابت کلیسر با سه دندانه و طول ایدیوزوما ۴۴۵ تا ۳۶۵ میکرومتر است. در نرها لوله اسپرم انگشت مانند و طول ایدیوزوما ۳۷۵ تا ۳۲۵ میکرومتر است. این گونه از خاک مزرعه ذرت منطقه گچساران جمع‌آوری و شناسایی شد. اطلاعات مربوط به جمع‌آوری این گونه در جدول ۲ آورده شده است.

-۲ *Iphidosoma multiclavatum* Willmann, 1956 (Epiphididae) (شکل ۱-ب) ویژگی‌های مرحله‌ی دئوتونمف این کنه عبارتند از: هیپوستوم با دو جفت موی که در قاعده ضخیم و در انتهای نازک، موهای واقع روی صفحه سینه‌ای در قاعده ضخیم و در انتهای نازک، پیش‌ران پاهای اول تا چهارم دارای یک موی که در قاعده ضخیم و در انتهای نازک، پی‌ران پای اول و دوم هر کدام با دو موی در قاعده ضخیم و در انتهای نازک شده، پی‌ران پای سوم و چهارم هر کدام با یک موی در قاعده ضخیم و در انتهای نازک شده و صفحه پشتی با ۹ جفت موی طویل مشخص می‌شود.

این گونه از اروپا نیز گزارش شده است (Kontschán, 2007). این گونه از خاک مزرعه ذرت منطقه گچساران جمع‌آوری و شناسایی شد. اطلاعات مربوط به جمع‌آوری این گونه در جدول ۳ آورده شده است.

-۳ *Sessiluncus hungaricus* Karg, 1964 (Rhodacaridae) (شکل ۱-ج و د) ویژگی‌های کنه‌های ماده عبارتند از: قسمت جلویی صفحه جنسی گرد، صفحه شکمی- مخرجي آنقدر گسترش یافته که تا نزدیکی کوکسای پای چهارم پیش رفته است. تکثوم مثلثی شکل، مضرس، با دندانه‌های نامتقارن و در جلو نوک تیز است. ایدیوزوما بیضی شکل و قهوه‌ای

2- Hoyer's medium

3- Dr. Farid Faraji, Mitox Consultants, Science Park, Amsterdam, Netherlands, farid.faraji@mitox.org

4- Dr. Dariusz J. Gwiazdowicz, University of Life SciencesDepartment of Forest ProtectionWojska Polskiego , Poznan, Poland

5- Dr. Sławomir Kaczmarek, Zoological Institute, University of Bydgoszcz, Poland

6- Dr. G.W. Krantz, Zoological Institute, University of Corvallis, USA, krantzg@science.oregonstate.edu

رنگ، به طول ۴۴۰-۵۰۰ میکرومتر و عرض ۲۶۰ میکرومتر است. صفحه پشتی دارای ساختارهای مشبک و ۳۹ جفت مو می‌باشد. جفت موهای کناری R1، R2، R3، R4 از سطح پشتی صفحه پشتی بیرون آمده‌اند در حالی که جفت موی R5 از سطح شکمی صفحه پشتی خارج و مقدار کمی به صفحه پریترمی متصل است. طول موهای R2 و R3 برابر ۴ میکرون، J1 برابر ۳۴ میکرون، Z5 برابر ۴۰ میکرون، S6 و S7 برابر ۵۰ میکرون است. انگشت متحرک و ثابت کلیسیر به ترتیب دارای سه و چهار دندانه می‌باشند. این گونه اولین بار از اسرائیل گزارش و توصیف شده است (Karg, 1964). این گونه از خاک مزرعه ذرت منطقه گچساران جمع‌آوری و توسط دکتر Krantz شناسایی شد. اطلاعات مربوط به جمع‌آوری این گونه در جدول ۴ آورده شده است.

-۴ Rhodacarellus silesiacus Willmann, 1936 (Rhodacaridae) (شکل ۲-الف و ب) صفحه جلویی از سطح پشتی بدن از صفحه عقبی از سطح پشتی بدن کاملاً جدا شده و بین این دو صفحه کمی فضای خالی وجود دارد. دارای چهار Scleronoduli بین موهای R4 و R5 از صفحه پودونوتال است. صفحات پیش سینه‌ای به صورت صفحه مقطع در آمده و با صفحه سینه‌ای ادغام و دارای چهار جفت مو می‌باشند. این گونه تاکنون از ایران و باغ‌های مرکبات‌ساری گزارش شده است (زاد، ۱۳۸۴). این گونه از خاک مزرعه ذرت منطقه گچساران جمع‌آوری و شناسایی شد.

-۵ Dendrolaelaspis sp. (Digamasellidae) (شکل ۲-ج و د) کنه‌های ماده با صفحه پشتی که توسط یک شیار به دو قسمت کاملاً مجزا از هم تقسیم شده و دارای چهار Scleronoduli بین موهای R4 و R5 از صفحه پودونوتال هستند. عرض صفحه شکمی-مخرجی در برابر طول آن بیشتر و دارای ۵ جفت موی پیش‌مخرجی و ۳ موی اطراف مخرجی و نیز دارای نقوش عرضی در حاشیه جلویی صفحه می‌باشد. تکتوم سه شاخه که هر شاخه در انتهای دو شاخه کوچک‌تر تقسیم شده است. ساکنین چلاو (۱۳۸۴) و کرمانی (۱۳۸۵) جنس Dendrolaelaspis را گزارش و در این تحقیق از خاک مزرعه ذرت جمع‌آوری و شناسایی شد.

-۶ Hypoaspis karawajewi Berles (Laelapidae) (شکل ۳-الف و ب) در ماده‌ها و نرها ران پاهای دوم دارای یک زایده به نام Apophyse که به شکل انگشت شست می‌باشد و انگشت متحرک کلیسیرداری یک دندانه است. لوله پرتاب اسپرم انگشتی شکل و در انتهای به طرف عقب خمیده شده می‌باشد. این گونه توسط نعمتی (۱۳۸۷) از شهرکرد گزارش شده است و در این تحقیق از خاک مزرعه ذرت جمع‌آوری و شناسایی شد.

-۷ Antennoseius bacatus Athias-Henriot (Ascidae) (شکل ۳-ج) طول اکثر موهای صفحه پشتی ۳۰ میکرومتر، طول جفت موهای R1 (در راس صفحه پشتی واقع شده) تقریباً دو برابر نسبت به طول دیگر موها و در انتهای پوشیده از موهای ریز است. تکتوم سه شاخه و نامتقارن می‌باشد. این گونه از خاک مزرعه ذرت جمع‌آوری و شناسایی شد.

-۸ Antennoseius masoviae Sellnick (Ascidae) (شکل ۳-د) در ماده‌ها بر روی صفحه پشتی و از صفحه پودونوتال جفت موهای R1، R2، R3 و R4 و همچنین موهای واقع روی کوکسایی پاهای اول و دوم پستانک مانند می‌باشند. این گونه از خاک مزرعه ذرت جمع‌آوری و شناسایی شد.

-۹ Gamasodes spiniger Tragard (Parasitidae) (شکل ۴-الف) ویژگی‌های مرحله دثوتونمفای کنه عبارتند از: صفحه پودونوتال (طول ۳۱۲-۳۴۸ میکرومتر و عرض ۴۲۰-۳۷۲ میکرومتر) به‌طور مشخص اسکلروتینه و کاملاً مشبک جدول ۱- گونه‌های کنه یافت شده در مزارع ذرت و کلزا (گچساران، ۱۳۸۸-۱۳۸۹)

Table 1- List of mite species found in corn and rape seed fields (Gachsaran, 2009-2010)

Distribution in Iran	Feeding preference	Species
----------------------	--------------------	---------

Different parts of Iran such as Gachsaran Tehran-Gachsaran	Predator	<i>Antennoseius bacatus</i> Athias –Henriot, 1961 <i>Antennoseius masoviae</i> Sellnick, 1943
Different parts of Iran such as Gachsaran	Predator(Nematophagous)	<i>Arctoseius cetratus</i> (Sellnick, 1940) Syn.: <i>Arctoseius bispinatus</i> Weis-Fogh, 1947 <i>Lasioseius cetratus</i> Sellnick <i>Arctoseius halophilus</i> Willmann, 1949
Gachsaran	Predator	<i>Arctoseius venustulus</i> * (Berlese, 1917) Syn.: <i>Arctoseius pannonicus</i> Willmann, 1949
Gilan-Gachsaran	Predator	<i>Asca aphidiooides</i> (Linnaeus, 1758) Syn.: <i>Zercon bicornis</i> Berlese, 1882/92
Different parts of Iran such as Gachsaran	Predator	<i>Lasioseius lawrencei</i> (Evans, 1957) Syn.: <i>Neojordensia lawrencei</i> Evans, 2958 <i>Lasioseios frondeus</i> Karg. 1965 <i>L. berlesei</i> sensu Westerboer, 1963
Amol-Tehran-Gachsaran	Predator	<i>Dendrolaelaspis</i> sp.
Gachsaran	Predator	<i>Iphidosoma multiclavatum</i> ** Willmann, 1956
Different parts of Iran such as Gachsaran Chahar Mahal and Bakhtiari-Gilan-Tabriz-Hamedan-Gachsaran	Predator(Nematophagous)	<i>Hypoaspis aculeifer</i> (Canestrini, 1883) Predator
Different parts of Iran such as Gachsaran	Predator	<i>Hypoaspis nolli</i> Karg 1962 <i>Hypoaspis sclerotarsa</i> Costa, 1967
Chahar Mahal and Bakhtiari-Gilan-Gachsaran	Predator(Nematophagous)	<i>Hypoaspis karawaiewi</i> (Berlese, 1903)
Tehran-Gilan-Gachsaran	Predator(Nematophagous)	<i>Hypoaspis vacua</i> (Michael, 1891)
Different parts of Iran such as Gachsaran	Predator	<i>Gamasodes spiniger</i> (Tragardh, 1910) Syn.: <i>Gamasodes spinipes</i> Koch, 1841 <i>Poecilichirus spinipes</i> Berlese, 1892 <i>Parasitus lunaris milis</i> Schweizer, 1961
Different parts of Iran such as Gachsaran	Predator	<i>Parasitus fimetorum</i> (Berlese, 1904)
Different parts of Iran such as Gachsaran	Predator	<i>Vulgarogamasus oudemansi</i> (Berlese, 1903)
Zanjan-Fars-Lorestan-Gachsaran	Predator	<i>Neoseiulus barkeri</i> (Hughes, 1948)
Sari-Gachsaran	Predator(Nematophagous)	Syn.: <i>Lasioseius polonicus</i> Willmann, 1949
Gachsaran	Predator	<i>Rhodacarellus silesiacus</i> Willmann, 1935
Different parts of Iran such as Gachsaran	Predator(Nematophagous)	<i>Sessiluncus hungaricus</i> * Karg, 1964 <i>Veigaia nemorensis</i> (Koch, 1839) Syn.: <i>Gamasus nemorensis</i> Koch, 1839 <i>Cyrtolaelaps nemorensis</i> Berlese, 1892 Cyrtolaelaps kochi Tragardh, 1910

است. این صفحه دارای ۱۹ جفت مو که موهای j1 و r3 بلند و پوشیده از موی های ریز در صورتی که دیگر موها کوچک و نوک تیز می باشند. صفحه اپیستونوتال دارای ۱۴ جفت مو، در حالی که سه جفت موی Z1 و Z5 و Z3 بلندتر از دیگر موها و پوشیده از موی های ریز می باشند. این گونه از خاک مزارع ذرت و کلزا جمع آوری و توسط دکتر Kaczmarker در لهستان تشخیص داده شد.

(شکل ۴-ب) ویژگی‌های مرحله دئوتونمف ای که عبارتند از: *Parasitus fimetorum* Berlese (Parasitidae) -۱۰. صفحه پودونوتال دارای ۲۰ جفت مو، در حالی که موی ۸۲ بر روی صفحه واقع نشده و موهای ۱۳، ۱۴، ۲۵ و ۲۳ بلندتر از دیگر موها هستند. صفحه اپیستونوتال دارای ۱۵ جفت مو، در حالی که جفت موهای J5 و Z3 بلندتر از دیگر موها هستند. این گونه از خاک مزارع ذرت و کلزا جمع‌آوری و توسط دکتر Kaczmarki در لهستان تشخیص داده شده است.

(شکل ۴-ج) تمام موهای صفحه پشتی دارای موهای خیلی ریز -۱۱ *Asca aphidiooides* Linnaeus, 1758 (Asciade) به جزء جفت موهای Z4 و Z5، جفت موی Z4 روی دو برآمدگی انتهایی بدن (دو غده) واقع شده‌اند. در ماده‌ها طول ایدیوزوما ۲۷۰ تا ۳۰۵ میکرون است. این گونه از خاک مزرعه ذرت جمع‌آوری و شناسایی شد.

جدول ۲- اطلاعات مربوط به جمع‌آوری گونه *Arctoseius venustulus* در خاک مزرعه ذرت منطقه گچسارانTable 2- Collection data of *Arctoseius venustulus* found in soil of corn field in Gachsaran region

Coordinates	Temperature	Relative humidity	Sampling time	Number of mites	Growth stages of plant	Date
50° 41' 10" N, 30° 19' 20" E, 550m	25 °C	62%	9:30	2♀	Ear development	13 Sep.2009
50° 41' 10" N, 30° 19' 20" E, 550m	24 °C	81%	10:15	1♀	Ear development	27 Sep.2009

جدول ۳- اطلاعات مربوط به جمع‌آوری گونه *Iphidisoma multiclavatum* در خاک مزرعه ذرت منطقه گچسارانTable 3: Collection data of *Iphidisoma multiclavatum* found in soil of corn field in Gachsaran region

Coordinates	Temperature	Relative humidity	Sampling time	Number of mites	Growth stages of plant	Date
50° 41' 10" N, 30° 19' 20" E, 550m	25 °C	62%	9: 30	1♀	Ear development	19 Sep.2009
50° 41' 10" N, 30° 19' 20" E, 550m	24 °C	81%	10:15	1♀	Ear development	7 Oct.2009

جدول ۴- اطلاعات مربوط به جمع‌آوری گونه *Sessiluncus hungaricus* در خاک مزرعه ذرت منطقه گچسارانTable 4- Collection data of *Sessiluncus hungaricus* found in soil of corn field in Gachsaran region

Coordinates	Temperature	Relative humidity	Sampling time	Number of mites	Growing phase of plant	Date of collecting
50° 41' 10" N, 30° 19' 20" E, 550m	24 °C	81%	10:15	1♀	Ear development	29 Jul.2009

بحث


با توجه به این‌که تاکنون مطالعه‌ای روی فون کنه‌های شکارگر راسته Mesostigmata در منطقه گچساران انجام نگرفته بود، بنابراین فون کنه‌های شکارگر خاکری این راسته در مزارع ذرت و کلزا تا حدودی در منطقه مشخص شد. در این تحقیق همه گونه‌ها برای فون منطقه گچساران و استان کهگیلویه و بویراحمد و ۳ گونه و ۱ جنس برای فون کنه‌های ایران جدید شناخته شدند و در کل تعداد ۸ خانواده، ۱۴ جنس و ۲۰ گونه جمع‌آوری و شناسایی گردید. بررسی‌های انجام شده نشان داد که با توجه به شرایط آب و هوایی و اقلیم متنوع منطقه گچساران (نیمه‌شرقی شرایط آب و هوایی معتدل و خشک، نیمه‌غربی شرایط آب و هوایی گرم‌سیری خشک) دارای تنوع بسیار خوبی از کنه‌ها و به خصوص خانواده Ascidae


می باشد به طوری که بیشترین تنوع جنس و گونهای متعلق به کنهای این خانواده با ۶ گونه و ۴ جنس ملاحظه شد که در این میان ۱ گونه برای ایران جدید بود.

همچنین تنوع کنهای در دو شرایط آب و هوایی متفاوت بوده به طوری که ۱۷ گونه در شرایط آب و هوایی معتدل و خشک و ۷ گونه در شرایط آب و هوایی گرم‌سیری خشک جمع‌آوری شد و تنها گونه‌های *Hypoaspis aculeifer* و *Hypoaspis sclerotarsa* در هر دو شرایط آب و هوایی وجود داشتند و می‌توان در آینده تاثیر *Veigaia nemorensis* و *Arctoseius cetratus* از خانواده Ascidae بر روی تنوع کنهای را در منطقه بررسی کرد. گونه‌های *Rhodacarellus* از خانواده Laelapidae *Hypoaspis vacua* و *Hypoaspis karawaiwi* و *Hypoaspis aculeifer* و *silesiacus* از خانواده Rhodacaridae و گونه *Vaigaia nemorensis* از خانواده Veigaiidae نماتودخوار می‌باشد (Walter, 1988) و می‌توان در اغلب برنامه‌های مدیریت تلفیقی مبارزه با آفات از این کنهای برای کنترل نماتودهای آفت در مزارع ذرت و کلزا استفاده کرد. یکی از شکارگرهای خاکری، که به طور فوق العاده‌ای جمعیت نماتود *H. aculeifer* را کاهش می‌دهد (Sharma, 1971) و هر نسل آن در شرایط اپتیم ۳ تا ۴ هفته به طول می‌انجامد (Lobbes and Schotten, 1980). گونه‌هایی از کنهای بالاراسته Parasitiformes و راسته Mesostigmata شامل خانواده‌های Rhodacaridae، Ascidae، Laelaepidae، Parasitidae، Ologamasidae، Zerconidae، Phytoseiidae، Eviphididae، Macrochelidae، Biolozیک نماتودهای انگل گیاهان هستند. در شرایط آزمایشگاهی کشت‌هایی از لارو کنهای شکارگر تازه خارج شده *Hypoaspis (Cosmolaelaps) vacua* (Laelapidae)، *Gamasellodes vermivorax* Walter (Ascidae)، *Pergamasus* sp. near *crassipes* L. و گونه *Macrocheles schaeferi* Walter (Macrochelidae) Michael (Walter, 1988) برای تغذیه روی نماتودها و بندهایان رهاسازی می‌شود.

سپاسگزاری


بدینوسیله از دکتر فرید فرجی، دکتر Krantz، دکتر Kaczmarek، دکتر Gwiazdowicz استاد دانشگاه Halliday در کشور استرالیا به خاطر فراهم آوردن و ارسال مقالات مرتبه با کنهای خاکری راسته Mesostigmata، قدردانی می‌شود.






شکل ۱- الف- سطح شکمی کنه ماده *Arctoseius venustulus* ب- سطح شکمی کنه ماده *Iphidisoma multilavatum* ج- سطح شکمی کنه ماده *Sessiluncus hungaricus* د- تکتوم کنه ماده *Dendrolaelaspis sp.* (تمام شکل ها اصلی)

Fig1. a) *Arctoseius venustulus*. Female. ventral; b) *Iphidisoma multilavatum*. Female. ventral; c-d) *Sessiluncus hungaricus*. Female. e) ventral. d) tectum. (original)





شکل ۲- الف- سطح شکمی کنه ماده *Rhodacarellus silesiacus* ب- سطح پشتی کنه ماده *Dendrolaelaspis sp.* ج- سطح شکمی کنه ماده د- سطح پشتی کنه ماده *Dendrolaelaspis sp.* (تمام شکل ها اصلی)

Fig2. a-b) *Rhodacarellus silesiacus*. Female. a) ventral. b) dorsal.; c-d) *Dendrolaelaspis sp.* Female. c) ventral. d) dorsal. (original)



شکل ۳- الف- سطح شکمی کنه ماده *Hypoaspis karawaiwi* ب- پای دوم کنه ماده *H. karawaiwi* ج- صفحه پودونوتال کنه ماده د- صفحه پودونوتال کنه ماده *Antennoseius masoviae* (تمام شکل ها اصلی)
; c) *Antennoseius bacatus*. Female. podonotal shield; d) *Antennoseius II*Fig3. a-b) *Hypoaspis karawaiwi*. Female. a) ventral. b) leg
masoviae. Female. podonotal shield. (original)





(c-ج)

شکل ۴-الف- سطح پشتی در دئوتونمف که *Gamasodes spiniger* ب- سطح پشتی در دئوتونمف که *Asca aphidiooides* (تمام شکل ها اصلی)

Fig.4- a) *Gamasodes spiniger*. deutunymph. dorsal.; b) *Parasitus finetorum*. deutunymph. dorsal.; Asca aphidiooides. Female. opisthonotal shield. (original)

References

- Babaeian, E., A. A. Seraj, A. Nemati and Sh. Kazemi** 2010. Mites of the family Laelapidae (Acar: Mesostigmata) in Sharekord region, pp: 328. In: 19th Iranian Plant Protection Congress, 31 July-3 August 2010, Tehran.

Bregetova, N. G. 1977. Family Eviphididae Berlese, 1913. In: Ghilyarov, M. S. & Bregetova, N.G. (Eds). *Key to the Soil Inhabiting Mites. Mesostigmata*, Nauka, Leningrad, pp. 554-569.

Emam, Y. 2004. Cereal Production. Shiraz University Press, Iran. 173 pp.

Evans, G. O. & Till, W. M. 1979. Mesostigmatic mites of Britain and Ireland (Chelicera: Acari-Parasitiformes). An introduction to their external morphology and classification. Reprinted from *Trans. zool. Soc. Land.* 35, 139-270.

Kandil, M. 1981. The Mesostigmata fauna of the Hortobagy National Park. Akademiai Kiado, Budapest, 365-373.

Karg, W. 1964. Systematische Untersuchungen zwei eigenartiger neuer Gamasiden Arten (Acarina, Parasitiformes) aus der Bodenkrume. Opusc. Zool. Budapest., V, 1, 1964.

Karg, W. 1971. Acari, Milben Unterordnung Anactinochaeta (Parasitiformes). Die freile benden Gamasina (Gamasides), Raubmilben. Die Tierwelt. Deutschlands, 59: 344-451.

Karg, W. and Schorlemmer, A. 2009. New insights into predatory mites (Acarina, Gamasina) from tropical rain forests with special reference to distribution and taxonomy. Zoosyst. Evol. 85 (1): 57-91.

Kermani, P. 2006. Speciesdiversity of edaphic Mesostigmatic mites (Acar: Mesostigmata) associated with orchards in Abali of Tehran region. M.Sc. thesis in Persian with English summary, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran, 117 pp.

Komlovszky, I. Sz. 1987. Some data to the knowledge of Mesostigmatid and Prostigmatid mites of the Kiskunsag. Akademiai Kiado, Budapest, 343-345.

Kontschán, J. 2007. New and rare Mesostigmatid mites to the fauna of Hungary. Folia historico naturalia mussel matraensis. 31: 99-106.

Krantz, G. W. & Ainscough, B. D.

Krantz, G. W. & Walter, D. E. 2009. A manual of acarology. 807 pp.

Lobbes, P. and Schotten, C. 1980. Capacities of increase of the soil mite *Hypoaspis aculeifer* Canestrini (Mesostigmata: Laelapidae). Z. ang. Entomol., 90, 9-22.

Nemati, A. 1999. A faunistic surevy of Laelapidae (Acar: Mesostigmata) in Ahvaz region. M.Sc. thesis in Persian with English summary, University of Shahid Chamran, Ahvaz, Iran, 195 pp.

Rad, A. 2005. Study on speciesdiversity of mites associated with citrus trees in Sari region. M.Sc. thesis in Persian with English summary. Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran, 100 pp.

Rahmani, H. & Kamali, K. & Faraji, F. 2009. Predatory mite fauna of Phytoseiidae of northwest Iran (Acar: Mesostigmata)

- Sakenin Chelav, H. 2005.** Biodiversity of Ascidae mites (Acari: Mesostigmata) and biology of the major species in Amol region. Ph.D. Thesis in Persian with English summary, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran, 183 pp.
- Salaman, I. & J. Kortschan. 2006.** Soil Mesostigmata mite (Acari: Parasitiformes) from Hungary II. Latvijas Entomologs, 43: 14-17.
- Sharma, R.D. 1971.** Studies on the plant parasitic nematode *Tylenchorhynchus dubius*. Meded. Landbouww. Wageningen, 71, 1-154.
- Walter, D. E. 1988.** Nematophagy by soil arthropods from the shortgrass steppe, Chihuahuan desert and Rocky Mountains of the central United States. Agric. Ecosystems Environ., 24: 307-316.

Faunistic survey of edaphic Mesostigmatic mites (Acari: Mesostigmata) in rape seed and corn farms in Gachsaran, Iran

H. Moradian¹*, H. Ostovan², M. Haghani³

1- Department of Entomology, Fars Science and Research Branch, Islamic Azad University, Iran

2-

3- Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Yasouj University, Iran

Abstract

During 2009-2010 a faunistic study was carried out on edaphic Mesostigmatic mites in rape seed and corn farms in Gachsaran (Kohgiloyeh & Boir Ahmad province), Iran. A total of 20 species from 14 genera and 8 families of Mesostigmata were collected and identified. Among them one genus and three species are considered to be the first record for Iran. The genus is marked by (**) and the three species are marked with (*). Mites species are listed according to their families as follows:

Ascidae

- Antennoseius bacatus* Athias – Henriot, 1961
Antennoseius masoviae Sellnick, 1943
Arctoseius cetratus (Sellnick, 1940)
Arctoseius venustulus * (Berlese, 1917)
Asca aphidioides (Linnaeus, 1758)
Lasioseius lawrencei (Evans, 1957)

Digamasellidae

- Dendrolaelaps* sp.

Eviphididae

- Iphidosoma multiclavatum* ** Willmann, 1956

Laelapidae

- Hypoaspis (Geolaelaps) aculeifer* (Canestrini, 1883)
Hypoaspis (Geolaelaps) nolli Karg 1962
Hypoaspis (Pneumolaelaps) sclerotarsa Costa, 1967
Hypoaspis (Pneumolaelaps) karawaiewi (Berlese, 1903)
Hypoaspis (Cosmolaelaps) vacua (Michael, 1891)

Parasitidae

- Gamasodes spiniger* (Tragardh, 1910)
Parasitus fimetorum (Berlese, 1904)
Vulgarogamasus oudemansi (Berlese, 1903)

Phytoseiidae

- Neoseiulus barkeri* (Hughes, 1948)

Rhodacaridae

- Rhodacarellus silesiacus* Willmann, 1935
Sessiluncus hungaricus * Karg, 1964

Veigaiidae

- Veigaia nemorensis* (Koch, 1839)

Key words : Mesostigmata, Acari, corn, rape seed, fauna, Gachsaran

* Corresponding Author, E-mail: moradian_2009@yahoo.com
Received: 23 Oct. 2010 - Accepted: 10 Feb. 2011