

## اثر مثبت آلومینیوم در کاهش سمیت مس بر فعالیت نیترات ردوکتاز و آنزیم‌های آنتی اکسیدانی کلرلاولگاریس (*Chlorella vulgaris* Beijernick)

آرین ساطعی، شادمان شکروی،<sup>\*</sup> نرگس ناطقی

گروه زیست‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

### چکیده

کلرلاولگاریس در محیط کشت ۱۱-BG با ۵ غلظت مس (۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰، ۵۰ میکرومولار) بدون آلومینیوم و با آلومینیوم (۳۰۰ میکرومولار) و pH ۷/۱ به مدت ۱۰ روز در ۲۰ ساعت روشنایی و ۴ ساعت تاریکی رشد داده شد. در این تحقیق اثر تیمارهای مختلف روی فعالیت آنزیم‌های پراکسیداز، کاتالاز، آسکوربیات پراکسیداز و سوپر اکسیدیسموتاز، نیترات ردوکتاز مورد ارزیابی قرار گرفت. افزایش غلظت مس باعث افزایش فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی گردید. در حضور آلومینیوم فعالیت کاتالاز در تمامی تیمارهای مس نسبت به شاهد کاهش معنی‌داری نشان داد، اما فعالیت پراکسیداز و آسکوربیات پراکسیداز در تیمار ۲۰ میکرومولاکاهش معنی‌داری نسبت به شاهد نشان داد. همچنین کاهش معنی‌داری در فعالیت آنزیم‌های کاتالاز، پراکسیداز و آسکوربیات پراکسیداز در ۲۰ میکرومولارم میکرومولارم میکرومولارم نسبت به تیمار ۲۰ میکرومولارم مس بدون آلومینیوم مشاهده گردید. نتایج نشان داد اثر غلظتهای مختلف مس بدون آلومینیوم بر فعالیت نیترات ردوکتاز معنی‌دار نمی‌باشد. در تیمارهای مس و آلومینیوم بیشترین فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در غلظت ۴۰ میکرومولارم مشاهده گردید که این افزایش نسبت به تیمار ۲۰ میکرومولارم معنی‌دار و نسبت به سایر تیمارها و شاهد معنی‌دار نمی‌باشد. افزایش بعضی آنزیم‌های آنتی اکسیدانی در حضور آلومینیوم منجر به کاهش سمیت مس و افزایش رشد جلبک گردید.

کلمات کلیدی: آلومینیوم، آنزیم‌های آنتی اکسیدانی، کلرلاولگاریس، سمیت مس، نیترات ردوکتاز

آلاینده‌های اصلی ناشی از صنعتی شدن و شهرنشینی می‌باشند و دریاچه‌های زیادی با فلزات سنگین از جمله مس آلوده شده‌اند. گزارشات زیادی حاکی از اثرات غلظت‌های سمی مس روی ریز جلبک‌ها است و مشخص گردیده، کاتیون آزاد Rai et al., 1981; Lobban  $Cu^{2+}$  اثرات سمی را ایفا می‌کند (and Harrison, 1994; Gledhill et al., 1997; Pinto, 2003). ریز جلبک‌هایی از جنس *Chlorella*, ساکنان عمومی آب

### مقدمه

مهمنترین فلزات سنگین از نظر آلودگی آب، روی، مس، سرب، کادمیوم، جیوه، نیکل، کبالت و کروم هستند (Vymazal, 1995). مس یک عنصر کم مصرف ضروری برای نمو گونه‌های فتوستنتزی است، هر چند در غلظت‌های بالا این فلز برای رشد ریز جلبک سمی است (Baos et al., 2002; Yan and Pan., 2002).

نیترات، افزایش می‌یابد و بوسیله افزایش آمونیم در کشت‌های کلرلا کاهش می‌یابد (Morris and Syrett, 1963).

هدف این تحقیق کاهش سمیت مس و افزایش رشد جلبک *Chlorella vulgaris beijernick* می‌باشد و بدین منظور جلبک در تیمارهای مختلف مس بدون آلومینیوم و با آلومینیوم (۳۰۰ میکرومولار) رشد داده شد و میزان فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی و نیترات ردوکتازی تعیین گردید.

#### مواد و روش‌ها

جلبک *Chlorella vulgaris Beiernick* به طور خالص از کلکسیون ریز جلبک پژوهشکده علوم کاربردی دانشگاه شهید بهشتی تهیه و سپس در محیط کشت BG-11 با ۵ غلظت مس (۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰ و ۵۰ میکرومولار) بدون آلومینیوم و در همان محیط کشت با ۴ غلظت مس (۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰) با آلومینیوم (غلظت ۳۰۰ میکرومولار) در ارلن‌های ۲۵۰ میلی لیتری (با سه تکرار) تلچیح و کشت گردید. نمونه‌ها به مدت ۱۰ روز در اتاق کشت جلبک (دانشگاه آزاد اسلامی گرگان) با روشنایی ۱۵۰۰ لوکس و دمای ۲۵-۲۲°C و تناوب نوری ۲۰ ساعت روشنایی و ۴ ساعت تاریکی رشد نمودند (بدون هوادهی و شیکر).

#### سنجهش فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی

ابتدا ۱۰ میلی لیتر از هر سوپرانسیون جلبکی برداشته، بعد از سانتریفوژ نمونه، محلول رویی دور ریخته شد و رسوب جلبکی توزین گردید (لوله‌ها قبل از اضافه شدن نمونه و همراه با رسوب جلبکی وزن گردیدند و وزن رسوب جلبکی محاسبه شد). ۴ میلی لیتر محلول عصاره‌گیری شامل ۱/۲ گرم تریس، ۲ گرم اسید آسکوربیک، ۳/۸ گرم بوراکس، ۲ گرم EDTANa<sub>2</sub> و ۵۰ گرم پلی اتیلن گلیکول ۲۰۰۰ به رسوب جلبکی اضافه شد و در حجم ۱۰۰ میلی لیتر همگن گردید. سپس محلول‌های تهیه شده به مدت ۲۴ ساعت در یخچال نگهداری شدند. بعد از ۲۴ ساعت هر کدام از محلول‌ها در دور ۴۰۰g به مدت نیم ساعت سانتریفوژ گردیدند. محلول بالایی که بسیار شفاف بود برای سنجهش فعالیت آنزیمی مورد استفاده قرار گرفت. سپس میزان جذب توسط دستگاه


شیرین و اکوسیستم‌های نزدیک دریا هستند و مس که یک کوفاکتور برای آنزیمهای گوناگون محسوب می‌شود، بسته به غلظت می‌تواند سبب اثرات نامطلوبی در تقسیم سلولی، رشد Hassal و مراحل فتوسنتز در گونه‌های *Chlorella* شود (McBrien and Hassal, 1967; Gadd and Griffiths, 1963; Stauber and Florence, 1987).

mekanizm سمیت مس شامل تولید گونه‌های اکسیژنی واکنش گر (ROS) توسط مداخله مس در واکنش فتوسون Okamoto et al., 2001; Rijstenbil and Gerringa, 2002). افزایش یافتن سطح ROS سبب آسیب اکسیداتیو در ماکرومولکولهایی مانند پروتئین‌ها و اسیدهای نوکلئیک و لیپیدها شده و سرانجام منجر به آسیب به اندامک‌های مختلف سلولی می‌گردد. کلروپلاست‌های جلبک با یک سیستم پیچیده غشا بی غنی از اسیدهای چرب اشباع نشده، هدف بالقوه پراسیداسیون محسوب می‌شود (Halliwell and Gutteridge, 1999). پاسخ‌های سازگارکننده‌ای به منظور کاهش آسیب ماکرومولکولی ایجاد شده بوسیله استرس اکسیداتیو در جلبک‌ها توسعه یافته که از جمله این پاسخها رفع سمیت فلز و مکانیسم‌های دفاعی برای رفع ROS، قبل از اینکه بتوانند یک آسیب برگشت‌ناپذیر ایجاد کنند (Pinto et al., 2003).


*Nitzschia closterium* سمیت یونی مس در محیط رشد توسط یونهای فلزی سه طرفیتی (Cr, Co, Al, Fe, Mn) بهبود می‌یابد، ایجاد یک لایه هیدروکسید فلزی III در اطراف سلول جلبک، مس را جذب نموده و از نفوذ آن به داخل سلول می‌کاهد (Stauber and Florence, 1987).

نیترات هردو آلاینده‌های مضر می‌باشند و اغلب با هم ایجاد می‌شوند. نیترات ردوکتاز ثابت شده که در جلبک برای درمان آلدگی غذایی استفاده می‌شود، شناخت اثر فلزات سنگین روی فعالیت آنزیم بسیار ضروری است. Awasthi در سال ۲۰۰۵ بیان داشت افزایش غلظت نیکل و کادمیوم و روی در کلرلا ولگاریس و جلبک سبز - آبی *Anacystis nidulans* باعث کاهش فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز می‌گردد. بررسی‌ها نشان داده که سطح فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز بوسیله افزایش

مس بدون آلمینیوم کاهش معنی داری ( $P<0.05$ ) نشان داد (شکل ۲).



شکل ۱: اثر غلظت‌های مختلف مس بدون آلمینیوم بر فعالیت آنزیم کاتالاز در *Chlorella vulgaris beijernick*



شکل ۲: مقایسه اثر غلظت‌های مختلف مس بدون آلمینیوم و با آلمینیوم بر فعالیت آنزیم کاتالاز در *Chlorella vulgaris beijernick*

پراکسیداز: اثر مس بدون آلمینیوم بر فعالیت آنزیم پراکسیداز معنی دار است ( $P<0.05$ ). افزایش فعالیت پراکسیدازی در غلظت ۵۰ میکرومولار مس بدون آلمینیوم نسبت به سایر تیمارها معنی دار و نسبت به شاهد معنی دار نمی باشد (شکل ۳). در تیمارهای مختلف مس با آلمینیوم (۳۰۰ میکرومولار) فعالیت آنزیم پراکسیداز در تیمار ۲۰ میکرومولار نسبت به شاهد کاهش معنی داری نشان داد. بین سایر تیمارها با شاهد و تیمار ۲۰ میکرومولار اختلاف معنی داری مشاهده نگردید (شکل ۴). فعالیت پراکسیداز در تیمار ۲۰ میکرومولار مس با آلمینیوم نسبت به تیمار ۲۰ میکرومولار مس بدون آلمینیوم کاهش معنی داری نشان داد (شکل ۴). با حضور آلمینیوم از شاهد تغاظت ۲۰

اسپکتروفوتومتر (LABOMED, INC U.S.A) جهت سنجش فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی خوانده شد. فعالیت پراکسیداز به روش (Koroi, 1989)، فعالیت آسکوربات پراکسیداز به روش (Arrigoni, 1992) و فعالیت کاتالاز به روش (Chance and Maehly, 1995) و فعالیت سوپراکسید دیسموتاز به روش (Giannotolitis and Rice, 1977) بر حسب واحد  $OD.g^{-1}.FW.10min^{-1}$  و فعالیت سوپراکسید دیسموتاز به روش (Giannotolitis and Rice, 1977) بر حسب واحد  $OD.g^{-1}.FW.20min^{-1}$  مورد سنجش قرار گرفت.

سنجد فعالیت نیترات ردوکتاز (Sym, 1984): رسوب جلبکی بدست آمده (مشابه روش بالا) با کمک محلول انکوپاسیون (نیترات پتاسیم، پروپانول، تامپون فسفات) سایده و بعد از سانتریفوژ، ۲ میلی لیتر از عصاره بدست آمده را با ۱ میلی لیتر گریس I، ۱ میلی لیتر گریس II مخلوط و جذب آن را در طول موج ۵۲۰ nm خوانده شد. آنالیزهای آماری با استفاده از واریانس ANOVA و نرم افزار SPSS و مقایسه میانگین‌ها با استفاده از آزمون Tukey و Duncan ( $P<0.05$ ) و رسم نمودارها توسط نرم افزار Excel انجام پذیرفت.


## نتایج

اثر تیمارهای مختلف مس بدون آلمینیوم و با آلمینیوم بر فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی


کاتالاز: اثر کلی مس بر فعالیت آنزیم کاتالاز معنی دار است ( $P<0.05$ ) بیشترین فعالیت کاتالازی در ۵۰ میکرومولار مس مشاهده گردید که اختلاف آن با سایر تیمارها معنی دار و نسبت به شاهد و تیمار ۴۰ میکرومولار معنی دار نمی باشد (شکل ۱).

فعالیت کاتالاز در تیمارهای مختلف مس با آلمینیوم (۳۰۰ میکرومولار) کاهش معنی داری نسبت به شاهد نشان داد، اما بین تیمارها اختلاف معنی داری مشاهده نگردید (شکل ۲). فعالیت کاتالاز در شاهد و غلظت ۱۰ میکرومولار مس با آلمینیوم نسبت به تیمار ۱۰ میکرومولار مس و شاهد بدون آلمینیوم افزایش نشان داد (معنی دار نبود). فعالیت کاتالاز در تیمار ۲۰ میکرومولار مس با آلمینیوم نسبت به ۲۰ میکرومولار

افزایش نشان داده است. کاهش فعالیت آنزیم در تیمار ۲۰ میکرومولار مس با آلومنیوم نسبت به ۲۰ میکرومولار مس بدون آلومنیوم معنی دار می باشد (شکل ۶).




شکل ۵: اثر غلظت های مختلف مس بدون آلومنیوم بر فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز در *Chlorella vulgaris beijernick*




شکل ۶: مقایسه اثر غلظت های مختلف مس با و بدون آلومنیوم بر فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز در *Chlorella vulgaris beijernick*

سوپراکسید دیسموتاز: اثر مس بدون آلومنیوم بر فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز معنی دار است ( $P<0.05$ ). فعالیت آنزیم در غلظت ۵۰ میکرومولار مس نسبت به سایر تیمارهای مس افزایش معنی داری نشان داد. البته این افزایش فعالیت آنزیم نسبت به شاهد معنی دار نمی باشد (شکل ۷). در حضور آلومنیوم (۳۰۰ میکرومولار) فعالیت سوپراکسید دیسموتازی در تیمار ۲۰ میکرومولار کاهش نشان داد، این کاهش نسبت به شاهد و سایر تیمارها معنی دار نمی باشد (شکل ۸). فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در تمام تیمارهای مس با آلومنیوم نسبت به تیمارهای مس بدون آلومنیوم افزایش نشان داد (شکل ۸).

میکرومولا رمس کاهش فعالیت پراکسیدازی و با افزایش غلظت مس افزایش فعالیت پراکسیدازی مشاهده گردید.




شکل ۳: اثر غلظت های مختلف مس بدون آلومنیوم بر فعالیت آنزیم پراکسیداز در *Chlorella vulgaris beijernick*




شکل ۴: مقایسه اثر غلظت های مختلف مس با و بدون آلومنیوم بر فعالیت آنزیم پراکسیداز در *Chlorella vulgaris beijernick*

آسکوربات پراکسیداز: اثر مس بدون آلومنیوم بر فعالیت آسکوربات پراکسیداز معنی دار است ( $P<0.05$ ). کاهش فعالیت آنزیم در تیمارهای ۱۰ و ۲۰ میکرومولا رمس بدون آلومنیوم نسبت به تیمار ۵۰ میکرومولا رمس معنی دار می باشد و این کاهش نسبت به شاهد و تیمارهای ۳۰ و ۴۰ میکرومولا رمس معنی دار نمی باشد (شکل ۵). در تیمارهای مختلف مس با آلومنیوم کمترین فعالیت آنزیم در تیمار ۲۰ میکرومولا رمس با آلومنیوم و بیشترین فعالیت در شاهد مشاهده گردید. افزایش فعالیت آنزیم در تیمار ۴۰ میکرومولا رمس شاهد نسبت به تیمار ۲۰ میکرومولا رمس معنی دار است ( $P<0.05$ ). با توجه به شکل ۶ مشاهده گردید در حضور آلومنیوم فعالیت آنزیم از شاهد تا غلظت ۲۰ میکرومولا رمس کاهش و در غلظت های بالاتر از آن

آلومینیوم افزایش معنی داری نسبت به تیمارهای مس بدون آلومینیوم نشان داد ( $P<0.05$ ).




شکل ۹: اثر غلظت های مختلف مس بدون آلومینیوم بر فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در *Chlorella vulgaris beijernick*




شکل ۱۰: مقایسه اثر غلظت های مختلف مس با و بدون آلومینیوم بر فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در *Chlorella vulgaris beijernick*

**بحث**

نتایج نشان داد، بیشترین فعالیت کاتالازی، پراکسیدازی، آسکوربات پراکسیدازی و سوپراکسید دیسموتازی در غلظت ۵۰ میکرومولار مس است که این افزایش فعالیت آنزیمی در این تیمار نسبت به شاهد معنی دار نمی باشد. De Vos همکاران وی (۱۹۹۱) بیان داشتند ظرفیت کاتالاز با غلظت های سمی مس در ریشه های *Silene cucubalus* افزایش می یابد که با نتایج ما همخوانی دارد. افزایش مس در محیط *Scenedesmus vacuolatus* باعث استرس اکسیداتیو می شود و دفاع آنتی اکسیدانی افزایش می یابد. یک افزایش معنی داری در فعالیت کاتالاز در ۲۱۰ و ۴۱۴ میکرومولار مس و یک افزایش معنی داری در فعالیت سوپراکسید دیسموتاز و



شکل ۷: اثر غلظت های مختلف مس بدون آلومینیوم بر فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در *Chlorella vulgaris beijernick*



شکل ۸: مقایسه اثر غلظت های مختلف مس با و بدون آلومینیوم بر فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در *Chlorella vulgaris beijernick*

اثر غلظت های مختلف مس بدون آلومینیوم و با آلومینیوم (۳۰۰ میکرومولار) بر فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز اثر غلظت های مختلف مس بدون آلومینیوم بر فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز معنی دار نمی باشد ( $P>0.05$ ). فعالیت آنزیم در تیمار ۲۰ میکرومولار مس کاهش نشان داد که این کاهش نسبت به شاهد و سایر تیمارها معنی دار نیست (شکل ۹). اثر غلظت های مختلف مس با آلومینیوم (۳۰۰ میکرومولار) بر فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز معنی دار است. کمترین فعالیت آنزیم در تیمار ۲۰ میکرومولار مشاهده گردید که این کاهش فعالیت آنزیم نسبت به تیمار ۴۰ میکرومولار معنی دار و نسبت به شاهد و تیمارهای ۱۰ و ۳۰ میکرومولار معنی دار نمی باشد (شکل ۱۰). فعالیت نیترات ردوکتازی در تیمارهای مس با

با نتایج ما مطابقت دارند. Colepicolo و Okamoto (۱۹۹۸) نیز بیان داشتند به کارگیری مخلوطی از فلزات (Hg, Cd, Pb, Cu) *Gonyaulax polyedra* فعالیت SOD را در تحریک می‌کنند که با نتایج این تحقیق همخوانی دارد.

نتایج نشان داد اثر غلظت‌های مختلف مس بدون آلومینیوم بر فعالیت نیترات ردوکتاز بی معنی است. Awasthi در سال ۲۰۰۵ بیان داشت افزایش غلظت فلزات نیکل، روی و کادمیوم بر جلبک سبز - آبی *Anacystis nidulans* و جلبک سبز *Chlorella vulgaris* منجر به کاهش فعالیت نیترات ردوکتاز می‌گردد که با نتایج ما مطابقت ندارد. در تیمارهای مس با آلومینیوم بیشترین فعالیت نیترات ردوکتازی در غلظت ۴۰ میکرومولار مشاهده گردید که نسبت به تیمار ۲۰ میکرومولار معنی دار و نسبت به شاهد و سایر تیمارها معنی دار نمی‌باشد. همچنین مشاهده گردید در تمامی تیمارهای مس با آلومینیوم افزایش میزان فعالیت نیترات ردوکتاز نسبت به تیمارهای مس بدون آلومینیوم معنی دار است. ساطعی و سروش نسب (۱۳۸۷) بیان داشتند، فعالیت نیترات ردوکتاز در جلبک *Chlorella vulgaris* در غلظتهای ۳۰۰ و ۴۰۰ میکرومولار آلومینیوم افزایش معنی داری نسبت به شاهد، ۱۰۰ و ۲۰۰ میکرومولار نشان می‌دهد که می‌تواند به دلیل افزایش جذب نیترات همراه با افزایش کاتیون آلومینیوم باشد که تاحدودی با نتایج ما همخوانی دارد. تحقیقات نشان داد سمتی یونی مس در محیط رشد *Nitzschia closterium* توسط یونهای فلزی سه ظرفیتی (Cr, Co, Al, Fe, Mn) بهبود می‌یابد، ایجاد یک لایه هیدروکسید فلزی III در اطراف سلول جلبک، مس را جذب نموده و از نفوذ آن به داخل سلول می‌کاهد و باعث کاهش سمیت مس می‌گردد که با نتایج بدست آمده در این تحقیق همخوانی دارد.

### نتیجه‌گیری نهایی

در غلظت‌های بالای مس فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی افزایش نشان می‌دهند، حضور آلومینیوم باعث افزایش بیشتری در بعضی از آنزیمهای آنتی اکسیدانی گردیده که تا حدودی از

محتوای GSH تنها در ۴۱۴ میکرومولار مشاهده گردید به عکس در *Chlorella kessleri* اختلاف معنی داری در این پارامترها بین ۶/۲ و ۱۰۸ میکرومولار مشاهده نشد (Sabatini et al., 2009). پدیده عملکرد مس، تولید ROS است که استرس اکسیداتیو بیان می‌شود (Luna et al., 1994). به نظر می‌رسد افزایش غلظت مس منجر به افزایش سطح ROS و نهایتاً افزایش فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی می‌گردد. Malick در سال ۲۰۰۴ طی بررسی پاسخهای آنتی اکسیدانی جلبک کلرولا ولگاریس تحت استرس مس، بیان نمود با افزایش غلظت مس فعالیت سوپراکسیدیسموتازی افزایش نشان داده و فعالیت کاتالازی و آسکوربات پراکسیدازی کاهش می‌یابد که از بعضی جنبه‌ها با نتایج ما همخوانی و از جنبه‌هایی دیگر مغایرت دارد.

در تیمارهای مس با آلومینیوم، کاهش فعالیت کاتالاز و پراکسیداز در تیمار ۲۰ میکرومولار نسبت به شاهد معنی دار است و نسبت به سایر تیمارها معنی دار نمی‌باشد. کاهش فعالیت آسکوربات پراکسیداز در تیمار ۲۰ میکرومولار نسبت به شاهد و تیمار ۴۰ میکرومولار معنی دار و نسبت به سایر تیمارها معنی دار نمی‌باشد و بین فعالیت سوپراکسید دیسموتازی تیمارهای مختلف مس با آلومینیوم و شاهد اختلاف معنی داری مشاهده نگردید. در تیمار ۲۰ میکرومولار مس با آلومینیوم فعالیت کاتالازی، پراکسیدازی و آسکوربات پراکسیدازی نسبت به تیمار ۲۰ میکرومولار مس بدون آلومینیوم کاهش نشان داد. میزان فعالیت سوپراکسید دیسموتازی در تمام تیمارهای مس با آلومینیوم نسبت به تیمارهای مس بدون آلومینیوم افزایش نشان داد. Jusu و همکاران (۲۰۰۴) بیان داشتند افزایش غلظت آلومینیوم در محیط اسیدی باعث افزایش فعالیت سوپراکسید دیسموتازی و پراکسیدازی در *Scenedesmus obliquus* می‌گردد. تحقیقات ساطعی و سروش نسب (۱۳۸۷) نشان داد آلومینیوم در غلظت ۳۰۰ میکرومولار باعث افزایش معنی داری در فعالیت سوپراکسید دیسموتاز نسبت به شاهد، تیمارهای ۱۰۰ و ۲۰۰ میکرومولار در جلبک کلرولا ولگاریس می‌گردد که تاحدودی

- cell plasmalemma in copper tolerant *Silene cucubalus*. Physiol. Plant. 82: 523-528
- Gadd, G.M., Griffiths, A.J. (1978).** Microorganisms and heavy metal toxicity. *Microb Ecol* 4:303-317
- Ginnopolitis, N.C. and Ries, S.K. (1977).** Superoxide dismutase occurrence in higher plants. *Plant Phys.*,59: 309-314.
- Gledhill, M., Nimmo, M., Hill, S.J., Brown, M.T. (1997).** The toxicity of copper (II) species to marine algae, with particular reference to macroalgae. *J. Phycol.* 33 (1), 2-11.
- Halliwell, B., Gutteridge, J.M.C.(1999).** Free Radicals in Biology and Medicine, third ed. Oxford University Press, New York
- Hassal, K. (1963).** Uptake of copper and its physiological effects on *Chlorella vulgaris*. *Physiol Plant* 16:323-332
- Jusu,S.A, Kong,F.X, Qing,B.G, Tan,J.K, Han., X.B. (2004).** The course biochemical response of green algae *Scenedesmus obliquus* PH. *Environ Contam Toxicol.*73:1001-1008
- Koroi, A. (1989).** Gel electrophores tisch and spectrophotometris echoe unter unchangen zomeinfluss der temperature auf struktur und aktritat der amylase and peroxidase isoenzyme, *Physiol Veg.*20:15-23
- Lobban, C.S., Harrison, P.J. (1994).** Seaweed Ecology and Physiology.Cambridge University Press, NewYork.
- Luna, C.M., Gonzalez, C.A. and Trippi, V.S. (1994).** Oxidative damage caused by an excess of copper in oat leaves. *Plant Cell Physiol.* 35: 11-15.
- Mallick,N.(2004).**Copper-induced oxidative stress in the chlorophyce an microalga *Chlorella vulgaris*: response of the antioxidant system. *J. Plant Physiol.*161, 591-597.
- McBrien, D.C., Hassal, K. (1967).** The effect of toxic doses of copper upon respiration, photosynthesis, and growth of *Chlorella vulgaris*. *Physiol Plant* 20:113-117
- Morris, I. and Syrett, P.J. (1963).** The development of nitrate reductase in *Chlorella* and its repression by ammonium. *Arch. Mikrobiol.* 47: 32-41.
- Okamoto, O.K., Colepicolo, P. (1998).** Response of superoxide dismutase to pollutant metal stress in the marine dinoflagellate *Gonyaulax polyedra*.
- سمیت مس می کاهد. کاهش فعالیت اکثر آنزیم های آنتی اکسیدانی در تیمار ۲۰ میکرومولار مس مشاهده گردید که به نظر می رسد در آن غلظت، آلومینیوم نمی تواند سمیت مس را کاهش دهد همچنین می توان بیان داشت علاوه بر مقدار مطلق مس و آلومینیوم، مقدار نسبی آنها در پاسخ جلبک مؤثر است و به این دلیل جلبک رفتارهای دوگانه ای را از خود نشان داده است. افزایش فعالیت نیترات ردوکتازی در حضور آلومینیوم می تواند دلیلی بر افزایش جذب نیترات و افزایش رشد جلبک باشد.
- ### سپاسگزاری
- بدین وسیله از کلیه افرادی که در طول انجام این تحقیق، راهنمای اینجانب بوده اند و سرکار خانم کیابی (مسئول محترم آزمایشگاه تحقیقات)، سرکار خانم رسایی (مسئول محترم آزمایشگاه شیمی) نهایت قدردانی و تشکر را می نمایم.
- ### منابع
- ساطعی، آ.، و سروش نسب، ل. (۱۳۸۷). بررسی برخی از پاسخ های فیزیولوژی جلبک کلراولگاریس به اضافه کردن آلومینیوم در محیط کشت. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان.
- Arrigoni, O. (1992).** Ascorbate system in plant development. *J. Biomember*, 26: 407-419.
- Awasthi, M. (2005).**Nitrate reductase activity: A solution to nitrate problems tested in free and Immobilized algal cells in presence of heavy metals. *J. Environ*, Vol. 2, No. 3, pp. 201-206
- Baos, R., Garcí a-Villada, L., Agrelo, M., Lopez Rodas, V., Hiraldo, F, Costas, E. (2002).** Short-term adaptation of microalgae inhighly stressful environments: an experimental model analyzing there sistance of *Scenedesmus intermedius* (Chlorophyceae) to the heavy metal smixture from the Aznalcollarmine spill. *Eur.J.Phycol.* 37, 593- 600.
- Chance, B. and Maehly, C. (1995).** Assay catalase and peroxidase methods enzymol. 11: 764-775
- De Vos, C.H.R, H. Schat, M.A.M. De Waal, R. Vooijs, and W.H.O. Ernst. (1991).** Increased resistance to copper-induced damage of the root

- Sabatini, S.E., Juarez, A.B., Eppis, M.R., Bianchi , L., Luquet, C.M., Molina, M.C.R.,(2009).** Oxidative stress and antioxidant defenses in two green microalgae exposed to Copper. Ecotoxicology and Environmental Safety.doi: 10.1016.
- Stauber, J.L. and Florence, T.M. (1987).** Mechanism of toxicity of ionic copper and copper complexes to algae. Marine Biology. 94: 511- 519
- Sym, G.L. (1984).** Optimisation of the invivo assay conditions for nitrate reductase in barley. J. Sci. Food. Agri, 35: 725-730.
- Vymazal, J. (1995).** Algae and element cycling in wetlands. Lewis Publ., Boca Raton
- Yan, H., Pan, G. (2002).** Toxicity and bioaccumulation of copper in three green microalgal species. Chemosphere 49, 471–476.
- Comp Biochem pHysiol C pHarmacol Toxicol endocrinol.** 119:67-73.
- Okamoto, O.K., Pinto, E., Latorre, L.R., Bechara, E.J.H., Colepicolo, P.(2001).** Antioxidant modulation in response to metal-induced oxidative stress in algal chloroplasts. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 40, 18–24
- Pinto, E., Sigaud-Kutner, T.C.S., Leitao, M.A.S., Okamoto, O.K., Morse, D., Colepicolo, P.(2003).** Heavy metal-induced oxidative stress in algae. J. Phycol. 39, 1008–1018
- Rai, L., Gaur, J.P., Kumar, H.D.(1981).** Phycology and heavy metal pollution. Biol. Rev. 56, 99–151
- Rijstenbil, J.W., Gerringsa,L.J.A.(2002).** Interactions of algalligands,metal complexation and availability ,and cell responses of the diatom *Ditylum brightwellii* with agradual increase in copper.Aquat. Toxicol. 56, 115–131

**Aluminum positive influences in reduction of copper toxic effects  
on nitrate reductase and antioxidant enzymes activities of  
*Chlorella vulgaris Beijernick***

Sateei, A., Shokravi, S., \*Nateghi, N.

Department of biology, Islamic Azad University - Gorgan Branch

**Abstract**

*Chlorella vulgaris beijernick* was grown in medium BG-11 with 5 concentrations of copper (10, 20, 30, 40, 50 $\mu$ M) without aluminum or with aluminum (300 $\mu$ M) and pH 7.1 for 10 days in 20 hours light and 4 hours darkness. In this study, the effect of different treatments on the activity of peroxidase, catalase, Ascorbat peroxidase and superoxid dismutase and nitrate reductase, in vivo, was evaluated. Increase of copper concentration caused increase in activity of antioxidant enzymes. Catalase activity in the presence of aluminum in all copper treatments showed a significant reduction, but peroxidase and Ascorbat peroxidase activities in 20 $\mu$ M treatments decreased significantly when compared with control. The significant decrease in the activity of catalase, peroxidase and Ascorbat peroxidase activity, in 20 $\mu$ M copper with aluminum comparing with 20  $\mu$ M copper without aluminum was also observed. Results also showed that the effect of different concentrations of copper without aluminum on nitrate reductase activity was not significant and most nitrate reductase activity in treatments with copper and aluminum was observed in 40 $\mu$ M that was significant when compared with 20 $\mu$ M treatment and was not significant when compared with other treatments or control. It is concluded that the presence of aluminum, by increasing some of antioxidant enzymes activities, lead to reduce of copper toxicity and algae growth increases.

**Key Words:** Aluminum, Antioxidant enzymes, *Chlorella vulgaris*, Copper toxicity, Nitrate reductase