

تعیین الگوی برداشت، حداکثر ثابت برداشت و بازگشت شیلاتی ماهی شیر

(در محدوده آب های استان هرمزگان) *(Scomberomorus commerson)*

محمد درویشی^{(۱)*}، احسان کامرانی^(۲)، محمد رضا طاهری زاده^(۳)

Mhdar2001@yahoo.com

۱. دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس. صندوق پستی: ۷۹۱۵۹-۱۳۱۱
۲. دانشگاه هرمزگان، گروه شیلات وزیست شناسی دریا. صندوق پستی: ۳۹۹۵
۳. پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان. بندر عباس. صندوق پستی: ۷۹۱۴۵-۱۵۹۷

چکیده

ماهی شیر یکی از گونه های مهم سطح زیان درشت در استان هرمزگان محسوب می شود. میزان صید این گونه در سال ۱۳۸۶ بالغ بر ۵۹۱۲ تن گردید که این مقدار ۱۳٪ از کل صید ماهیان سطح زی درشت را تشکیل داد. جهت برداشت پایدار از ذخایر ماهی شیر لازم است الگوی برداشت، حداکثر ثابت برداشت و بازگشت شیلاتی مورد محاسبه قرار گیرد. به همین منظور اطلاعات مربوط به فراوانی طولی و وزنی در تمامی ماه های سال ۱۳۸۶ از ۳ تخلیه گاه اصلی بندرلنگه، بندر عباس و بندر جاسک در استان هرمزگان جمع آوری گردید. پیرامونه های رشد K_۱ به ترتیب ۱۵۰/۲۴ سانتی متر، ۶۶/۰ برسال به دست آمده و از آنجا، میزان مرگ و میر طبیعی ۰/۶۷ برسال به دست آمد و سپس مقدار حداکثر ثابت برداشت ۱۴۹۰ تن برآورد گردید. رابطه توانی $W = a \cdot FL^b$ طول(سانتی متر) - وزن(گرم) این بررسی به صورت $10^{-2} \times 10^{2/87}$ محاسبه شد که نشاندهنده رشد همگون این گونه بود. الگوی برداشت نشان داد که حدود ۵۰٪ از ماهیان صید شده قبل از اولین طول بلوغ مورده برداری قرار می گیرند. بیشترین مقدار بازسازی شیلاتی در مهر ماه و بامیانگین طولی ۴۰ سانتی متر به دست آمد. جهت تصحیح الگوی برداشت مناسب این گونه، پیشنهادات ممنوعیت صید در زمان بیشترین بازگشت شیلاتی و تعدیل ابزار صید (گوشگیر سطح) ارائه می گردد.

کلمات کلیدی: ماهی شیر، الگوی برداشت، حداکثر ثابت برداشت، بازگشت شیلاتی، آبهای ساحلی استان هرمزگان.

* نویسنده مسئول

نیاز روز افزون به تأمین پروتئین غذایی سبب روی آوردن به ذخایر عظیم دریایی و همچنین ابداع روش‌های متنوعی جهت برداشت بیشتر از ذخایر شده است. همین امر باعث گردیده بسیاری از ذخایر آبزیان به طور کامل مورد بهره برداری قرار گرفته به نحوی که در معرض نابودی کامل قرار گیرند.

هر ساله ذخایر عظیمی از ماهیان مهاجر جهت تخم ریزی و تغذیه از منابع غنی ماهیان سطح زی ریز^۱، وارد خلیج فارس و دریای عمان می‌گردند. تون ماهیان^۲ و شیر ماهیان^۳ از گونه‌های مهم ماهیان مهاجر به خلیج فارس و دریای عمان می‌باشند. از مهم ترین گونه‌های این ماهیان می‌توان به هوور (Thunnus tonggol)، زرده (Euthynnus affinis)، تون منقوش (Auxis thazard)، گیدر (T. albacares)، گیدر (Katsuwonus pelamis)، قباد (Scomberomorus guttatus) و شیر (S. commerson) اشاره نمود.^(۴)

میزان صید گونه‌های اصلی ماهیان سطح زی درشت در استان هرمزگان طی سال ۱۳۸۶ بالغ بر ۴۶۶۲۶ تن گردید. ماهی شیر یکی از گونه‌های مهم ماهیان سطح زی درشت محسوب می‌گردد، که در سال یاد شده با ۵۹۱۲ تن در حدود ۱۳ درصد از صید این ماهیان را به خود اختصاص داده است.^(۲)

در استان هرمزگان اصلی ترین روش صید این ماهی استفاده از تورگوشگیر سطحی است. تورگوشگیر شناور از دیرباز در خلیج فارس و دریای عمان به کار گرفته می‌شود و به مرور زمان اندازه چشمehا و یا ضخامت آن دچار تغییراتی شده است. البته این تغییرات بیشتر به صورت تجربی بوده و به تدریج بین صیادان سنتی گسترش پیدا کرده است.^(۵) در دوره ده ساله ۱۳۸۵ – ۱۳۷۶ متوسط صید شیر در آب‌های جنوب کشور ۶۴۸۱ تن بوده است.^(۳) در طی دوره مذکور استان هرمزگان با متوسط صید ۲۴۸۴ تن، حدود ۳۸ درصد از صید ماهی شیر در آب‌های جنوب کشور را به خود اختصاص داده است.^(۳) مطالعات گوناگونی در خصوص بازگشت شیلاتی ماهی شیر در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان صورت گرفته به طوری که سن بازگشت شیلاتی در آب‌های دریای عمان و خلیج فارس (حوزه عربستان) ۰/۲۵ سال (۳ ماه) و در حدود طول چنگالی ۴۸ سانتی متر گزارش شده است.^(۶)

در مطالعه‌ای در آب‌های دریای عمان، چنین نتیجه گیری شده است که بازگشت شیلاتی درسن کمتر از یک سال^(۷) صورت می‌گیرد.^(۱۱) در آبهای جنوبی خلیج فارس بیش از ۹۴٪ از ماهیان شیر از نظر فراوانی در کمتر از اندازه اولین بلوغ جنسی صید می‌شوند.^(۱۰) در دریای عرب حدود ۴۰٪ از میزان صید قبل از مرحله یک باروری انجام می‌شود در صورتی که در طول سواحل کشور عمان ۲۵٪ از ماهیان قبل از شروع فعالیت تولید مثلی، صید می‌گردند.^(۸) با توجه به این که صید باید شامل بهره برداری از کل توده مهاجر به منطقه باشد و بنا به عبارتی،

1. Small pelagic fishes

2. Tuna fish

3. Seer fish


بایستی سیاست بهره برداری را براساس بهره برداری پایدار قرار داد، ضرورت داشتن اطلاعات ساختار جمعیتی نظری پیراستجه های رشد، مرگ و میر، الگوی برداشت و بازسازی شیلاتی جهت برداشت پویا از ذخیره، بیش از پیش احساس می شود.

مطالعات متفاوتی در خصوص پیراستجه های فوق در آب های افیانوس هند صورت گرفته است به طوری که در مطالعاتی مقادیر (K، L) در آب های دریای عمان (۱۱)، حوزه امارات متحده عربی (۱۰) و کوئینزلند استرالیا (۲۲) به ترتیب (۱۴۶/۴، ۱۳۸/۶، ۰/۲۱۶، ۰/۲۵) و (۰/۲، ۰/۲) محاسبه شده اند. در مطالعه دیگری میانگین سن بازگشت شیلاتی در آب های عمان و عربستان ۰/۲۵ سال (۳ ماه) و در حدود طول چنگالی ۴۸ سانتی متر گزارش شده است (۶).

۲ - مواد و روش ها

۲-۱- منطقه و روش نمونه برداری

در این تحقیق، محدوده آب های استان هرمزگان از بندر جواد الائمه در منتهی الیه غرب استان (طول جغرافیایی ۵۸،۳۰ درجه شرقی) تا بندر گابریک در منتهی الیه شرق استان (طول جغرافیایی ۵۳،۰۱ درجه شرقی) مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور سه منطقه عمده تخلیه صید بندرلنگه، بندرعباس و جاسک به ترتیب در غرب، مرکز و شرق استان جهت نمونه برداری انتخاب گردیدند (شکل ۱). تخلیه گاه بندرعباس شامل صید گاه های قشم و هرمز، تخلیه گاه بندرلنگه شامل صید گاه های بنادر جواد الائمه، بستانه، کنگ و تخلیه گاه جاسک شامل صید گاه های سیریک و گابریک می گردید. عملیات نمونه برداری از فروردین لغایت اسفند ماه ۱۳۸۶ به مدت ۱۲ ماه از مناطق تخلیه صید در بنادر استان صورت پذیرفت. کلیه مناطق مذکور بطور ماهانه بررسی و ماهیان شیر صید شده توسط شناورهای صیادی با روش های مختلف صید (درحال حاضر صید عمده و اختصاصی ماهی شیر در استان هرمزگان با استفاده از تور گوشگیر سطحی و مقادیری نیز به وسیله قلاب صورت می گیرد که اندازه چشمی تورهای گوشگیرایی ۱۲۹/۵ سانتی متر به صورت کشیده می باشد)، به روش تصادفی ساده از نظر طول چنگالی (F.L) با دقت ۱ سانتی متر و برخی نیز همزمان از لحاظ وزنی با دقت ۱ گرم زیست سنجی شده و اطلاعات حاصله در فرم های مخصوص ثبت شد.



شکل ۱. موقعیت تخلیه گاه های مورد بررسی ماهی شیر در آب های استان هرمزگان (۱۳۸۶)

۲-۲- تعیین پیراسنجه های رشد L^∞ و K

از آنجا که محاسبه حداکثر ثابت برداشت نیاز به محاسبه مرگ و میر طبیعی دارد و از طرفی در برآورده مرگ و میر طبیعی باید پیراسنجه های رشد تعیین شده باشند لذا در ابتدا پیراسنجه های رشد مورد محاسبه قرار گرفتند. در انجام محاسبات پیراسنجه های رشد و مرگ و میر طبیعی از نرم افزار FiSAT استفاده گردید. به همین منظور اطلاعات طولی بدست آمده در فواصل طبقاتی ۳ سانتی متری، به صورت ماهانه در نرم افزار یاد شده وارد گردید. اطلاعات وارد شده جهت به حداقل رساندن خطای بررسی صاف گردید. نظر به اینکه رشد آبزیان گرمسیری دارای نوسانات شدید فصلی نمی باشد لذا از رشد غیر فصلی و معادله رشد ون بر تالانفی استفاده شد(۱۶).

$$L_t = L^\infty \left(1 - e^{-K(t-t_0)}\right) \quad \text{معادله رشد ون بر تالانفی}$$

L_t : طول آبزی در سن t (سانتی متر)، L^∞ : طول مجانب در نمودار رشد (سانتی متر)، K : ضریب رشد (در سال)، t_0 : سن فرضی در زمانی که طول ماهی صفر باشد، t : سن (سال)

جهت برآورده مقدار L^∞ از زیر برنامه پشتیبانی^۱ در برنامه نرم افزاری FiSAT استفاده و این مقدار با سطح اطمینان ۹۵٪ مورد محاسبه قرار گرفت.

1. Support

در برآورده مقدار K از روش شفرد^۱ استفاده گردید. در این روش حداکثر امتیاز تعلق گرفته به مناسب ترین ضریب رشد، ۱ می باشد. از آزمون $\hat{\phi} = \log(K) + 2 \times \log(L^{\infty})$ برای مقایسه نتایج حاصله از مقادیر L^{∞} و K این تحقیق با سایر مطالعات در خصوص رشد ماهی شیر استفاده شد (۱۵).

۲-۳ - تعیین مقدار t_0

در محاسبه t_0 از الگوی ارائه شده زیر استفاده شد (۱۵):

$$\log(-t_0) = -0.3922 - 0.2752 \log(L^{\infty}) - 1.038 \log(K)$$

۴-۴ - تعیین مرگ و میر طبیعی (M)

در محاسبه مرگ و میر طبیعی از مدل ارائه شده توسط پائولی استفاده شد (۲۲) :

$$\log(M) = -0.0066 - 0.279 \log(L^{\infty}) + 0.6543 \log(K) + 0.4634 \log(T)$$

M : مرگ و میر طبیعی (برسال 1/year) و T : میانگین سالانه درجه حرارت محیط می باشد که از میانگین سالانه درجه حرارت سطحی آب برای سطح زیان در استان هرمزگان (27°C) برای محاسبه آن استفاده شده است (۱).

از آنجا که ماهی شیر یک آبزی با زندگی گله ای و دسته جمعی است، بسیاری از محققین مقدار به دست آمده از این شاخص را در ۰/۸ ضرب می کنند (۲۲). در این بررسی از روش یاد شده استفاده گردید.

۵-۵ - تعیین حداکثر ثابت بهره برداری (MCY)

حداکثر ثابت بهره برداری، در واقع بیشترین میزان صیدی است که برداشت آن لطمہ ای به ذخیره وارد نکرده و میزان ذخیره پایدار باقی می ماند. برای تعیین این مقدار از رابطه زیر استفاده می شود (۲۱) :

$$MCY = cY_{av}$$

که در آن:

c ، میانگین صید در طول زمان لازم (در این بررسی میانگین صید ۱۰ ساله در نظر گرفته شد).

c ، بیانگر تغییرات محیطی (تعريف شده شاخصی وابسته به مرگ و میر طبیعی بوده و با به دست آوردن مقدار مرگ و میر طبیعی می توان آن را از جدول ذیل بدست آورد).

^۱.Shepherds method

جدول ۱. رابطه بین مرگ و میر طبیعی و میزان ضریب c

مرگ و میر طبیعی (y^{-1})	مقدار c
< ۰/۰۵	۱
۰/۰۵-۰/۱۵	۰/۹
۰/۱۶-۰/۲۵	۰/۸
۰/۲۶-۰/۳۵	۰/۷
> ۰/۳۵	۰/۶

۶- تعیین رابطه طول چنگالی - وزن
رابطه طول چنگالی - وزن یک رابطه توانی بوده و لذا برای بررسی تغییرات میانگین طول در ارتباط با وزن ، از معادله ذیل استفاده گردید : (۷)

$$W = a \cdot FL^b$$

: مقدار توان (شیب خط در رابطه خطی) b : طول چنگالی (سانتی متر)، FL : ضریب ثابت، a : وزن آبزی (گرم)، W :

، مقدار b در واقع برای تشخیص نوع رشد ماهی است بدین معنی که اگر این مقدار با عدد ۳ به عنوان معیار رشد استاندارد تفاوت داشته باشد، رشد آبزی ناهمگون^۱ و در صورتی که تفاوتی نداشته باشد، رشد آبزی همگون^۲ است (۲۲). جهت انجام این مقایسه از آزمون t-student استفاده شد.

۷- تعیین الگوی برداشت
الگوی برداشت، وضعیت بهره برداری آبزی را بر اساس فراوانی های طولی و یا وزنی نشان می دهد. بنا به عبارتی با این روش می توان پی بردن که چه درصد از آبزیان و یا چه مقدار وزنی از آنها در اندازه های کمتر از اولین طول بلوغ مورد بهره برداری قرار گرفته وصید می شوند. برای تعیین این الگو ابتدا منحنی ارتباط فراوانی نسبی تجمعی تعداد یا وزن (از رابطه طول - وزن) با کلاس های طولی رسم وسپس با در اختیار داشتن اندازه ماهی در اولین بلوغ (LM₅₀)، درصد فراوانی طولی و یا وزنی ماهیان کمتر از اندازه یاد شده بدست می آید. این الگو با استفاده از برنامه نرم افزاری Excel 2003 رسم شد.


۸- تعیین الگوی بازسازی شیلاتی

با استفاده از داده های فراوانی طولی در زیر برنامه ارزیابی نرم افزار FiSAT، تعداد نوسان های الگوی بازسازی و توان نسبی آنها بررسی و تعیین شد. لازم به توضیح است در تعیین الگوی برداشت و زمان بازگشت شیلاتی از طول ۷۴/۲ سانتی متردر اولین بلوغ جنسی و اوچ رسیدگی جنسی در خرداد ماه محاسبه شده در آبهای استان هرمزگان استفاده شد (۴) .

۳ - نتایج

۱ - فراوانی طولی

همان گونه که گفته شد اطلاعات طولی به دست آمده در کلاس های طولی ۳ سانتی متری دسته بندی شدند. در مجموع تعداد ۴۵۱۵ عدد ماهی مورد زیست سنجی طول چنگالی قرار گرفتند که در برخی نمونه ها همزمان طول کل نیز مورد اندازه گیری قرار گرفت. بر این اساس کوچک ترین و بزرگ ترین ماهیان اندازه گیری شده به ترتیب در کلاس های طولی چنگالی ۲۳-۲۰ و ۱۴۰-۱۳۷ سانتی متر قرار داشتند. بیشترین فراوانی در کلاس های طولی ۴۷-۵۰ و ۸۰-۸۷ سانتی متر به ترتیب با ۲۹۹ (٪۶/۵) و ۳۲۰ (٪۷) عدد بود (شکل ۲). میانگین فراوانی های طولی در زمان بررسی ۷۴ سانتی متر به دست آمد و میانگین های طولی ماهانه تفاوت معنی داری را نشان دادند ($P<0.05$).



شکل ۲ . توزیع فراوانی طول چنگالی ماهی شیردرآب های استان هرمزگان (۱۳۸۶)

1.Allometric

2.Isometric


۲-۳ - پیراسنجه های رشد L_{∞} و K

مقدار ∞L با استفاده از روش یاد شده و با سطح اطمینان ۹۵٪ برابر با $150/24$ سانتی متر برآورد گردید.

بر اساس مقدار ∞L تعیین شده، مناسب ترین ضریب رشد (K) بر مبنای امتیاز دهی و با حداقل امتیاز تعلق گرفته ۱، برابر با $0/66$ در سال محاسبه شد. منحنی حاصل از معادله رشد بر تالانفی پیروی می کند (شکل ۳).

۳-۳ - مقدار t_0

محاسبه t_0 طبق مدل ارائه شده و با استفاده از پیراسنجه های رشد به دست آمد $7/15$ - سال محاسبه گردید.



شکل ۳. منحنی رشد گروه های مختلف طولی ماهی شیر درآب های استان هرمزگان (۱۳۸۶)

۴-۴ - مرگ و میر طبیعی M

مقدار مرگ و میر طبیعی با استفاده از جایگزینی مقادیر پیراسنجه های رشد به دست آمده و میانگین حرارت سطحی 27 درجه سانتی گراد محیط آب برابر با $67/0$ در سال (ضرب شده در $8/0$) به دست آمد.


۵-۵ - حداقل ثابت بهره برداری

با توجه به میزان مرگ و میر طبیعی ($M = 67/0$) مقدار C بر اساس جدول ۱، برابر با $0/6$ در نظر گرفته شد. از آن جایی که متوسط صید سالانه ماهی شیر در طی یک دوره ده ساله ($1385-1376$) برابر با 2484 تن محاسبه شده، لذا حداقل ثابت بهره برداری 1490 تن محاسبه گردید.

۶-۶ - رابطه طول چنگالی - وزن

با استفاده از اطلاعات طول چنگالی و وزن 599 عدد ماهی شیر، مقادیر a و b حاصل از رابطه توانی بین این دو متغیر ($W = a \cdot F L^b$) به ترتیب برابر با $-10 \times 1/86$ و $2/87$ محاسبه گردیدند (شکل ۴).


آزمون T تفاوت معنی داری را در مقدار به دست آمده b با عدد ۳ نشان نداد که این نتیجه نمایانگر رشد همگون در ماهی شیرمی باشد.




شکل ۴. منحنی رابطه طول چنگالی با وزن ماهی شیر در آب های استان هرمزگان (۱۳۸۶)

۷-۳ - الگوی برداشت

با در نظر گرفتن اندازه $74/2$ سانتی متر طول چنگالی در اولین بلوغ جنسی و رابطه طول چنگالی با وزن ماهی شیر، حدود $49/38$ درصد از ماهیان صیدشده در سال ۱۳۸۶ در استان، از لحاظ فراوانی (شکل ۵) و حدود $19/35$ درصد از لحاظ وزنی، شامل ماهیان نابالغ بودند (شکل ۶).




شکل ۵. الگوی برداشت طولی ماهی شیردرآب های استان هرمزگان (۱۳۸۶)



شکل ۶. الگوی برداشت وزنی ماهی شیر درآب های استان هرمزگان (۱۳۸۶)

۸-۳ - الگوی بازسازی شیلاتی

طبق شکل ۷ بیشترین درصد بازگشت شیلاتی با قابلیت صید در مهرماه وجود دارد و با توجه به اوج رسیدگی جنسی در خرداد ماه، سن احیاء ماهی شیر ۰/۳ سال (۴ ماه) با طول چنگالی تقریبی ۴۰ سانتی متر (با استفاده از پیراسنجه های رشد) به دست آمد.



شکل ۷. نمودار بازگشت شیلاتی ماهی شیر در آب های استان هرمزگان (۱۳۸۶)

۴ - بحث

در برآورد پیراسنجه های رشد باید دقت کرد که زیست سنじ از تعداد زیادی نمونه کوچک بهتر از چند نمونه بزرگ است و همچنین اگر تعداد نمونه ها به صورت سالانه بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ عدد و ماهانه بین ۵۰ تا ۱۵۰ عدد باشد بسیار مناسب است (۱۱). اگر نمونه خیلی کوچک باشد ممکن است بیانگر جمعیت نباشد و نتایج حاصل از این نمونه گمراه کننده باشد (۲۲). در این بررسی به علت نمونه گیری از ابزار مختلف صید گونه شیرماهی، به طور متوسط ماهانه ۳۷۰ عدد ماهی مورد زیست سنじ قرار گرفته که از لحاظ کمی مناسب به نظرمی رسد.

در این تحقیق پیراسنجه های رشد L_{∞} و مقدار t_0 به ترتیب $150/24$ سانتی متر، $0/66$ در سال و $0/157$ - به دست آمدند که از آن مقدار Φ برابر با $4/1$ محاسبه شد. مقادیر (L_{∞}, K) در آب های دریای عمان (۱۲)، حوزه امارات متحده عربی (۱۰) و کوئینزلند استرالیا (۲۲) به ترتیب $(146/4, 141/25)$ ، $(138/6, 141/21)$ و $(0/216, 0/25)$ محاسبه شده اند.

پیلای^۱ و همکاران (۲۲) معتقدند، تفاوت در تخمین پیراسنجه های رشد مختلف در مطالعات گوناگون، شاید به آن علت باشد که اطلاعات جمع آوری شده در هر منطقه، از ابزار متفاوتی به دست آمده و یا از روش های مختلفی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است.

در خصوص تفاوت در برآوردهای پیراستجه های رشد، صرف نظر از آن که بکارگیری روش های متفاوت، سبب اختلافاتی در محاسبات آن می گردد، اما تفاوت در شاخص های رشد تا حد زیادی به کلاس های طولی اندازه گیری شده بستگی دارد (۹). پیراستجه های رشد بدست آمده در این پژوهش با سایر مطالعات انجام شده مشابهت فراوانی دارد این موضوع با در نظر گرفتن آن که Φ های بدست آمده دارای اختلاف کمی می باشند، بیشتر نمود پیدا می کند. اسپار^۱ و ناما^۲ (۲۰) بیان می دارند که گونه های یکسان در مناطق مختلف، از عملکرد رشد یکسانی برخوردارند یعنی دارای Φ های مشابهی هستند. میزان این مشابهت تا حدی بیانگر صحبت برآوردهای پیراستجه ها است.

مقادیر a و b در این بررسی ($^{21} \times 10^{22}$ و $1/86$) محاسبه شدند. با تعیین مقادیر a و b می توان وزن هرماهی را تعیین کرد و برعکس، به عبارت دیگر این معادله کلید طول - وزن می باشد. بر اساس نظریات بسیاری از محققین مقادیر b در محدوده $4-5/2$ قرار دارند و اگر مقدار یادشده نزدیک به 3 باشد رشد ماهی به صورت همگون خواهد بود (۷). در مورد تون ماهیان ثابت شده است که این گونه ها از رشد همگون برخوردارند. به نظر می رسد برای یک گونه خاص از ماهیان، وزن مخصوص بقایای باقی در تمامی عمر ثابت بوده و لذا در بیشتر حالات مقدار b نزدیک به 3 باشد. این قانون به قانون کعب معروف است. اما باید توجه داشت که به طور معمول، ماهیان شکل بدن خود را در سراسر مدت زمان زندگی حفظ نمی کنند و لذا قانون یادشده می تواند تغییر یابد (۷). در آب های دریای عمان مقدار a برابر با $1/72 \times 10^{-3}$ و مقدار b برابر با $3/31$ محاسبه شده است (۹). دلایل عدمه تفاوت در مقادیر a و b را می توان به عواملی چون تغییرات فصلی، شرایط فیزیولوژیک ماهی در زمان جمع آوری، جنسیت، رشد خدد جنسی و شرایط تغذیه ای محیط ماهیان مرتبط دانست (۷).

نتایج حاصل از بررسی حاضر نشان داد که از لحاظ فراوانی حدود 50 درصد از ماهیان صید شده در استان هرمزگان در اندازه های کمتر از اولین سایز بلوغ جنسی صید می گردد. در آب های جنوبی خلیج فارس بیش از 94% از ماهیان شیر، از نظر فراوانی در کمتر از اندازه اولین بلوغ جنسی صید می شوند (۱۰). در دریای عرب حدود 40% از میزان صید قبل از مرحله یک باروری انجام می شود در صورتی که در طول سواحل کشور عمان 25% از ماهیان قبل از شروع فعالیت تولید مثلی، صید می گردد (۸). این احتمال وجود دارد که قسمتی از صید آب های حوزه کشور عمان را ماهیان جوانی تشکیل دهنده که در همان منطقه به دنیا آمده و قبل از این که مهاجرت خود را به سمت دریای عرب انجام دهند، مورد بهره برداری قرار گیرند (۲۰). باید توجه داشت در الگوی برداشت بر اساس مقدار اولین بلوغ جنسی، درصد ماهیان صید شده در اندازه های کمتر از طول یاد شده تا حد زیادی به محدوده طولی ماهیان اندازه گیری شده بستگی دارد. از این رو اهمیت نمونه گیری از ماهیان صید شده توسط تمامی ابزار صید، بیش از پیش مشخص می گردد که در واقع نتایج حاصله، تصویر واقعی از ماهیان با قابلیت صید را نشان دهند.

میزان حداکثر ثابت بهره برداری در این پژوهش 1490 تن به دست آمد. این درحالی است که میزان صید استان هرمزگان در سال 1386 برابر با 5912 تن برآورده گردیده است (۲). این میزان صید، بیش از 390 درصد، از میزان حداکثر ثابت بهره برداری است. این محاسبات دلیل بر فشار بیش از حد صیادی بر ذخایر این گونه در آب های استان هرمزگان است.

1.Sparre

2.Venema

واضح است که ذخایر ماهی شیر به خاطر سواحل طولانی و مسافت زیاد مهاجرت این ماهی، بین دو یا چند کشور مشترک بوده و از طرفی احتمال کمی وجود دارد که پیرانسجه های جمعیتی درین زیر جمیعت های یک جمعیت واحد بزرگ، اختلاف معنی داری داشته باشند. بنابراین برای اهداف ارزیابی ذخایر می توان زیر ذخیره های شمال شرقی دریای عرب، خلیج عمان و خلیج فارس را تحت یک ذخیره واحد، دسته بندی نمود (۱۹). این به آن معنی است که در واقع در بررسی حاضر جهت کاهش خطا در محاسبات، نمونه برداری در قسمتی از منطقه پراکنش صورت گرفته است.

نسل بازگشت شیلاتی، تعداد جمعیت گروهی همزاد از ماهیان کوچک بوده که در اثر رشد در یک زمان و دوره مشخص وارد مرحله بهره برداری از ذخیره می گردد (۷). در واقع ماهیان جوانی که در ابتدا توسط ابزار صید قابل دسترسی نبودند، در اثر رشد، به طور بالقوه در برای ابزار صید آسیب پذیر می گردند.

ماهیان مناطق گرمسیری به طور معمول در تمامی سال دارای بازگشت شیلاتی هستند (۲۰) اما زمان بیشترین بازگشت شیلاتی و همچنین اندازه این مقدار در مناطق گوناگون متفاوت است. در آب های ساحل غربی سریلانکا ماهیان جوان با طول ۴۵ - ۹ سانتی متر طول چنگالی در طی ماه های ژولای (تیر) تا آگوست (مرداد) صید می شوند، این در حالی است که در آب های امارات متحده عربی اندازه های کمتر از ۲۴ سانتی متر طول چنگالی در ماه سپتامبر (شهریور) مورد بهره برداری قرار می گیرند (۲۰). نسبت بالایی از ماهیان شیردر جنوب غربی سواحل هند، قبل از آنکه به سن بلوغ رسیده و یا بازگشت شیلاتی را به صورت کامل انجام دهنند، صید می شوند (۲۰). میانگین سن بازگشت شیلاتی در آب های عمان و عربستان ۳۰ سال و در حدود طول چنگالی ۴۸ سانتی متر گزارش شده است (۶).

در استان هرمزگان بیشترین درصد بازگشت شیلاتی با قابلیت صید در مهرماه وجود دارد (شکل ۷) از طرفی نتایج این پژوهش، افزایش تعداد ماهیان با طول چنگالی کمتر از ۵۰ سانتی متر را در طی شش ماهه دوم سال نشان داد و به احتمال زیاد این دسته از ماهیان نتیجه تخمگذاری ماهیان شیر در طی فصل تخریزی همان سال بوده اند. بنابراین سن احیاء و یا بازگشت شیلاتی ماهی شیر $\frac{2}{3}$ سال (۴ ماه) با طول چنگالی تقریبی ۴۰ سانتی متر می باشد. از این طول به اندازه طولی تجاری نیزیاد می شود. در بررسی دیگری چنین نتیجه گیری شده که در آب های دریای عمان، بازگشت شیلاتی در سن کمتر از یک سال ($^{+}0$) صورت می گیرد (۱۴). نتایج پژوهش حاضر با یافته مذکور مطابقت دارد.

بازگشت شیلاتی در بسیاری از موارد به وسیله و ابزار صید بستگی دارد. به طور معمول تعدادی از ابزار صید توانایی صید ماهیان ریز و یا ماهیان خیلی بزرگ را ندارند. بنابراین مرگ و میر صیادی که در ارتباط با قابلیت صید مطرح می گردد، در همه گروه های سنی جمعیت ماهیان به یک اندازه نخواهد بود. به منظور پیش بینی میزان صید ممکن، به طور معمول از اطلاعاتی که توان نسل بازگشت شیلاتی را مشخص می سازند، در کنار تجزیه و تحلیل ترکیب گروه های سنی و میزان رشد ماهیان استفاده می شود (۱۴). نتایج این بررسی نشانگر الگوی برداشت نامناسب از ذخایر ماهی شیر در استان هرمزگان است و جهت استحصال پویا از این ذخایر پیشنهاد منوعیت صید در برخی از ماه های سال از جمله زمان بیشترین بازگشت شیلاتی و اوچ رسیدگی جنسی، تعدیل ابزار صید بخصوص ابزار صید گوشگیر سطح بر اساس طول اولین بلوغ جنسی ارائه می گردد.

تشکر و قدردانی

بر خود لازم می دانیم از آقایان دکتر مرتضوی رئیس و مهندس دهقانی معاونت محترم تحقیقاتی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، مهندس ارگنجی رئیس ایستگاه تحقیقات شیلاتی نرم تنان خلیج فارس، دکتر کیمram مدیریت محترم بیولوژی و ارزیابی ذخایر مؤسسه تحقیقات شیلات ایران و همکاران گرانقدر آقایان مهندس سالارپور، بهزادی، کمالی، صفائی، دقوقی، رامشی، رجی ساسی، سید مرادی، قادری شجاعی، مومنی، سبحانی و خواجه نوری که در تمامی مراحل انجام طرح از هیچ گونه زحمتی فروگذار نبودند تشکر و قدردانی نمائیم.

- منابع -

- ۱_ ابراهیمی، م. ۱۳۸۵. مطالعات مستمر هیدرولوژی و هیدروبیولوژی خلیج فارس و تنگه هرمز (آب های محدوده استان هرمزگان). مؤسسه تحقیقات شیلات ایران. ۹۶ صفحه.
- ۲_ افتخارنیا، م.ح. ۱۳۸۷. گزارش آمار صید سال ۱۳۸۶ اداره کل صید شیلات هرمزگان. ۱۵ صفحه.
- ۳_ خورشیدی، ص. « گزارش آمار صید سال های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵ ». اداره کل شیلات هرمزگان.
- ۴_ درویشی، م. ۱۳۸۷. پویایی شناسی و مدیریت صید ماهی شیر در آبهای استان هرمزگان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس. ۱۱۱ صفحه.
- ۵_ کیمram، ف.، ۱۳۷۹. پویایی شناسی و مدیریت جمعیت تون زردباله *Thunnus albacares* دریای عمان. رساله دکتری. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات تهران. ۱۲۵ صفحه.

- 6-Bertignac M., and Yesaki M., 1993. Preliminary assessemnt of the narrow Spanish mackerel stock off Oman using catch at age data from length frequency distributions by Bhattacharya method. Proceeding of the fifth expert consultation on Indian Ocean Tunas. Mahe, Seychelles p88-94.(4)
- 7_Biswas, S.P., 1993. Manual of methods in fish biology, South Asian Publishers. P.157.
- 8_Claereboudt. M.R., McIlwain, J.L., Al-Oufi, H.S., and Ambu-Ali, A.A. 2005. Patterns of reproduction and spawning of the kingfish (*Scomberomorus commerson*, Lacepede) in the coastal waters of the Sultanate of Oman. Department of Marine Science and Fisheries, College of Agricultural and Marine Sciences . Fisheries Research No,73 273–282.
- 9_Dudley , R. G., Aghanashinikar, A. P., and Brothers , E. B., 1992. Management of the Indo-Pacific Spanish mackerel (*Scomberomorus commerson*) in Oman. Fisheries Research, 15: 17-43.
- 10_Grandcourt, E., Al Abdessalaam T. Z., Francis, F., Al Shamsi, A. T., and Suwaidi,, S. Al Ali, K. Al .2005. Assessment of the fishery for Kingfish (Kanaad/Khabat), *Scomberomorus commerson*, in the waters off Abu Dhabi Emirate. (Project no. 02-23-0008-05) Marine Environmental Research Centre. United Arab Emirate.
- 11_Gulland, J.A.,and Rosrnberg, A.A.,1992. A review of length-based approaches to assessing fish stock. FAO Fisheries Technical.Paper No.323,100pp
- 12_McIlwain, J.L., Claereboudt, M.R., Al-Oufi, H.S., and Goddard, J.S., 2005. Spatial pattern in age and growth of the kingfish *Scomberomorus commerson* from coastal waters in the Sultanate of Oman. Fish. Res. 73, .283–298.
- 13_Nikolskii. G. V.,1963. Ecology of Fishes. Academic Press,London. Pp.352.

- 14_Pauly, D., 1980. On the interrelationships between natural mortality, growth parameters, and mean environmental temperature in 175 fish stocks. Journal Du Conseil International Pour L'Exploration De La Mer 39(2): 175-192.
- 15_Pauly,D.,1983.Some simple methods for the assessment of tropical fish stocks.FAO.Fish.Tech.Pap.55P.
- 16_Pauly D., and Munro J. 1984. Once more on the comparision of growth in fish and invertebrates, Fishbyte. 2,21.
- 17_Pauly, D., and Morgan, G. R.1987. Length-based methods in fisheries research. ICLARM Conf. Proc. 13, 468 p.
- 18_Pillai P.P., and Pillai, N.G., Sathianandan, K T.V., and Kesavan Elaythu, M.N.K., 1993. Fishery Biology and stock assessment of *Scomberomorus commerson* (lacepede) from the South_West Coast of India .IPTP Collective Volumes .No.8. P: 56-61.
- 19_Siddeek M. S., 1995.Review of fisheries biology of *Scomberomorus* and *Acanthocybium* species in the western Indian Ocean (FAO, Area 51). WGP 95/2. 32 p.
- 20_Sparre, P., and Venema, S.C. 1992. Introduction to tropical fish Stock assessment. Part 1- Manual, 375., FAO Rome. ITALY.
- 21-Sumpton, W.D., and M.F. O'Neil ,2004. Monitoring Requirement for the Management of Spanish Mackerel (*Scomberomorus commerson*) in Queensland. Sohthern Fisheries Centre Deception Bay. QI04026.34pp.
- 22_Welch, D. J., Hoyle, S. D., McPherson, G. R., and Gribble, N. A., 2002. Preliminary assessment of the Queensland east coast Spanish mackerel fishery. Information Series QI02110, Queensland Government, Department of Primary Industries, Cairns.

Fishing pattern , Maximum Constant Yield (MCY) and Recruitment pattern of *Scomberomorus commerson* in Hormozgan Province Waters

Mhdar2001@yahoo.com

Darvishi M.*⁽¹⁾ ; Kamrani E.⁽²⁾ ; Taherizadeh M. R.⁽³⁾

1 – M.Sc. Islamic Azad University , Bandar Abbas Branch . P.Box : 79159 – 1311

2 - Hormuzgan University , Fishery and marine biology Depth . P.Box : 3995

3 – Persian Gulf and Oman Sea Ecological Institute . P.Box : 79145 – 1597

Abstract :

Scomberomorus commerson is one of the most important large pelagic fish species in Hormozgan Province. Nominal catch of *S.commerson* in 2007 was 5912 tonnes or 13% of total catch of large pelagic fishes . There was need to identify fishing pattern, maximum constant yield and recruitment pattern in order to exploitation of sustainable from stocks of *S.commerson* . So length and weight data were collected randomly from 3 major commercial fish-landing sites; Bandar Lengeh, Bandar Abbas and Bandar Jask in Hormozgan Province, 12 months from the beginning of April 2007. Growth parameters K and L_{∞} estimated 0.66 (1/year) and 150.24 cm respectively, so natural mortality calculated 0.67 (1/year) and therefore maximum constant yield computed 1490 tonnes. Length-weight power relationship , $W= aFL^b$, was $W= 1.86E-02FL^{2.87}$ that showed *S.commerson* have isometric growth. Fishing pattern indicated that almost 50% of catch were under the size at first maturity. Maximum of recruitment pattern was in Mehr (October) with average fork length of 40 cm. For optimum exploitation from *S.commerson* stocks ,two approaches are: Fishing forbidden in maximum recruitment time and gear (drift gillnet) modification .

Keywords : *Scomberomorus commerson*, Fishing pattern, Maximum Constant Yield, Recruitment pattern, Hormozgan Province

* Corresponding author