

## موفقیت تولید مثلی و نرخ بقای روزانه باکلان بزرگ (*Phalacrocorax Carbo*) در کلنی تالاب بین المللی امیرکلایه

راضیه رحیمی<sup>۱</sup>

[r-rahimi@iau-arak.ac.ir](mailto:r-rahimi@iau-arak.ac.ir)

مسعود منوری<sup>۱</sup>

محمد کرمی<sup>۲</sup>

تاریخ پذیرش: ۹۱/۴/۱۰

تاریخ دریافت: ۹۰/۱۲/۱۵

### چکیده

**زمینه و هدف:** باکلان بزرگ پرنده‌ای وابسته به بوم سامانه‌های آبی می‌باشد. این پرنده از نظر بوم‌شناسی در بالای زنجیره غذایی قرار دارد و می‌تواند به طور ویژه‌ای نشان دهنده از بین رفتن زیستگاه و آلوگی محیط و دیگر فعالیت‌های انسان اثرگذار بر محیط‌زیست باشد. در این مطالعه فعالیت‌های تولید مثلی باکلان بزرگ در طی سال ۱۳۸۸ از اوایل فروردین تا اواخر تیر در تالاب بین المللی امیرکلایه در سواحل جنوبی دریای خزر مورد بررسی قرار گرفت.

**روش بررسی:** در این مطالعه زیست‌شناسی جوجه آوری، تعیین موفقیت تولید مثلی و نرخ بقای روزانه به روش می‌فیلد انجام شد. برای آگاهی از این که چه تغییراتی در موفقیت جوجه آوری اتفاق می‌افتد، باید موفقیت جوجه آوری در واحدهای زمان محاسبه گردد. مثلاً تعداد تخم‌های که روی آن‌ها خوابیده شده، نسبت تخم‌های هچ‌شده و نسبت آشیانه‌های خراب شده و تعداد جوجه‌های مرده باید مورد پایش قرار گیرند.

**یافته‌ها:** داده‌های مربوط به تعداد دسته تخم‌ها در هر آشیانه (Clutch size) (جمع آوری شده میانگین دسته تخم  $2/88 \pm 0/7$ ) تخم را برای هر آشیانه نشان داد. براساس این روش نرخ بقای روزانه آشیانه‌ها ای باکلان بزرگ در طی دوره تخم  $98/3\%$  و در مرحله آشیانه نشینی و پس آشیانه نشینی به ترتیب  $99/4\%$  و  $100\%$  بدست امد. در کل، میزان موفقیت تولید مثلی در این سال  $56/4\%$  برآورد شد.

**نتیجه گیری:** نتایج نشان می‌دهد که در طی دوره‌ای که جوجه‌ها قادر به ترک لانه بودند هیچ‌گونه تلفاتی وجود نداشت. مشاهده‌ها نشان داد که عوامل اقیمه‌مانند بازارش ناگهانی مرحله‌ای که جوجه‌ها ساز تخم بیرون نیاورده‌اند بیشترین تاثیر را دارد و میزان تلفات جوجه‌ها در این مرحله  $30/6\%$  بوده است، لذا جوجه‌ها در این زمان از حساسیت زیادی برخوردارند بنابراین برای مدیریت و حفاظت از این پرنده در زمان جوجه‌آوری، کاهش تهدیدهای در دوران قبل از تفريح تخم‌ها می‌تواند موثر باشد. براساس نتایج این مطالعه نیاز به اقدام‌های بهبود مدیریت جهت حفاظت کلنی باکلان بزرگ در تالاب امیرکلایه در زمان جوجه‌آوری وجود دارد.

**واژه‌های کلیدی:** باکلان بزرگ، نرخ بقای روزانه، روش می‌فیلد، موفقیت تولید مثلی، کلنی تالاب امیرکلایه.

۱- استادیار گروه محیط‌زیست، دانشکده محیط‌زیست و انسان‌پژوهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران\* (مسئول مکاتبات)

۲- استاد گروه محیط‌زیست، دانشکده محیط‌زیست و انسان‌پژوهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

## Breeding success and daily survival rate of the Great Cormorant (*Phalacrocorax carbo sinensis*) in Amirkelayeh International Wetland, Iran

Razeih Rahimi<sup>1</sup>

[azadrahimi58@gmail.com](mailto:azadrahimi58@gmail.com)

Masoud Monavari<sup>1</sup>

Mahmoud Karami<sup>2</sup>

### Abstract

**Background and Objective:** Great cormorant is dependent on aquatic ecosystems. The breeding success and daily survival rate of the Great Cormorant *Phalacrocorax carbo sienensis* (early April until late of July) was studied in 2009 in a colony at Amirkelayeh international wetland, south of the Caspian Sea, Iran.

**Method:** In this study, Mayfield method was used to estimate nest survival during incubation and nestling and post-nestling stages.

**Findings:** The mean of clutch size was  $2.88 \pm 0.8$  eggs in each nest. Based on this method, daily survival rate nests in incubation period was 98.3%, in nestling and post-nestling were 99.4% and 100% respectively. The overall breeding success was 56.4%.

**Discussion and Conclusion:** Results of this study showed there were higher stages of chick rearing than the incubation period and no losses occurred in fledged chicks. Some climatic factors such as high wind and prolonged rain had more impacts and losses in incubation period (30.7%). In other hand, chicks are more sensitive in nestling stage. Results suggest that Amirkelayeh colony site needs more improvement mitigation for better conservation of the cormorant colony in breeding period.

**Keywords:** Great Cormorant, *Phalacrocorax carbo sinensis*, Daily Survival Rate ,Amirkelayeh Wetland, Breeding success, Mayfield method

---

1 - Assistant Professor , Department of Environment and Energy, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. \* (Corresponding Author)

2- Professor , Department of Environment and Energy, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

## مقدمه

حفظ از تنوع زیستی نیازمند حفاظت از شرایط زیستگاه-های زادآوری گون هاست. حفاظت از زیستگاه ها سلامت بوم سامانه هاراضمین می کندوازهمیت ویژه ای برخوردار است. مطالعه‌ها نشان می دهد که پرندگان آبری نقش اصلی را در چرخه غذایی دریایی دارند (۱). آگاهی از نیازهای زیستگاهی گونه و تغییرات جمعیتی آن اجازه می دهد تا عکس العمل مناسب نسبت به تغییرات زیستگاهی از طریق مدیریت سرمیں اعمال شود (۲).

زیستگاه قسمتی از محیط است که یک جامعه یا گونه های خاصی در آن زیست می کنند. بنابراین، در هر زیستگاه گونهای خاص که به شرایط اقلیمی و موقعت جغرافیایی آن زیستگاه سازگار گشته است، می تواند زندگی نماید (۳). در پرندگان، تولید مثل به صورت سالانه و فصلی و بالیجاد شرایط مناسب و فراوانی غذا رخ می دهد (۴). حساسیت پرندگان به تغییرات محیطی در دوره جوجه‌آوری به اوج خود می‌رسد. پرندگانی مثل باکلان‌ها که صیادبوده و در بالای زنجیره غذایی بوم سامانه های آبی قرار دارند، آن‌هارابه تغییرات محیطی حساس کرده است و این امر موفقیت زادآوری را به طرق مختلف ممکن است تحت- تاثیر قرار دهد بنابراین نظارت و مطالعه موفقیت زادآوری می تواند به عنوان یک وسیله برای بررسی تغییرات در کیفیت بوم سامانه های آبی مورد استفاده قرار گیرد (۵).

نقش پرندگان آبزی مانند باکلان که وابسته به بوم سامانه های دریایی هستند، از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. برآوردهای اخیر پیشنهاد می کند که انرژی برداشت شده از اکوسیستم های دریایی توسط پرندگان آبزی مهم است و در نواحی مجاور کلندی های این پرندگان اهمیت بیشتری می یابد (۶).

باکلان بزرگ با توجه به جمعیت زیاد و پراکنش گسترده به عنوان یکی از صیادان دریایی از مهمترین شکارگران ماهی ها به شمار می‌رود و عمدها از طریق غواصی تغذیه می کنند. آن‌ها اغلب در تقابل با منافع اقتصادی جوامع انسانی قرار می گیرند (۷،۸). مکان گزینی باکلانهای بزرگ عمدها به صورت کلندی می باشد که در رابطه با نحوه تغذیه آن‌ها انتخاب می‌شود (۹).

## مواد و روش ها

محدوده موردمطالعه:

تالاب امیرکلایه در طول جغرافیایی ۱۲ و ۵۰ دقیقه طول شرقی و ۳۷ درجه و ۱۷ دقیقه عرض شمالی در حدود ۱۰ کیلومتری شمال شهر لاهیجان، در استان گیلان و در دشت‌های ساحلی جنوب دریای خزر واقع شده است. این تالاب از شمال به روستای سحرخیز وحسن بکنده، از جنوب به روستاهای تی پریزاد و بالا محله حسن علیده، از غرب به

باکلان‌ها زرسته پلیکان شکلان محسوب می شوند که پرندگانی بزرگ با نزو ماده هم شکل می‌باشند (۱۰). این پرنده شامل ۳۷ گونه در یک جنس *Phalacrocorax* می‌باشند (۱۱). نیوسان و همکارانش در سال ۲۰۰۴ دو زیرگونه با نام‌های *carbo* و *Phalacrocorax carb sinensis* برای گونه باکلان بزرگ اعلام کردند (۸). زیر گونه باکلان چینی *Phalacrocorax carbo sinensis* پرنده مورد مطالعه در این بررسی می‌باشد. این پرنده در تمام ایران پراکنش دارد اما فقط در کرانه های ساحلی دریای خزر (تالاب عباس آباد، تالاب امیرکلایه و فرودگاه رامسر) جوجه‌آوری می کند (۱۲).

روش‌های مختلف از جمله جستجوی سیستماتیک (Time-to-failure) و آنالیز زمان تاشکست (Systematic) و می‌فیلد (Mayfield) برای برآورد بقای آشیانه‌ها و موفقیت جوجه‌آوری وجود دارد. روش می‌فیلد ساده‌ترین و ارزیابی‌گری کمتری برخوردار است. این روش نرخ بقای روزانه را از تقسیم تعداد کل آشیانه‌های ناموفق بر تعادل روزهایی که آشیانه‌ها سالم بودند بدست می آورد (۱۳). در ایران از روش می‌فیلد تنها برای محاسبه موفقیت جوجه‌آوری گونه باکلان بزرگ در فرودگاه رامسر روزگار بور در منطقه توران استفاده شده است. از این رو در این مطالعه موفقیت جوجه‌آوری باکلان بزرگ به روش می‌فیلد در تالاب امیرکلایه (به عنوان یکی از سه زیستگاه جوجه‌آوری) در ساحل جنوبی دریای خزر در استان گیلان، شهرستان لاهیجان مورد بررسی قرار گرفته است.

از طریق قایق موتوری و یا قایق پارویی انجام شد. به علت این که درختان در داخل آب بودند امکان استفاده از نردهای نبود. لذا با توجه به متوسط ارتفاع ۱/۵ متری درختان برای مشاهده آشیانه‌ها از یک چوب بلند که سر آن یک آینه نصب شده بود، استفاده شد. به منظور به حداقل رسیدن مزاحمت برای کلنی‌ها، مشاهدات باید از فاصله حداقل ۱۰۰ متری و به کمک تلسکوپ انجام می‌گیرد (۱۷,۵).

برای آگاهی از اینکه چه تغییراتی در موفقیت جوجه‌آوری اتفاق می‌افتد، باید موفقیت جوجه‌آوری در واحدهای زمان محاسبه گردد (۱۸). دوره‌ی زمانی (به روز) برای هر آشیانه از زمان شروع بررسی آشیانه‌ها، تا زمانی که آشیانه دیگر توسط والدین مراقبت نمی‌شدند و یا تخریب گردیدند و یا زمان پرواز جوجه‌ها از آشیانه، در نظر گرفته شد. به طور معمول روش می‌فیلد برای برآورد دقیق موفقیت آشیانه یا احتمال اینکه هر تلاش برای ایجاد آشیانه منجر به پرواز حداقل یک نابالغ از آشیانه شود، استفاده می‌گردد. از این روش برای شمارش تعداد روزهایی که آشیانه تحت نظرت و بررسی بوده برای بدست آوردن نرخ بقای روزانه استفاده شد.

در این تحقیق، از مجموع مراحل پنجم‌گانه مورد تأکید می‌فیلد (۱۳) سه مرحله زیر مورد توجه و اندازه‌گیری قرار گرفت:

۱- بقاء در دوره جوجه کشی (Incubation): از زمان گذاشتن اولین تخم در آشیانه تا زمانی که اولین جوجه از آن خارج شود.  
۲- بقاء در دوره آشیانه نشیانی (Nestling): نرخ بقای جوجه‌ها در این مرحله از زمان باز شدن اولین تخم تا ۱۵ روز اول زندگی جوجه‌ها است. در این مرحله بدن جوجه‌ها کرکی است و آنها قادر به ترک آشیانه نمی‌باشند.

۳- بقای جوجه‌ها در مرحله پس آشیانه نشیانی (-Post-nestling): کرکهای بدن جوجه‌ها از بین رفتند و قادر به ترک آشیانه می‌باشند.

پس از جمع آوری اطلاعات اولیه برای هریک از مراحل فنلولوژی Ecology -Methodology تولید مثل باکمک نرم افزار

مزارع امیرآباد و جیرباغ و قریه پایین محله باستثناء مزارع حسن علیله، از شرق به مزارع دهنه و مزارع ناصر کیاده، محدود می‌شود (شکل ۱). این تالاب در محدوده روستای جیرباغ با دریا ۹۴۰ متر فاصله دارد. مساحت تالاب ۱۲۳۰ هکتار با حداکثر طول از شمال به جنوب ۵/۹۹۲ کیلومتر و عرض ترین ناحیه آن در شاخه شرقی ۲/۲۶۳ کیلومتر و ارتفاع ۲۰ متر پایین‌تر از سطح آب‌های آزاد می‌باشد. منبع تامین آب تالاب چشممه‌های جوشان زیرزمینی می‌باشد و از هیچ رودخانه‌ای تغذیه نمی‌کند. متوسط بارندگی سالانه ۱۱۵۸/۹ میلی‌متر و متوسط درجه حرارت هوا ۱۸/۸ درجه سانتی گراد است. حداکثر عمق این تالاب در عمق سنجی دی ماه ۱۳۸۷ حدود ۲۲۳ سانتی متر بوده و عمق متوسط قسمت اعظم تالاب ۱۶۹/۸۸ سانتی متر می‌باشد (۱۴).

تالاب امیرکلایه از مکان‌های با اهمیت برای زمستان‌گذرانی پرندگان (IBA) (۱۵) در فهرست تالاب‌های کنوانسیون رامسر قراردارد. این تالاب به واسطه پوشش گیاهی انبوه و شرایط مناسب دیگر، زیستگاه مناسبی جهت زمستان‌گذرانی تعداد زیادی از پرندگان آبرزی، کنارآبرزی و خشکزی، بومی و مهاجر است. براساس مطالعات صورت گرفته، ۱۵۱ گونه پرنده در تالاب امیرکلایه شناخته شده است (۱۶). بنابراین دست یابی به اطلاعات درباره زیست شناسی گونه باکلان بزرگ در این بوم سامانه آبی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

#### روش مطالعه:

زمان جوجه‌آوری می‌تواند بر موفقیت تولید مثل مؤثر باشد. بنابراین زمان آغاز خوابیدن بر تخم‌ها به عنوان یک پارامتر مهم می‌باشد. زمان آغاز گذاشتن دسته تخم‌ها یا از طریق مشاهده مستقیم و یا محاسبه این زمان از طریق مشاهده جوجه‌های تازه بال و پردر آورده صورت می‌گیرد (۱۶). در این مطالعه با گذاشتن اولین دسته تخم توسط باکلان از نیمه دوم اسفند ۱۳۸۷ آغاز شد و در اوایل مرداد ۱۳۸۸ زمانی که آخرین جوجه‌ها لانه را ترک می‌کردند، پایان یافت. قسمت عمده این مطالعه را مشاهده‌های صحرائی دربرمی‌گیرد. دسترسی به آشیانه‌ها

بقای در طی هر مرحله فنولوژی و ضرب آنها در هم احتمال بقای برای کل دوره جوجه آوری محاسبه شد(۲۱). علاوه بر اطلاعات فوق، داده های مربوط به تعداد دسته (Clutch size) تخم ها در هر آشیانه جمع آوری شد. از آنجا که ممکن بود در تعداد متوسط همزمان در مرحله پرواز (تعداد جوجه به مرحله پرواز رسیده در هر آشیانه) تفاوت وجود داشته باشد و تاثیر تلفات جوجه ها در آن را بتوان تعیین نمود، اطلاع از تعداد دسته تخم ها در هر آشیانه ضروری به نظر می رسید.

(۱۹) نرخ بقاء روزانه آشیانه ها از روشن می فیلد و طبق رابطه زیر محاسبه شد:

$$\hat{S} = 1 - \left( \frac{\text{Mortality}}{\sum_L L(n_{LS} + 0.5n_{LF})} \right)$$

که در آن:

$\hat{S}$ : برآوردمی فیلد از نرخ محدود بقای روزانه

$L$ : فاصله زمانی بازدید ها به روز  
 $n_{LS}$ : تعداد فاصله زمانی  $L$  که در آن هیچ مرگ و میری وجود نداشت.

#### نتایج:

در کلی امیرکلایه باکلانه آشیانه خودرا در بالای درختان بید(Salix sp) رویش یافته در داخل آب بنا می کنند. میانگین تعداد دسته تخم در ۹۶ آشیانه مورد بررسی ۲/۸۸ تخم بود(جدول ۱) و میانگین دوره تغیریخ در این پرندگان ۲۹ روز بوده است. فاصله از تخم بیرون آمدن جوجه ها در آشیانه ها از ۱ تا ۳ روز متغیر بوده است. بعد از ۶۲ روز جوجه ها و والدین آشیانه ها را به طور کامل ترک کردند. در این زمان جوجه هاجته ای به اندازه والدین خود داشتند و با کمبود فضاد درون آشیانه هاروبرومی شوند که برترک آشیانه ها بی اثر نیست.

$N_{LF}$ : تعداد فاصله زمانی  $L$  که در آن مرگ و میر مشاهده شد. آشیانه ها هر چهار روز یکبار از اوایل اردیبهشت تا اوایل مرداد یعنی زمانی که آخرین جوجه ها از تخم بیرون آمدند، مورد پایش قرار گرفتند. تاریخ از تخم بیرون آمدن جوجه ها و از بین رفتن تخم ها و کاهش تعداد جوجه ها برای تعیین نرخ بقاء تخم ها در طول دوره تغیریخ (نسبت تخم های بقا یافته / روز های تغیریخ) و نرخ بقاء جوجه ها در دوره آشیانه نشینی (نسبت آشیانه هایی که دارای جوجه هستند / روزها) ثبت شد. در این مرحله زمانی که باکلانه ها از آشیانه دور می شوند، افراد اجازه ورود به کلی را دارند. (۲۰). همچنین پس از بسته آوردن احتمال

جدول ۱- میانگین تعداد دسته تخم در تالاب امیرکلایه (۱۳۸۸)

Table 1-Mean clutch size of Great Cormorant at Amirkelayeh Wetland in 2009

سال	اندازه دسته تخم					میانگین	انحراف استاندارد	تعداد آشیانه
	۲	۳	۴	۵	۶			
۱۳۸۸	۳	۴	۲	۰	۰	۲/۸	۰/۷	۹

نرخ بقاء روزانه آشیانه ها در مرحله تغیریخ تخم ها و در مرحله پس آشیانه نشینی از بقیه مراحل بیشتر بوده است.

نرخ بقاء روزانه آشیانه ها در مرحله تغیریخ تخم ها و در مرحله آشیانه نشینی و پس آشیانه نشینی به ترتیب

**جدول ۲- نرخ بقاء روزانه باکلان بزرگ در مراحل مختلف جوجه آوری در تالاب امیرکلایه(سال ۱۳۸۸)**

Table 2-daily survival rate of Great Cormorant during incubation, nestling and post-nestling periods at Amirkelayeh Wetland in 2009

مراحل فنلولوژی	نرخ بقاء روزانه می فیلد	حدود اعتماد ٪۹۵
تخم	۰/۹۸۳۳۳	۰/۹۴۷۷۷۷ - ۰/۹۹۸۶۶۱
آشیانه نشینی	۰/۹۹۴۶۶۷	۰/۹۷۱۰۶۴ - ۰/۹۹۹۶۰۳
پس آشیانه نشینی	۱	-

در تالاب امیر کلایه بیشترین تلفات تخم مربوط به دستجات ۲ و ۴ تخمی بود و بیشترین میزان تلفات در مرحله آشیانه نشینی مربوط به دستجات ۳ تخمی بوده است (جدول ۳).

**جدول ۳- درصد تلفات هر یک از مراحل جوجه آوری برای اندازه های متفاوت دستجات تخم در تالاب امیرکلایه (۱۳۸۸)**

Table3- Mortality rates for incubation ,nestling and post-nestling periods of different clutch size in Amirkelayeh Wetland in 2009

اندازه دستجات تخم	مرحله قبل از تفریخ	مرحله Nestling	مرحله Post-nestling
۲	۶	۲	۰.۰۰
۳	۱۳	۱۳	۰.۰۰
۴	۸	۴	۰.۰۰
۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰

- روز اول زندگی احتمال بقاء در دوره آشیانه نشینی

- احتمال بقاء در طول دوره تفریخ تخم ها از مجموع ۲۶ تخم مورد بررسی ۸ تخم در دوره تفریخ از بین

$$\text{Survival}_{\text{Nestling}} = \frac{۸۳۴}{۰} \times ۰/۹۹۴۶۶۷$$

رفت. براین اساس احتمال بقاء تخم ها در طول دوره تفریخ برابر با ۶۹۲/۰ می باشد. از ضرب احتمال بقاء آشیانه ها

- احتمال بقاء در طول دوره پس آشیانه نشینی

در احتمال بقاء تخم ها احتمال بقاء ۶۸/۰۴٪ در طول دوره

با توجه به اینکه در طول دوره پرورش جوجه ها بعداز ۲۰ روزگی

تفریخ بدست آمد است.

هیچ آشیانه ای از بین نرفت، احتمال بقاء آشیانه ها ۱۰٪ / و برابر

$$\text{Survival}_{\text{Incubation}} = ۰/۹۸۳۳۳ \times ۰/۶۹۲$$

بدست آمد. در این دوره زمانی هیچ جوجه ای از بین نرفت و

- احتمال بقاء در طول دوره آشیانه نشینی

احتمال بقاء جوجه ها ۱ بود. در مجموع موفقیت جوجه آوری در

در طول این دوره ۳ جوجه از بین رفت. از حاصل ضرب احتمال

بقاء آشیانه ها در این دوره در احتمال بقاء جوجه ها در طول

نیمه دوم فصل جوجه‌آوری بوده است. مطالعه‌های کرگ در جزیره ورسودردانمارک (Vorso Island) نیز نرخ بقای روزانه را بین ۰/۹۸۶۴ و ۰/۹۹۸۳ نشان می‌دهد. این تحقیق نشان دادکه موفقیت تولید مثل بهطور آشکاری بین بخش‌های مختلف یک کلنی متفاوت می‌باشد(۱۶). نتایج بهدست آمده در این مطالعه نشان دادکه پر مخاطره‌ترین دوره زندگی باکلان‌ها، مرحله تغذیه تخم‌ها می‌باشد. در این مرحله خطر سقوط تخم‌ها در آب و در اثر بادوباران تندد و زیاد می‌باشد. پیشنهاد می‌شود برای جلوگیری از هر گونه اشتبکی در کلنی، پایش در شود. چنین مطالعاتی می‌تواند در مدیریت وارایه راهکارهای درست درمورد جمعیت باکلان بزرگ در جنوب دریای خزر به عنوان تنها منطقه جوجه‌آوری این گونه در ایران کمک کند.

#### منابع

1. Seefelt, N. E. and Gillingham ,J. C. (2006). “A comparison of three methods to investigate the diet of breeding double-crested cormorants (*Phalacrocorax auritus*) in the Beaver Archipelago, northern Lake Michigan.” *Hydrobiologia*, vol 567.No 1, pp.57-67.
2. Loresten, s. H., Gremillet, D. and Nimoen, G. H. (2004). Annual variation in diet of breeding Great Cormorants: Does it reflect varying recruitment of Gadoids; *Waterbirds*, vol 27 No2, pp. 161-164.
3. منصوری، جمشید، ۱۳۶۳، تحلیلی بر جمعیت پرنده‌گان مهاجر و آبزی، مجله محیط‌شناسی، شماره ۱۲۵.
4. منصوری، جمشید، راهنمای صحرایی پرنده‌گان ایران، تهران، نشرفرزانه، ۱۳۸۷.
5. Van Eerden, M.R., Ziylstra, M. and Munsteman, M.J. (1991). Factors determining breeding success in

کل این دوره از حاصلضرب احتمال بقاء در طول این سه دوره بدست می‌آید که برابر ۴/۵۶٪/نمی باشد .

$$S_{\text{Incubation}} \times S_{\text{Nestling}} \times S_{\text{Post-nestling}} = 4.56\%$$

#### بحث

مهیابی منابع غذایی و فاصله کم محل زادآوری، مکان تغذیه و شرایط اقلیمی می‌تواند موفقیت تولید مثلی را تحت شعاع قرار دهد. موفقیت زادآوری و تعداد جوجه‌های که به مرحله پرواز رسیدند می‌تواند یک شاخص از شرایط زیستگاهی پرنده باشد و در مدیریت بوم سامانه آبی تلااب امیر کلایه کمک کند. نرخ بقای روزانه آشیانه‌هادر مطالعات براتی در سال ۱۳۸۳ در مورد کلنی باکلان بزرگ وعاشوری در سال ۲۰۰۹ درباره حواصیل در منطقه سیاه کشیم روند مشابه را با کلنی امیر کلایه نشان می‌دهد. زیرا بقای روزانه آشیانه‌ها در مرحله قبل از تغذیه تخم‌ها کمترین و در مرحله پس آشیانه نشینی بیشترین مقدار را دارا می‌باشد.

در فصل جوجه‌آوری، تغییرات سطح آب در بهره‌وری و بازده جوجه‌آوری می‌تواند موثر باشد. زیرا از یک سو کاهش سطح آب، باعث دست‌یابی شکارچیان به آشیانه‌ها وبا افزایش سطح آب، منجر به طغیان آب و تخریب لانه‌ها می‌شود. (۲۲)

مشاهده‌های کلنی در تلااب امیر کلایه نشان دادکه باکلان‌ها آشیانه‌های خود را بروی درختان بید و در قسمت‌های مرکزی تلااب که عمق متوسط آن حدود ۳ متر است برای ایجاد کلنی ترجیح می‌دهند. علت آن احتمالاً دور ماندن آشیانه‌ها از خطر صیادها و شکارچی‌ها می‌باشد.

در کلنی امیر کلایه میانگین تعداد جوجه‌های قابل پرواز هر آشیانه در سال ۱۳۸۸ معادل ۲/۸ بوده است. در مقایسه با کلنی‌های مورد مطالعه در غرب لیتوانی که دارای میانگین ۲/۷۲±۰/۶۶ در سال ۲۰۰۱ بود (۲۳)، این نرخ در تلااب امیر کلایه مشابه است. در کلنی رامسر نیز نتایج بدست آمده آشکار ساخت که متوسط تعداد جوجه‌ها در ۶۵ آشیانه اندازه گیری شده ۲/۸۸ می‌باشد. در این کلنی تعداد هم‌زادان در نیمه اول محدوده زمانی جوجه‌آوری بطور معنی‌داری بیشتر از

۱۲. بهروزی راد، بهروز، پرنده‌گان آبری خلیج فارس و دریایی عمان، تهران، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست، ۱۳۸۷.
13. Mayfield, H. F. (1975). "Suggestions for calculating nest success." The Wilson Bulletin: pp.456-466.
۱۴. هادی پور، احسان، مطالعه بوم شناختی و بررسی عوامل تهدید کننده جمعیت شنگ به عنوان گونه شاخص در تالاب بین المللی و پناهگاه حیات وحش امیرکلایه، پایان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۸۹، تهران.
۱۵. بهروزی راد، بهروز، تالابهای ایران، تهران، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، ۱۳۸۶.
16. Krag, J. S. M. (2003). "Variation in nest survival within a Great Cormorant *Phalacrocorax carbo sinensis* colony." Vogelwelt 124(Supplement), pp. 131-137.
17. Duberstein, J. N., V. Jimenez-Serrania. (2005). Breeding Double-crested Cormorants and Wading Birds on Isla Alcatraz, Sonora, México. USDA Forest Service Gen. Tech. Rep. PSW-GTR-191.
18. Bregnballe, T., Gregersen, J., Mortensen, P-H. (1996). Change in breeding success with expansion of a Danish Great Cormorant *Phalacrocorax carbo sinensis* colony. Ardea, Vol 83, pp.20-27
19. Krebs C. J. (1999). Ecological Methodology. Harper and Rows Publications. New York. Pp. 375-455
20. Lehikoinen, A. (2006). "Cormorants in the Finnish archipelago." Ornis Fennica .Vol 83.No1, pp: 34.
- Cormorants *Phalacrocorax carbo sinensis*. Proceedings of the workshop 1989 on cormorants (M.R. Van Eerden and M. Zijlstra Eds.). Rijkswaterstaat Directorate Flevoland, Lelystad. The Netherland. pp. 233-243.
6. Lilliendahl, K. and Solmundsson, J. (2006). "Feeding ecology of sympatric European shags *Phalacrocorax aristotelis* and great cormorants *P. carbo* in Iceland." Marine Biology, vol 149. No 4. pp. 979-990.
7. Sullivan, K. I., Curtis, P. D., Chipman, R. B. and Mc Cullough ,R. D.. (2006). The Double-crested Cormorant: Issues and Management. Cornell University, Department of Natural Resources, Ithaca, New York
8. Newson S.E. and T. Bregnballe (2003). Estimating reproductive success of Great Cormorants *Phalacrocorax carbo*: reliability and limitations of current methodology. Vogelwelt , vol 124 .Nol. pp. 143-148
9. Paillisson, J.M., Carpentier, A., Le Gentil, J., Marion, L. (2004). "Space utilization by a cormorant (*Phalacrocorax carbo* L.) colony in a multi-wetland complex in relation to feeding strategies." Comptes Rendus Biologies, vol 327.No 5, pp.493-500
10. Fonteneau, F., Paillisson, J., Marion, L. (2009). "Relationships between bird morphology and prey selection in two sympatric Great Cormorant *Phalacrocorax carbo* subspecies during winter." Ibis 151(2), 286-298.
11. Dickinson, E., ed. 2003. The Howard & Moore Complete Checklist of the Birds of the World. 3d ed. Princeton Univ. Press, Princeton, N.J.

23. Zydelis, R ., Grazulevicius, G., Zarankaite, J., Mecionis , R., and Maciulis , M. (2002) .Expansion of the cormorant (*Phalacrocorax carbo sinensis*) population in western Lithuania . Acta Zoologica Lituanica, vol 12.No 3.pp.283-287.
21. Mayfield, H. (1961). Nesting success calculated from exposure. Wilson Bull. Vol 73,pp. 255–261.
22. Barati A, Javan S, Mohammad S, Sehhatisabet E. (2008). “Reproductive biology of Pygmy Cormorant *Phalacrocorax pygmaeus* in Siahkeshim Protected Area, Northern Iran.” Marine Ornithology, vol 36.No2, pp.163-166.