

خاصیت ضد کپکی پوشش آلزینات حاوی اسانس بنه (*Pistacia atlantica* subsp. *kurdica*) روی نان

الهام احمدی‌پور^۱، سمیرا بهرامیان^{۲*}

۱. دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنتندج، سنتندج، ایران

۲. گروه علوم و صنایع غذایی، واحد سنتندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنتندج، ایران

*نویسنده مسئول: s.bah@iausdj.ac.ir

تاریخ پذیرش: ۱۴/۰۵/۹۶

تاریخ دریافت: ۰۲/۰۳/۹۶

چکیده

ترکیبات بازدارنده رشد میکروارگانیزم‌ها را می‌توان همراه با فیلم‌ها و پوشش‌های خوراکی به منظور کاهش رشد میکروارگانیزم‌ها در سطح مواد غذایی مورد استفاده قرار داد. از مزایای این روش استفاده از غلظت‌های پایین تر ترکیبات ضد میکروب و کاهش سرعت انتشار آن‌ها می‌باشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین میزان تاثیر اسانس بنه زیرگونه‌ی کوردیکا در قالب پوشش خوراکی آلزینات سدیم بر مهار رشد کپک پنی‌سیلیوم‌کریسوئنوم در نان انجام شد. بدین منظور ابتدا حداقل غلظت بازدارندگی اسانس بر کپک به روش رقیق سازی در محیط کشت تعیین شد. سپس اسانس با و بدون پوشش آلزینات در سطح نان مورد استفاده قرار گرفت و درصد مهار رشد کپک ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که اسانس بنه در شرایط محیط کشت در غلظت 25 mL/L مانع از رشد کپک می‌گردد. اسانس بنه در غلظت 125 mL/L در سطح نان، بدون پوشش آلزینات $28/21\%$ و همراه پوشش آلزینات $45/24\%$ مهار رشد کپک را در پی داشت.

واژگان کلیدی: اسانس بنه، پوشش خوراکی، کپک، نان، آلزینات

مقدمه

عامل فساد اعمال نماید (Balaguer et al., 2013). گزارشات بسیاری بر یافتن ترکیبات ضد میکروبی طبیعی جدید که بتوانند در ساختار فیلم‌های خوراکی وارد شوند، تمرکز نموده اند. بعضی از انواع این ترکیبات با خاصیت بازدارنده رشد میکروارگانیزم‌ها در مواد غذایی شامل اسیدهای آلی، آنزیم‌ها، باکتریوسین‌ها و اسانس‌ها می‌باشند (Cagri et al., 2004). اسانس‌ها، مایعات معطر روغنی هستند که از منابع گیاهی تهیه شده و مخلوطی از ترکیبات متعدد می‌باشند (Avila-Sosa et al., 2012). آولیا سوسا و همکاران (۲۰۱۰) دریافتند اسانس پونه مکزیکی در ساختار فیلم‌های خوراکی نشاسته، آمارانت و کیتوزان می‌تواند کیفیت مواد غذایی را با کنترل رشد قارچ‌های سطحی بهبود دهد (Avila-Sosa et al., 2010). بالاگور و همکاران (۲۰۱۳) کاربرد فیلم گلیادین حاوی سینامالدھید را روشی بسیار موثر در جلوگیری از رشد کپک‌های پنی سیلیوم اکسپانسوم و آسپرژیلوس نایجر در نان و پنیر یافتند (Balaguer et al., 2013). در بررسی اوتونی و همکاران (۲۰۱۴) نیز فیلم‌های خوراکی مตیل سلولز به

فساد محصولات نانی عمدتاً به دلیل رشد قارچ‌ها و به ویژه جنس‌های پنی سیلیوم، آسپرژیلوس و فوزاریوس بوده که با ایجاد طعم نامطلوب، تولید مایکوتوكسین‌ها و ترکیبات آلرژیک منجر به خسارات اقتصادی و به خطر ناخداختن سلامتی مصرف کنندگان می‌گردد (Nielsen and Rios, 2000; Gerez et al., 2009). نگهدارنده‌های شیمیایی مانند پروپیونیک اسید و نمک‌های آن از روش‌های جلوگیری از رشد کپک‌ها در این محصولات می‌باشد (Gould, 1996). با این حال مصرف کنندگان تمایلی به حضور نگهدارنده‌های شیمیایی در مواد غذایی خود و به ویژه نان که به شکل Krisch et al., (2013) روزانه مصرف می‌گردد، ندارند. یکی از رویکردهای جدید برای جلوگیری از رشد میکروارگانیزم‌ها استفاده از ترکیبات ضد میکروبی طبیعی به همراه یک ترکیب حامل می‌باشد. این سیستم فعال باید بتواند ترکیبات بازدارنده رشد میکروب را در خود نگه داشته، سرعت رهاسازی آن‌ها را کنترل نموده و بدین وسیله اثرات بازدارندگی و کشنده‌گی آن‌ها را بر پاتوژن‌ها یا میکروارگانیزم‌های

کپک پنی‌سیلیوم‌کریسوژنوم (PTCC 5071) به صورت آمپول لیوپلیزه از سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران تهیه و تا قبل از استفاده در یخچال با دمای ۴ درجه‌ی سانتی‌گراد نگهداری شد.

- آماده‌سازی سوسپانسیون اسپور بعد از فعال‌سازی پودر لیوپلیزه کپک پنی‌سیلیوم-کریسوژنوم بر روی محیط کشت PDA شیب‌دار در دمای ۲۵ °C به مدت ۷ تا ۱۰ روز، ۱۰ میلی‌لیتر سرم-فیزیولوژی به لوله‌ی آزمایش حاوی اسپور اضافه و با میله‌ی شیشه‌ای استریل سطح کشت جهت برداشت اسپور به آرامی خراش داده شد و به منظور حذف قطعات میسلیوم، با استفاده از پشم شیشه استریل فیلتر شد. تعداد اسپور به وسیله‌ی هموسیتومتر شمارش و در ۱۰۶ اسپور در هر میلی‌لیتر تنظیم شد (Gandomi et al., 2009).

- تعیین حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) اسانس بر کپک

محیط کشت PDA استریل با دمای ۴۵ درجه‌ی سانتی‌گراد، در هر نوبت با یکی از غلظت‌های مورد بررسی اسانس (۰، ۱۰، ۲۰، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹ و ۳۰ میلی‌لیتر در لیتر) مخلوط شد و به ازای هر غلظت در ۳ پلیت توزیع گردید. یک دیسک‌آنتی‌بیوگرام استریل با قطر ۶/۴ میلی‌متری در مرکز هر پلیت قرار داده شد و با ۱۰ میکرو‌لیتر سوسپانسیون اسپور ۲۵±۱°C (ml/۱۰۶)، تلقیح گردید. پلیت‌ها در دمای گرمخانه‌گذاری شدند. زمانیکه در گروه کنترل تمام قطر پلیت توسط قارچ پوشانده شد، قطرکلنی‌ها در دیگر پلیت‌ها اندازه‌گیری گردید (استوار و همکاران، ۱۳۹۳). درصد مهار‌کنندگی اسانس با فرمول زیر محاسبه شد:

$$\frac{Dc - Ds}{Dc} \times 100 = (\%) \text{ مهار رشد}$$

D_c = میانگین قطر رشد در نمونه‌ی شاهد

D_s = میانگین قطر رشد در نمونه‌ی تحت تیمار اسانس

همراه اسانس‌های میخک (*Syzygium aromaticum*) و ارگانو (*Origanum vulgare*) توانستند تعداد کپک‌ها و مخرها را در برش‌های نان طی ۱۵ روز نگهداری کاهش دهند (Otoni et al., 2014).

یکی از انواع اسانس‌های گیاهی، اسانس حاصل از صمع درخت بنه زیرگونه کوردیکا (*Pistacia atlantica* subsp. *Kurdica*) می‌باشد (محمدی و همکاران، ۱۳۹۵). کوردیکا به شکل گسترده اطراف سلسله جبال زاگرس در غرب و شمال ایران، شرق و شمال عراق، جنوب ترکیه و شمال سوریه، یافت می‌شود و از فلور گیاهی مهم این مناطق محسوب می‌گردد (استوار و همکاران، ۱۳۹۳). صمع کوردیکا تحت عنوان "سقز" نامیده می‌شود و بطور سنتی یا صنعتی برای موارد خوارکی و دارویی استفاده می‌شود (Saber-Tehrani et al., 2013). روغن فرار یا اسانس حاصل از این صمع به روش تقطیر جداسازی می‌شود. این اسانس Sharifi and ۲۰٪ وزن صمع خام را تشکیل می‌دهد (Hazell, 2011). بررسی‌هایی نشان دادند که اسانس شیره‌ی درخت بنه بطور مؤثری قادر به مهار رشد پنی‌سیلیوم سیترینوم در پنیر می‌باشد. در بررسی حسامی و همکاران (۲۰۱۴) این اسانس توانست رشد کپک بوتریتیس سینره‌آ را در توت فرنگی کاهش دهد (Hesami et al., 2014). لذا در این تحقیق تأثیر این اسانس همراه با پوشش خوارکی آلزینات در جلوگیری از کپک زدگی نان بررسی شده است.

مواد و روش کار

در این بررسی از محیط کشت PDA (کیولب، کانادا)، آلزینات‌سدیم با ویسکوزیته‌ی کم با مارک تجاری سیگما آلدیریچ، گلیسیرون و توئین ۸۰ با مارک تجاری مرک استفاده شد. اسانس شیره‌ی درخت بنه از شرکت سقزسازی کردستان تهیه شد و به منظور استریل کردن آن از میکروفیلترهای ۰/۴۵ میکرون با مارک تجاری بیوفیل استفاده گردید.

اسپور ($10^6/ml$) تلقيق شدند. نان‌ها در کيسه‌های پلاستيکي استريل با اندازه يكسان (38×25 سانتى متر) قرار داده شدند. كيسه‌ها كاملاً درب‌بندی شده و نان‌هاي بسته بندی شده در گرمخانه 25°C نگهداري شدند. اثر ضدقارچي با اندازه‌گيري قطر رشد كپك در انتهای دوره نگهداري (روز هشتم) تعیین شد.

- ارزیابی حسی نان

ارزیابی حسی به روش هدونیک ۹ نقطه‌ای انجام گرفت. این آزمون بین نمونه‌ی شاهد (که هیچ انسانسی به آن اضافه نشده بود) و نمونه‌ای از نان پوشش داده شده با آژینات و غلظت 125 mL/L انسانس بنه توسط ۳۰ ارزیاب انجام شد. نمونه‌های نان به شکل تصادفي کدگذاري شدند. از ارزیاب‌ها خواسته شد که طبق پرسشنامه‌ای که در اختیار آن‌ها قرار گرفته میزان علاقه یا تنفر خود را نسبت به دو نمونه اعلام کنند. امتیازدهی بر اساس ۹ امتیاز (امتیاز ۹ بالاترین و امتیاز صفر کمترین امتیاز) بود. عملیات مقایسه میانگین نتایج با آزمون LSD در سطح احتمال ۵ درصد با استفاده از نرم افزار مینی تب ۱۶ انجام شد Poste et al., 1991).

نتایج

نتایج کشت كپك در محیط کشت PDA حاوي غلظت های مختلف انسانس نشان داد که رشد کپك با افزایش mL/L غلظت انسانس کاهش می‌یابد و در غلظت‌های 25 mL/L و بالاتر به طور کامل مهار می‌گردد (جدول ۱).

- آماده سازی محلول پوشش دهنده

محلول پوشش دهنده با محلول نمودن سدیم آژینات به میزان $1\% \text{ w/w}$ در آب مقطمر با دمای 25°C و هم زدن به مدت ۲۰ دقیقه به منظور هیدراته شدن کامل تهیه شد و سپس در اتوکلاو 121°C به مدت ۲۰ دقیقه استریل گردید. پس از سرد شدن تا دمای محیط، پلاستی‌سایزر گلیسرول استریل به میزان $5\% \text{ v/v}$ به آن اضافه شد (Soukoulis et al., 2014). به منظور پخش پذیری انسانس در محلول پوشش دهنده از توانی 80% استفاده شد (Otoni et al., 2014).

- تهیه و پوشش دادن نان

نان در کارگاه تولید نان‌های حجمی تهیه شد. بعد از اتمام عملیات پخت، نان‌ها بدون تماس مستقیم دست و توسط چنگ استریل داخل کيسه‌های استریل قرار داده شده و سریعاً به آزمایشگاه منتقل گردیدند. محلول پوشش دهنده توسط قلموهای استریل به شکل یکنواخت بر سطح نان‌ها توزیع گردید.

گروه‌های مورد بررسی شامل ۱- نان‌های پوشش داده شده با محلول آژینات و انسانس ۲- نان‌های پوشش داده شده با محلول آژینات بدون انسانس ۳- نان‌های فاقد پوشش و فاقد انسانس بودند. نمونه‌های نان در ۴ تکرار مورد بررسی قرار گرفتند.

- تلقيق سوسپانسيون اسپور بر سطح نان نان‌های تهیه شده (با یا بدون پوشش) در سه نقطه از سطح نان و در هر نقطه با 5 میکرولیتر سوسپانسيون

جدول ۱- درصد بازدارندگی رشد پنی‌سیلیوم‌کریسوژنوم توسط انسانس بنه در محیط کشت PDA

درصد بازدارندگی	میانگین قطر کلنی (cm)	غلظت انسانس (mL/L)
.	۶	.
۶۵/۷	۲/۰۶	۱۰
۷۷	۱/۳۸	۲۰
۱۰۰	-	۲۵
۱۰۰	-	۲۶
۱۰۰	-	۲۷
۱۰۰	-	۲۸
۱۰۰	-	۲۹
۱۰۰	-	۳۰

کپک وایسته به غلظت اسانس بود و با افزایش غلظت اسانس از mL/L ۶۵ تا ۱۲۵، درصد مهار رشد کپک افزایش یافت و در غلظت mL/L ۱۲۵ به٪ ۷۴/۴۵ افزایش رسید. به علاوه با به کارگیری غلظت mL/L ۱۲۵ اسانس در سطح نان بدون حضور آژینات مشاهده گردید که درصد مهار رشد کپک اندکی کاهش یافته و به٪ ۷۱/۲۸ رسیده است.


در جدول ۲ نتایج حاصل از میزان رشد کپک در تیمارهای مختلف نان ارائه شده است. این نتایج نشان داد که در نانهای فاقد اسانس میزان رشد کپک در حضور و عدم حضور آژینات به یک میزان بوده و پوشش آژینات نقشی در مهار رشد کپک نداشته است. با افزودن اسانس به پوشش آژینات میزان رشد کپک کاهش و درصد مهار رشد افزایش یافت. کاهش رشد

جدول ۲- درصد بازدارندگی رشد پنی‌سیلیوم‌کریسوئنوم توسط اسانس بنه در انتهای دوره نگهداری (روز هشتم)

تیمارها	میانگین قطر کپک (سانتی‌متر)	درصد بازدارندگی
نان فاقد آژینات و اسانس	۱/۸۸	.
نان حاوی آژینات و فاقد اسانس	۱/۸۸	.
نان حاوی آژینات و اسانس mL/L ۶۵	۰/۹۱	۵۱/۵۶
نان حاوی آژینات و اسانس mL/L ۸۵	۰/۸۸	۵۳/۲۰
نان حاوی آژینات و اسانس mL/L ۱۰۵	۰/۵۵	۷۰/۷۵
نان حاوی آژینات و اسانس mL/L ۱۲۵	۰/۴۸	۷۴/۴۵
نان حاوی آژینات mL/L ۱۲۵ بدون آژینات	۰/۵۴	۷۱/۲۸

شاهد و فاقد اسانس به شکل معنی‌داری بیشتر از نان حاوی اسانس بوده است ($p<0.05$).

نتایج ارزیابی طعم نان‌ها در نمودار ۱ ارائه شده است. همانگونه که مشاهده می‌گردد میزان پذیرش نان‌های



نمودار ۱- مقایسه میانگین پذیرش حسی تیمارهای مورد آزمایش با تست هدونیک
K0: نان فاقد اسانس؛ K125: نان حاوی پوشش آژینات و mL/L ۱۲۵ اسانس

قرار گرفته است. در این بررسی نیز تاثیر اسانس بنه بر مهار رشد کپک پنی‌سیلیوم‌کریسوئنوم در شرایط محیط کشت و در سطح نان مورد بررسی قرار گرفت. اسانس بنه در غلظت mL/L ۲۵ منجر به مهار ۱۰۰ درصدی

از آنجایی که اسانس‌ها برای استفاده در مواد غذایی به عنوان افزودنی‌های طعم دهنده، ایمن شناخته شده اند (Tunc et al., 2007) (GRAS)، امکان استفاده از اثرات ضدمیکروبی آن‌ها در موارد متعدد مورد بررسی

محصولات غذایی تنها وقتی حاصل می‌گردد که غلظت-های بالاتری از انسان‌ها مورد استفاده قرار گیرد. نتایج این بررسی نیز موید این موضوع بود و انسان‌بنه در غلظت‌های بالاتر از حداقل غلظت بازدارندگی در محیط کشت توانست رشد کپک پنی سیلیوم در سطح نان را کاهش دهد. در بررسی استوار و همکاران (۱۳۹۳) نیز غلظت موثر انسان‌بنه در جلوگیری از رشد کپک پنی سیلیوم سیترینوم در پنیر بالاتر از حداقل غلظت مهارکنندگی آن در شرایط محیط کشت تعیین شد. در واقع هنگامی که انسان‌ها به شکل مستقیم در سطح مواد غذایی مورد استفاده قرار می-گیرند اجزا بسیار هیدروفوب و فرار آن‌ها با ترکیبات مواد غذایی اتصال یافته و سایر اجزاء انسان‌ها با توجه به تمایلشان به آب در ماده غذایی تفکیک می‌شوند. برای جلوگیری از این مشکل یکی از روش‌ها به کارگیری انسان‌ها همراه با فیلم‌ها و پوشش‌های خوراکی می‌باشد. فیلم‌ها و پوشش‌های خوراکی می-توانند به عنوان حاملی ترکیبات بازدارنده رشد میکرووارگانیزم‌ها را در سطح مواد غذایی رها نموده و Avila-Sosa et al., 2012 رشد میکرووارگانیزم‌ها را کنترل نمایند (). این پوشش‌ها، انتشار ترکیبات بازدارنده رشد میکرووارگانیزم‌ها به محصولات را کاهش می‌دهند زیرا انسان‌ها قسمتی از ساختار شیمیایی فیلم شده و با پلیمر و پلاستیسایزر فیلم واکنش می‌دهند. رها شدن ترکیب ضد میکروب از فیلم خوراکی به عوامل بسیاری بستگی دارد. این عوامل عبارتند از کشش‌های الکترواستاتیکی بین ترکیب ضد میکروب و زنجیره‌های پلیمر، فشار اسمزی، تغییرات ساختاری حاصل شده در اثر حضور ترکیب ضد میکروب و شرایط محیطی. در مقایسه با افزودن مستقیم، هنگامی که از فیلم‌های خوراکی استفاده می‌گردد، مقادیر کمتری از ترکیبات ضد میکروب نیاز است که این مسئله به دلیل رها شدن تدریجی ترکیب ضد میکروب به سطح ماده غذایی می-باشد (Ponce et al., 2008; Sebti et al., 2005).

رشد کپک در شرایط محیط کشت گردید. آنجلینی و همکاران (۲۰۰۶) نیز تاثیر ۶ انسان را بر مهار رشد این کپک در شرایط محیط کشت بررسی نمودند. در میان انسان‌های مورد بررسی انسان‌های دارچین (*Cinnamomum zeylanicum* Breyne) و آویشن (*Thymus vulgaris* L.) دارای بیشترین تاثیر ضد قارچی بودند و در غلظت $0/25\text{ mL/L}$ توانستند٪ ۱۰۰ مهار رشد کپک را حاصل نمایند. انسان نعنا گربه‌ای^۱ منجر به مهار رشد کپک گردد. انسان‌های درخت چای^۲ (*Melaleuca alternifolia* Cheel) و مریم گلی کبیر^۳ (*Salvia sclarea* L.) در غلظت 1 mL/L به ترتیب ۱۰۰ و ۵۰ درصد مهار رشد کپک را منجر شدند. کمترین تاثیر ضد قارچی در انسان گیاه برگ بو^۴ (*Laurus nobilis* L.) مشاهده شد به طوریکه در غلظت 1 mL/L تنها٪ ۱۰/۸ مهار رشد کپک را درپی داشت. در تمام موارد اثرات بازدارندگی رشد کپک Angelini et al., (2006) در تحقیقات تاو و همکاران (۲۰۰۹) نیز حداقل غلظت بازدارندگی انسان پر تقال شیرین بینگ^۵ (Citrus sinensis Osbeck) بر کپک پنی سیلیوم Tao et al., (2009) در مقایسه با تحقیقات اشاره شده انسان بنه از تاثیر ضد قارچی کمتری بر کپک پنی سیلیوم کریسوئرینوم برخوردار بود.

در بخش دیگر این تحقیق انسان در سطح نان مورد استفاده قرار گرفت و در غلظت 125 mL/L (بدون حضور آژینات) توانست٪ ۷۱/۲۸ رشد کپک را مهار نماید. علی رغم اینکه انسان‌ها و ترکیباتشان توانایی بالایی در مهار میکرووارگانیزم‌های بیماریزا و عامل فساد در شرایط *in vitro* نشان می‌دهند، اما نتایج مشابه در

-
1. Catnip
 2. Tea tree
 3. Clary sage
 4. Laurel
 5. Bingtang sweet orange

- Moorillon, G.V. and Lopez-Malo, A. 2010. Fungal inactivation by Mexican oregano (*Lippia berlandieri* Schauer) essential oil added to amaranth, chitosan, or starch edible films. *J Food Sci.* 75: 127-133.
5. Avila-Sosa, R., Palou, E., Munguia, M.T.J., Nevarez-Moorillon, G.V., Cruz, A.R.N. and Lopez-Malo, A. 2012. Antifungal activity by vapor contact of essential oils added to amaranth, chitosan, or starch edible films. *Int J Food Microbiol.* 153: 66-72.
6. Balaguer, M.P., Lopez-Carballo, G., Catala, R., Gavara, R. and Hernandez-Munoz, P. 2013. Antifungal properties of gliadin films incorporating cinnamaldehyde and application in active food packaging of bread and cheese spread foodstuffs. *Int J Food Microbiol.* 166: 369-377.
7. Cagri, A., Ustunol, Z. and Ryser, E.T. 2004. Antimicrobial edible films and coatings. *J Food Protect.* 67: 833-848.
8. Gandomi, H., Misaghi, A., Akhondzadeh Basti, A., Bokaei, S., Khosravi, A., Abbasifar, A. and Jebelli Javan, A. 2009. Effect of *Zataria multiflora* Boiss. essential oil on growth and aflatoxin formation by *Aspergillus flavus* in culture media and cheese. *Food Chem Toxicol.* 47: 2397- 2400.
9. Gerez, C.L., Torino, M.I., Rollán, G. and Valdez G.F. 2009. Prevention of bread mould spoilage by using lactic acid bacteria with antifungal properties. *Food Control.* 20: 144-148.
10. Gould, G.W. 1996. Methods for preservation and extension of shelf life. *Int J Food Microbiol.* 33: 51-64.
11. Hesami, G., Bahramian, S., Fatemi, A. and Hesami, S. 2014. Effect of *Pistacia atlantica* subsp. *kurdica* essential oil and acetic acid on *Botrytis cinerea* growth in

این بررسی نیز غلظت ۱۲۵ mL/L اسانس به همراه آژینات در مقایسه با وقتی که همین غلظت به تنها ی و بدون حضور آژینات در سطح نان مورد استفاده قرار گرفت به شکل موثرتری منجر به مهار رشد کپک شد. به علاوه این احتمال وجود دارد که در شرایطی که نان ها بسته بندی نشوند تاثیر آژینات در حفظ اسانس و کاهش مهار رشد کپک موثرتر گردد که در مطالعات بعدی لازم است این شرایط مورد بررسی قرار گیرد. از طرف دیگر به دلیل اینکه غلظت ۱۲۵ mL/L اسانس در سطح نان از نظر حسی مورد پذیرش ارزیابها قرار نگرفت، پیشنهاد می گردد که از غلظت‌های پایین‌تر این اسانس به همراه دیگر ترکیبات طبیعی در پوشش آژینات برای مهار کپک‌زدگی نان استفاده گردد.

منابع

1. استوار، شادی..، بهرامیان، سمیرا و صالحی، رضا. (۱۳۹۳). بررسی اثر اسانس شیره درخت بنه (Pistacia atlantica subsp. kurdica) پنیسیلیوم سیترینوم و خواص ارگانولپتیکی پنیر فراپالایشی. مجله بهداشت مواد غذایی، سال چهارم، شماره ۱۴، صفحات ۴۶-۳۹.
2. محمدی، مونا، بهرامیان، سمیرا و رخزادی، اسعد. (۱۳۹۵). تاثیر پوشش کیتوزان و اسانس بنه (Pistacia atlantica subsp. kurdica) اکسیداسیون چربی ماهی قزل آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) طی دوره نگهداری. مجله علمی شیلات ایران، سال بیست و پنجم، شماره ۳، صفحات ۲۷۹-۲۷۳.
3. Angelini, P., Pagiotti, R., Menghini, A. and Vianello, B. 2006. Antimicrobial activities of various essential oils against foodborne pathogenic or spoilage moulds. *Ann Microbiol.* 56: 65-69.
4. Avila-Sosa, R., Andez-Zamoran, E.H., Lopez-Mendoza, I., Palou, E., Enezmunguia, M.T.J., Nevarez-

- and Jafari Mohammadi, S.A. 2013. Chemical composition of Iran's *Pistacia atlantica* cold-pressed oil. *J Chem.* 2013:1-6.
18. Sebti, I., Martial-Gros, A., Carnet-Pantiez, A., Grelier, S. and Coma, V. 2005. Chitosan polymer as bioactive coating and film against *Aspergillus niger* contamination. *J Food Sci.* 70: 100–104.
19. Sharifi, M.S. and Hazell, S.L. 2011. GC-MS Analysis and antimicrobial activity of the essential oil of the trunk exudates from *Pistacia atlantica kurdica*. *J Pharmaceut Sci Res.* 3: 1364-1367.
20. Soukoulis, C., Yonekura, L., Gan, H., Behboudi-Jobbehdar, S., Parmenter, C. and Fisk, I. 2014. Probiotic edible films as a new strategy for developing functional bakery products: The case of pan bread. *Food Hydrocolloid.* 39: 231-242.
21. Tao, N., Liu, Y. and Zhang, M. 2009. Chemical composition and antimicrobial activities of essential oil from the peel of bingtang sweet orange (*Citrus sinensis* Osbeck). *Int J Food Sci Tech.* 44: 1281–1285.
22. Tunc, S., Chollet, E., Chalier, P., Preziosi-Belloy, L. and Gontard, N. 2007. Combined effect of volatile antimicrobial agents on the growth of *Penicillium notatum*. *Int J Food Microbiol.* 113: 263–270.
- culture media and strawberry fruits. *B. Enviroment. Pharm. Life Sci.* 3: 100-106.
12. Krisch, J., Rentskenhand, T., Horvath, G. and Vagvolgyi, C. 2013. Activity of essential oils in vapor phase against bread spoilage fungi. *Acta Biologica Szegediensis*, 57: 9-12.
13. Nielsen, P.V. and Rios, R. 2000. Inhibition of fungal growth on bread by volatile components from spices and herbs, and the possible application in active packaging, with special emphasis on mustard essential oil. *Int J Food Microbiol.* 60: 219–229.
14. Otoni, C.G., Pontes, S.F.O., Medeiros, E.A.A. and Soares, N.F.F. 2014. Edible films from methylcellulose and nanoemulsions of clove bud (*Syzygium aromaticum*) and oregano (*Origanum vulgare*) essential oils as shelf Life extenders for sliced bread. *J Agric Food Chem.* 62: 5214-5219.
15. Ponce, A.G., Roura, S.I., del Valle, C.E. and Moreira, M.R. 2008. Antimicrobial and antioxidant activities of edible coatings enriched with natural plant extracts: in vitro and in vivo studies. *Postharvest Biol Tec.* 49: 294–300.
16. Poste, L.M., Mackie, D.A., Butler, G. and Larmond, E. 1991. *Laboratory Methods for Sensory Analysis of Food*. Canada Communication Group, Ottawa.
17. Saber-Tehrani, M., Givianrad, M.H., Aberoomand-Azar, P., Waqif-Husain, S.

Anti-mold properties of alginate coating incorporating essential oil of *Pistacia atlantica* subsp. *kurdica* on bread

Ahmadipoor E¹, Bahramian S*²

1. Master in Food Science, Department of Food Science and Technology, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
2. Department of Food science and Technology, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran

*Corresponding author: s.bah@iausdj.ac.ir

Received: 23 May 2017

Accepted: 5 August 2017

Abstract

Antimicrobial agents can be incorporated into edible films and coatings to reduce the risk of microbial growth on food surfaces. This offers advantages such as the use of small antimicrobial concentrations and low diffusion rates. Therefore, this study aimed to determine the antifungal effect of *Pistacia atlantica* subsp. *Kurdica* essential oil in sodium alginate coating against *Penicillium chrysogenum* growth in bread. First, minimum inhibitory concentration of essential oil (EO) against mold was determined by agar dilution method. Then, the EO with or without alginate coating was applied on bread surface and the percent inhibition of radial growth was determined. The results showed that Bene's EO at concentration of 25 mL/L inhibits the mold growth. At concentration of 125 mL/L of EO on bread surface, without alginate coating 71.28% and with alginate 74.45% mold growth inhibition was observed.

Keywords: *Pistacia atlantica* subsp. *Kurdica* essential oil, Edible coating, Mold, Bread, Alginate