

مقایسه الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در سویه‌های /شریشیا کلی جداشده از گوشت مرغ پرورش یافته در شرایط عادی و بدون آنتی‌بیوتیک

محمد رضا شهیری^۱، مجید غلامی آهنگران^{۲*}، ابراهیم رحیمی^۳

۱. دانش آموخته دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

۲. گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

۳. گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

*نوسنده مسئول: mgolamia1388@yahoo.com

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۶/۰۹/۱۶

تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۰۵/۱۶

چکیده

استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها در پرورش مرغ یکی از نگرانی‌های مصرف‌کنندگان این منع پروتئینی است که معمولاً مصرف این گونه ترکیبات در پرورش طیور به دلیل خاصیت ضدمیکروبی و کنترل بیماری‌های عفونی صورت می‌گیرد. بهمنظور مقایسه الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در /شریشیا کلی جداشده از گوشت مرغ پرورش یافته در شرایط مختلف (معمولی و بدون آنتی‌بیوتیک)، سویه‌های /شریشیا کلی از گوشت مرغ و محتويات روده مرغ‌های پرورش یافته در شرایط معمولی و بدون آنتی‌بیوتیک در اصفهان جدا شد. پس از خالص‌سازی کشت باکتری بر روی محیط‌های اختصاصی و تأیید سویه باکتری با آزمون‌های بیوشیمیایی، باکتری‌های جداشازی شده بر روی محیط مولر هینتون کشت داده شد. الگوی مقاومت باکتریایی با روش دیسک دیفیوژن آگار بررسی شد. نتایج نشان داد در هر دو نوع سیستم پرورش مقاومت آنتی‌بیوتیکی نسبت به دسته داروهای مختلف مورد استفاده در پزشکی و دامپزشکی وجود دارد اما در مرغ‌های بدون آنتی‌بیوتیک مقاومت دارویی به مراتب کمتر است.

واژگان کلیدی: گوشت بدون آنتی‌بیوتیک، /شریشیا کلی، اصفهان.

مقدمه

پیدا کرده و در روده‌ها کلونیزه می‌شوند (Nolan *et al.*, 2013). متأسفانه در فرایند خارج‌سازی امعاء و احشا پس از کشتار پرنده‌گان، آلودگی لاشه‌ها با باکتری‌های بیماری‌زا دستگاه گوارش مانند /شریشیا کلی اجتناب ناپذیر است (Lee Ventola, 2015). در شرایط فعلی کنترل این آلودگی‌ها (آب، دان و بستر) صرفاً از طریق رعایت بهداشت و اتوماسیون سیستم آب‌خوری و دان‌خوری هزینه‌بر و مشکل است. بهره‌حال رعایت بهداشت در مجاور رژیم‌های خاص غذایی، دارویی و احياناً مکمل‌ها و افزودنی‌های غذایی می‌تواند بار آلودگی منابع غذایی و به دنبال آن بار میکروبی دستگاه گوارش پرنده‌گان را کاهش دهد که در کنترل این بیماری در جمعیت پرنده‌گان و به‌طور غیرمستقیم در بهداشت عمومی انسان مؤثر است و از طرفی با کاهش میزان آلودگی لашه، شلف لایف یا به عبارتی میزان مانداری گوشت نیز افزایش خواهد یافت

باکتری /شریشیا کلی از نظر بهداشت عمومی و سلامت پرنده‌گان اهمیت زیادی دارد. این باکتری جزء فلور طبیعی روده بوده و تمام پرنده‌گان و حیوانات به‌طور معمول این باکتری را از طریق مدفوع دفع می‌نمایند. در هر گرم مدفوع پرنده‌گان حدود یک میلیون باکتری /شریشیا کلی وجود دارد که حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد این باکتری‌ها بیماری‌زا هستند (Nolan *et al.*, 2013). در جمعیت‌های زیاد پرنده‌گان در فارم‌های پرورشی بعضاً به دلیل فعالیت زیاد پرنده‌گان و رطوبت پایین بستر و تهویه نامناسب، در اثر گرد و غبار ناشی از فضولات پرنده‌گان، این باکتری بیماری‌زا به دستگاه تنفس و گوارش ورود می‌یابد. با ورود و گسترش آن در بدن پرنده، بیماری کلی‌باسیلوز با دامنه وسیعی از علائم ممکن است مشاهده گردد. علاوه بر آن، ورود باکتری از طریق آب و دان آلوده به مدفوع نیز امکان‌پذیر است و از این طریق باکتری شرایط ورود به دستگاه گوارش را

رؤیت شدن پرگنه های لاکتوز مثبت (صورتی رنگ)، از پرگنه های مشکوک بر روی محیط اوزین متیلن بلو (EMB) به صورت خطی کشت داده شده و به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد انکوبه شد. پرگنه های لاکتوز مثبت که بر روی محیط EMB ایجاد جلای سبز فلزی نمودند به صورت اولیه به عنوان باکتری اشريشيا کلی شناسایی شدند. سپس بر روی این پرگنه ها آزمون های افتراقی IMVIC انجام شد. مواردی که از لحاظ آزمون های بیوشیمیایی تولید ایندول، احیای متیل رد، VP و احیای سیترات به صورت مثبت، منفی بودند به عنوان اشريشيا کلی شناسایی شدند (زین الدینی و همکاران، ۱۳۹۴). آزمون حساسیت آنتی بیوتیکی (آنتی بیوگرام) به روش دیسک دیفیوژن (کربی بائر)

پس از تأیید باکتری و تهییه کشت خالص از باکتری جدا شده با روش آنتی بیوگرام به حساسیت باکتری نسبت به داروهای مختلف آنتی بیوتیکی پرداخته شد. به شکل تصادفی مقاومت آنتی بیوتیکی در ۱۳ جدایه از هر گروه بررسی شد.

در مطالعه اخیر از دیسک های آنتی بیوگرام شرکت پادتن طب شامل کوتیریموکسازول (سولفامتوکسازول و تری متورپریم) (SXT) (۱/۲۵+۲۳/۷۵ میکرو گرم)، جنتامایسین (GM) (۱۰ میکرو گرم)، سیپروفلوکسازین (CP) (۵ میکرو گرم)، پنی سیلین G (P) (۱۰ واحد)، اریترو مایسین (E) (۱۵ میکرو گرم)، سفالکسین (CN) (۳۰ میکرو گرم)، فسفومایسین (FOS) (۲۰۰ میکرو گرم)، داکسی سایکلین (D) (۳۰ میکرو گرم) استفاده شد.

نتایج

صرف نظر از مصرف یا عدم مصرف آنتی بیوتیک در صد موارد مقاومت آنتی بیوتیکی در جدایه های مدفوعی به طور معنی دار بیشتر از سویه های جدا شده از لاشه بوده است ($p < 0.05$) (جدول ۱).

(Persoons *et al.*, 2012) مشکل محدودیت مصرف آنتی بیوتیک ها را ندارند استفاده از آنتی بیوتیک های محرك رشد و بعضًا مصرف آنتی بیوتیک به عنوان پیش گیری و حتی درمان می تواند بر میزان آلودگی بار میکروبی دستگاه گوارش مؤثر باشد اما پرنده گانی که مصرف آنتی بیوتیک دارند خطر احتمال بقایای آنتی بیوتیکی در گوشت و احتمال انتقال ژن های مقاومت از آنتی بیوتیک دو راز ذهن نیست (Rahimi, Hammerum and Heuer, 2009, 2013) در حقیقت، این تحقیق طراحی گردیده است تا الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در جوجه های پرورش یافته در شرایط عادی و جوجه های پرورش یافته با آنتی بیوتیک مورد مقایسه قرار گیرد.

روش کار

نمونه گیری

در تابستان ۱۳۹۳، به مدت ۶ ماه، ۱۰ عدد مرغداری واقع در استان اصفهان که به شکل عادی پرورش جوجه گوشتی داشتند پایش شدند و اطلاعات پایه شامل تغذیه، نوع و زمان رخداد بیماری ها و داروهای مصرفی در طول دوره پرورش ثبت شد. سپس در پایان دوره پرورش در محیط کشتارگاه به ازای هر فارم ۵ قطعه پرنده به شکل تصادفی نمونه گیری شد. در همین بازه زمانی با کسب اطلاع قبلی از ۵ فارم پرورش مرغ بدون آنتی بیوتیک نیز با شرایط ذکر شده نمونه گیری شد. از هر فارم حداقل ۵ نمونه دوتایی شامل یک قطعه عضله سینه مرغ و محتویات کامل یک سکوم پس از تخلیه امعا و احشا نمونه گیری شد. نمونه ها در ظروف مجزا جمع آوری شد و در کنار بیخ منتقل گردید.

شناسایی باکتری اشريشيا کلی

به منظور شناسایی باکتری اشريشيا کلی در نمونه مورد نظر با سواب یا انس استریل در کنار شعله با تلقیح بر روی نمونه مورد نظر بر روی محیط کشت مک کانگی به صورت خطی کشت داده شد و به مدت ۲۴ ساعت در انکوباتور ۳۷ درجه سانتی گراد نگهداری شد. در صورت

جادا شده از طیور پرورش یافته در شرایط عادی نسبت به ۵۰٪ آنتیبیوتیک‌های آزمون شده مقاومت دارند اما در مورد سویه‌های جدا شده از مدفوع این شاخص تفاوت معنی دار ندارد.

در سویه‌های جدا شده از گوشت طیور عادی نمونه‌ها به ۱۰۰٪ آنتیبیوتیک‌های آزمون شده مقاوم هستند و ۱۵/۴٪ فقط به یک آنتیبیوتیک حساس هستند اما در مورد سویه‌های جدا شده از گوشت طیور بدون آنتیبیوتیک همگی حداقل به ۲ آنتیبیوتیک آزمون شده حساس بودند.

در مورد سویه‌های جدا شده از مدفوع طیور عادی ۴۶/۱۵٪ سویه‌ها فقط به یک آنتیبیوتیک حساس هستند، اما در مورد سویه‌های جدا شده از مدفوع طیور بدون آنتیبیوتیک تنها ۷/۷٪ سویه‌ها فقط به یک آنتیبیوتیک حساس هستند که این اختلاف از نظر آماری معنی دار است ($p < 0.05$).

درصد مقاومت آنتیبیوتیکی در اشریشیا کلی جدا شده از لشه و مدفوع نسبت به هر یک از آنتیبیوتیک‌های آزمون شده در جدول شماره ۱ آمده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد در بین آنتیبیوتیک‌های آزمون شده، بیشترین مقاومت آنتیبیوتیکی در مورد پنی سیلین و اریتروماسین و کمترین مقاومت آنتیبیوتیکی در مورد جنتامایسین مطرح است. مقایسه میزان مقاومت به ۵۰٪ آنتیبیوتیک‌های آزمون شده نشان می‌دهد ۸۴/۶٪ سویه‌های جدا شده از گوشت طیور عادی و ۵۳/۸٪ سویه‌های جدا شده از گوشت طیور بدون آنتیبیوتیک نسبت به ۵۰ درصد آنتیبیوتیک‌های آزمون شده مقاومت نشان داده‌اند که این اختلاف از نظر آماری معنی دار است ($p < 0.05$) (جدول ۱).

در مورد سویه‌های جدا شده از مدفوع نیز این الگو وجود دارد به طوری‌که ۱۰۰ درصد سویه‌های جدا شده از مدفوع طیور و آنتیبیوتیک و ۹۲/۳٪ سویه‌های

جدول ۱- درصد مقاومت آنتیبیوتیکی در جایه‌های اشریشیا کلی

آنتیبیوتیک‌ها									گروه‌ها
گوشت طیور بدون آنتیبیوتیک	گوشت طیور پرورش یافته در شرایط عادی	جایه‌های مدفوعی طیور بدون آنتیبیوتیک	جایه‌های مدفوعی طیور پرورش یافته در شرایط عادی						
۸۴/۷۲	۸۴/۷۲	۴۶/۲	۵۳/۹	۴۶/۲	۷/۷	۲۳/۱	۱۵/۴		
۱۰۰	۱۰۰	۶۹/۲۴	۶۹/۲۴	۶۱/۶	۳۰/۸	۴۶/۲	۳۸/۵		
۹۲/۳	۹۲/۳	۶۱/۵۴	۷۶/۹۰	۶۹/۲۴	۲۳/۱	۳۸/۴۷	۳۰/۷۷		
۱۰۰	۱۰۰	۷۶/۹۰	۷۶/۹۰	۸۴/۶۲	۵۳/۸۵	۶۹/۲۴	۵۳/۸۵		

در مورد مقاومت آنتیبیوتیکی در اشریشیا کلی جدا شده از مدفوع نیز متوسط درصد مقاومت در طیور دارای مصرف آنتیبیوتیک به‌طور معنی دار بیشتر از طیور بدون مصرف آنتیبیوتیک بوده است (۷۶/۹٪ در مقابل ۶۰/۵٪) که این اختلاف نیز از نظر آماری معنی دار است ($p < 0.05$) (جدول ۲).

متوسط مقاومت آنتیبیوتیکی در اشریشیا کلی جدا شده از گوشت طیوری که از آنتیبیوتیک استفاده کردند ۶۴/۴ درصد و متوجه مقاومت آنتیبیوتیکی در اشریشیا کلی جدا شده از گوشت طیوری که در طول دوره‌ی پرورش مصرف آنتیبیوتیکی نداشته‌اند ۴۵/۲ درصد است که این اختلاف از نظر آماری معنی دار است ($p < 0.05$) (جدول ۲).

جدول ۲- فراوانی مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه‌های اشريشیا کلی جدا شده از گوشت مرغ طیور بدون آنتی بیوتیک و پرورش یافته در شرایط عادی

سویه‌های جدا شده از گوشت بدون آنتی بیوتیک	از گوشت عادی	سویه‌های جدا شده از مدفع طیور بدون آنتی بیوتیک	سویه‌های جدا شده از مدفع طیور عادی	میانگین فراوانی مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک
۶/۱۵	۴/۸۶	۵/۱۵	۳/۶۱	میانگین درصد مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک
۷۶/۸۷	۶۰/۷۵	۶۴/۳۷	۴۵/۱۲	میانگین درصد مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک

بحث

و همکاران در سال ۲۰۱۰ در بلژیک، حدود ۴۱ درصد مقاومت در سویه‌های اشريشیا کلی جدا شده از کلواک جوجه گوشتی را گزارش کرد. با توجه به عدم وجود مجوز قانونی در ارتباط با مصرف سفالوسپورین‌ها از سال ۲۰۰۰ در بلژیک، به نظر می‌رسد استفاده نادرست از سفالوسپورین‌ها و یا استفاده از سایر گروه‌های آنتی-بیوتیکی مشابه مسئول رخداد این مقاومت باشد (Persoons et al., 2012). در ایران نیز اگرچه به‌طور رسمی از دسته دارویی سفالوسپورین‌ها (به استثنای اکسنل برای عفونت کیسه زرد در اوایل دوره پرورش) استفاده نمی‌شد اما وجود ۶۰٪ مقاومت نسبت به سفالکسین نگرانی وجود مقاومت نسبت به سفالوسپورین‌ها را ایجاد کرده است. به‌حال این مقاومت بالای آنتی بیوتیکی در فلور و باکتری‌های بیماری‌زای با منشأ طیور می‌تواند وضعیت مقاومت آنتی بیوتیکی را در انسان تحت تأثیر قرار بدهد. به‌طوری‌که Price و همکاران سال ۲۰۰۷ این فرضیه را مطرح کردند که افراد در تماس با پرنده‌گان در معرض خطر کلونیزه شدن اشريشیا کلی مقاوم به آنتی بیوتیک هستند به‌طوری که در این مطالعه نشان داده شده ۵۰٪ افرادی که با سویه‌های مقاوم به جنتامايسین مواجه بوده‌اند، دارای مقاومت نسبت به جنتامايسین بودند در حالی که میزان مقاومت به جنتامايسین در افراد عادی ۳-۶٪ گزارش شده است. به‌حال به نظر می‌رسد الگوی مقاومت دارویی در انسان تحت تأثیر الگوی مقاومت در باکتری‌های با منشأ دام و طیور باشد که از طریق تماس، آماده‌سازی و طبخ محصولات

در مطالعه اخیر مقاومت آنتی بیوتیکی نسبت به ۸ دسته آنتی بیوتیک در نمونه‌های گوشت و دستگاه گوارش مرغ در دو حالت شرایط عادی و پرورش بدون آنتی بیوتیک بررسی شده است. ۸ آنتی بیوتیک انتخاب شده از ۸ دسته دارویی متفاوت و عموماً از داروهای متداول در درمان انسان و طیور بوده است تا رابطه بین داروهای مصرفی در طیور و وجود مقاومت دارویی در گوشت بررسی شود. نتایج کلی این مطالعه نشان می‌دهد که اشريشیا کلی جدا شده از گوشت مرغ در دو حالت مورد مطالعه نسبت به آنتی بیوتیک‌ها مقاومت بالایی دارند که برخی از این آنتی بیوتیک‌ها به‌ندرت در صنعت پرورش طیور به‌طور رسمی استفاده می‌شود. به‌حال با توجه به گستردگی استفاده از آنتی بیوتیک‌ها در پرورش طیور به دلیل آلودگی‌های مکرر باکتریایی در طول دوره پرورش، وجود این مقاومت بالای آنتی بیوتیکی را می‌توان به استفاده گستردگی از آنتی بیوتیک‌های مختلف و به‌ویژه آنتی بیوتیک‌های انسانی در طیور نسبت داد. از طرفی از آنجایی که بسیاری از آنتی بیوتیک‌های مورد بررسی وضعیت طیور کمتر استفاده می‌شوند انتقال ژن مقاومت از باکتری‌های مقاوم به حساس را می‌توان از دلایل آن بر شمرد. به‌حال مقاومت آنتی بیوتیکی در جدایه‌های اشريشیا کلی محدود به یک منطقه یا کشور نیست. Millman و همکاران در سال ۲۰۱۳ در آمریکا نشان داد که ۳۰٪ جدایه‌های طیور نسبت به تتراسایکین و سفارولین و ۲۴ درصد نسبت به آمپیسیلین و جنتامايسین مقاوم هستند (Millman et al., 2013). همچنین

استفاده می‌شود. اریترومایسین عموماً در درمان مایکوپلاسمها استفاده می‌شود و اثر قابل توجهی روی اشريشیا کلی ندارد بنابراین مقاومت بالای این دارو را می‌توان به مقاومت ذاتی اشريشیا کلی در مقابل این آنتی‌بیوتیک‌ها نسبت داد. به‌حال اگر چه گزارش‌های محدودی است که بیان می‌کند اریترومایسین و پنی سیلین می‌توانند علیه برخی از باکتری‌های گرم منفی اثر جزئی داشته باشند اما این مطالعه نشان داد که این دو دارو اثری بر باکتری اشريشیا کلی ندارند.

در درجه بعدی مقاومت، بیشترین مقاومت نسبت به فسفومایسین و داکسی سایکلین وجود دارد. اگر چه گفته شده که فسفومایسین مستعد مقاومت نیست اما مصرف بیش از حد این دارو طی چند سال گذشته مخصوصاً در سنین پایین منجر به بروز مقاومت در اشريشیا کلی شده است. علاوه بر آن، مصرف گستردگی تتراسایکلین در طی دهه‌های گذشته و از طرفی امکان مقاومت متقطع بین تتراسایکلین و داکسی سایکلین این دارو را نیز مستعد مقاومت بالا نموده است. مقاومت بالا نسبت به گروه سایکلین‌ها در گزارش‌های متعدد از ایران و خارج از کشور آمده است.

با توجه به مصرف گستردگی ترکیبات سولفانامیدی با تری متیپریم به شکل همراه با سایر ترکیبات آنتی‌بیوتیکی در درمان بیماری‌های طیور وجود ۴۰٪ مقاومت نسبت به این دسته دارویی دور از انتظار نیست اما از آنجایی که نوع ترکیب مورد استفاده در طیور به شکل کوتیریموکسازول نیست بنابراین شاید بررسی الگوی مقاومت سولفانامیدی در مورد ترکیباتی که به شکل عادی استفاده می‌شوند بسیار بیشتر باشد اما به‌طورکلی مصرف ترکیبات سولفانامیدی در پرورش طیور باعث افزایش مقاومت نسبت به کوتیریموکسازول شده است. در همین رابطه Lanz و همکاران در سال ۲۰۰۳ در سوئیس بیشترین مقاومت را در ۱۲۳ سویه جدا شده از مرغان تخم‌گذار نسبت به سایکلین‌ها و سولفانامیدها نشان دادند.

Persoons et al., 2012) گوشتی به انسان منتقل می‌شود (2012). شاهد بر این ادعا گزارش از اروپاست که نشان می‌دهد از سال ۱۹۹۷ که مصرف آووپارسین در صنعت طیور و خوک در اروپا ممنوع شد مقاومت نسبت به وانکومایسین در جدایه‌های بیمارستانی از ۱۲ به ۶ و از ۶ به ۳ درصد کاهش یافت (Al-Ghamdi et al., 1999).

مقایسه نتایج مربوط به مقاومت دارویی در شرایط پرورش بدون آنتی‌بیوتیک و شرایط پرورش عادی نشان می‌دهد که درصد مقاومت به آنتی‌بیوتیک در شرایط بدون آنتی‌بیوتیک به‌طور معنی‌دار پایین‌تر است اما در هر دو سیستم پرورش و حتی در زمانی که از آنتی‌بیوتیک در پرورش جوجه‌ها استفاده نشده است مقاومت آنتی‌بیوتیکی دیده می‌شود. در این خصوص چند فرضیه مطرح شده است. یکی از دلایل اصلی آن می‌تواند بقای کلون‌های مقاوم به برخی از آنتی‌بیوتیک‌ها در مزارع باشد به‌طوری که استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها در دوره‌های قبلی پرورش باعث بقای کلون‌های مقاوم در مزرعه شده باشد (Luangtongkum et al., 2006) فرضیه مطرح است که اجزای جیره غذایی مورد استفاده در تغذیه طیور می‌توانند به باکتری‌هایی آلوه باشند که منشأ مقاومت در فلور نرمال دستگاه گوارش دام و طیور باشند (Al-Ghamdi et al., 1999) بر آن اخیراً مشخص شده است که گاهی اوقات فاکتورهای دیگر مانند مقاومت نسبت به فلزات سنگین مثل جیوه و کادمیوم با تعیین‌کننده‌های مقاومت آنتی‌بیوتیکی در یک قسمت مشترک ژنومی قرار دارند که در توزیع و ماندگاری مقاومت آنتی‌بیوتیکی در Sorum and Sunde, (2001).

در مطالعه حاضر حاضر بیشترین مقاومت دارویی نسبت به پنی سیلین و اریترومایسین وجود دارد. از آنجایی که پنی سیلین به‌ندرت در عفونت‌های باکتریایی طیور

طیور می‌تواند در انتخاب بهتر داروهای مصرفی در پرورش طیور کمک کنند و نوع سیستم پرورش شامل استفاده یا عدم استفاده از آنتی بیوتیک می‌تواند در مقاومت آنتی بیوتیکی حتی در فارم‌های گوشتی با طول دوره پرورش کوتاه نیز مؤثر باشد.

منابع

1. زین الدینی، ا.، غلامی آهنگران، م، رحیمی، ا. (۱۳۹۴). ارزیابی جمعیت اشریشیا کلی روده و گوشت مرغ با اضافه سازی آویشن و دارچین به خوارک طیور. میکروب شناسی مواد غذایی، جلد ۶، شماره ۲، صفحات ۲۹-۳۷.
2. عرفانی، ا.، صدری، ر.، چوبینه ح.، میرصالحیان، ا. آستی، ا.، عین الهی، ن.، میرافشار، م.، یزدان بد، ح.، حمیدیان، م.، و سلطانیان ع. (۱۳۸۷). مقایسه دو روش E-test و دیسک دیفیوژن آگار در تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی سویه‌های اشریشیا کلی جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی تهران. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، جلد ۱۵، شماره ۲، صفحات ۲۷-۳۲.
3. Al-Ghamdi, M.S., El-Morsy, F., Al-Mustafa, Z.H., Al-Ramadhan, M. and Hanif, M. 1999. Antibiotic resistance of *Escherichia coli* isolated from poultry workers, patients and chicken in the eastern province of Saudi Arabia. *Trop Med Inter Health.* 4(4): 278-283.
4. Blair, J.M.A., Webber, M.A., Baylay, A.J., Ogbolu, D.O. and Piddock, L.J.V. 2015. Molecular mechanisms of antibiotic resistance. *Nature Rev Mic.* 13: 42-51.
5. Hammerum, A.M. and Heuer, O.E. 2009. Human Health Hazards from antimicrobial-Resistant *Escherichia coli* of Animal Origin. *Clinic Inf Dis.* 48:916-21.
6. Lanz, R., Kuhnert, P. and Boerlin, P. 2003. Antimicrobial resistance and resistance gene determinants in clinical *Escherichia coli* from different animal species in Switzerland. *Vet Mic.* 91: 73-84.

وجود ۴۶٪ مقاومت نسبت به سیپروفلوکسازین در سویه‌های اشریشیا کلی جدا شده از گوشت نشان‌دهنده مصرف گسترده فلوروکینولون‌ها در صنعت طیور است به طوری که طبق اطلاعات منتشر شده بیشترین درصد داروی آنتی بیوتیک مصرفی جهت درمان طیور مربوط به این خانواده است اگر چه در حال حاضر کمتر از ترکیب سیپروفلوکسازین در درمان طیور به طور رسمی استفاده می‌شود اما استفاده گسترده از سایر داروهای هم خانواده بهویژه انزوفلوکسازین می‌تواند عامل این مقاومت باشد قبل از اینکه و دسته گلی در سال ۲۰۰۷ نشان دادند که مقاومت اشریشیا کلی جدا شده از گوشت نسبت به سیپروفلوکسازین ۴۲٪ است. همچنین عرفانی و همکاران در سال ۱۳۸۷ با بررسی اشریشیا کلی جدا شده از عفونت‌های بیمارستانی نشان دادند که ۴۳٪ مقاومت نسبت به سیپروفلوکسازین وجود دارد.

جنتامایسین یکی از گزینه‌های دارویی همراه با ترکیبات بتالاکتام در درمان بیماری‌های عفونی انسان است. این دارو چون به شکل تزریقی است به ندرت در صنعت پرورش طیور استفاده می‌شود. بهره‌حال وجود ۳۰ درصد مقاومت نسبت به جنتامایسین نشان‌دهنده استفاده نادرست از آمینوگلیکوزیدها بهویژه جنتامایسین در برخی از فارم‌های طیور است. به هر حال گزارشی وجود دارد که مقاومت نسبت به این دارو در درمان بیماری‌های عفونی کلیوی ۲۲٪ بیان می‌کند (عرفانی و همکاران، ۱۳۸۷) که حاکی از قربات بالای مقاومت دارویی در فلور گوشت مصرفی و موارد بیمارستانی است.

به طور کلی از آنجایی که یکی از روش‌های ایجاد مقاومت انتقال پلاسمید مقاومت بین سویه‌های غیر بیماری‌زا و بیماری‌زا اشریشیا کلی و بین سویه‌های اشریشیا کلی و سایر باکتری‌های آنتروباکتریاسه مانند سالمونلا امکان‌پذیر است (Blair et al., 2015)، بنابراین بررسی مقاومت دارویی در فلور گوشت و دستگاه گوارش دام و

- Glisson, J.R., McDougald, L.R., Venugopal, N., Nolan, L. (eds.), Disease of Poultry. 13th edition, Wiley-Blackwell, Massachusetts, pp. 751-807.
12. Persoons, D., Dewulf, J., Smet, A., Herman, L., Heyndrickx, M., Martel, A., Catry, B., Butaye, P. and Haesebrouck F. 2012. Antimicrobial use in Belgian broiler production. *Prev Vet Med.* 105(4): 320-325.
13. Price, L.B., Graham, J.P., Lackey, L.G., Roess, A., Vailes, R. and Silbergeld, E. 2007. Elevated risk of carrying gentamicin-resistant *Escherichia coli* among U.S. poultry workers. *Environ. Health Persp.* 115: 1738-1742.
14. Rahimi, M. 2013. Antibioresistance profile of avian pathogenic *Escherichia coli* isolates recovered from broiler chicken farms with colibacillosis in Kermanshah province, Iran. *Glob Vet.* 10(4):447-452.
15. Sorum, H. and Sunde M. 2001. Resistance to antibiotics in the normal flora of animals. *Vet Res.* 32: 227-241.
7. Lee Ventola C. 2015. The Antibiotic Resistance Crisis: Part 1: Causes and Threats. *Pharm Therap.* 40(4): 277-283.
8. Luangtongkum, T., Morishita, T.Y., Ison, A.J., Huang, S., McDermott, P.F. and Zhang, Q. 2006. Effect of Conventional and Organic Production Practices on the Prevalence and Antimicrobial Resistance of *Campylobacter* spp. in Poultry. *Appl Environ Mic.* 72(5): 3600-3607.
9. Millman, J.M., Waits, K., Grande, H., Marks, A.R., Marks, J.C., Price, L.B., & Hungate, B. A. 2013. Prevalence of antibiotic-resistant *E. coli* in retail chicken: comparing conventional, organic, kosher, and raised without antibiotics. *F1000Research*, 2:155.
10. Moniri, R., Dastehgoli, K. 2007. Antimicrobial resistance among *Escherichia coli* strains isolated from healthy and septicemic chickens. *Pak J Biol Sci.* 10 (17): 2984-7.
11. Nolan, L.K., Barnes, H.J., Vaillancourt, J.P., Abdul-Aziz, T. and Logue, C.M. 2013. Colibacillosis. In: Swayne, D.E.,

The comparing of antibiotic resistance pattern in *Escherichia coli* isolates from chicken meat that reared under conventional and without antibiotic condition

Shahiri MR¹, Gholami-Ahangaran M^{2*}, Rahimi E³

1. Graduated of Veterinary Medicine Faculty, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.

2. Department of clinical sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.

3. Department of Food hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.

*Corresponding author: mgholamia1388@yahoo.com

Received: 7 August 2017

Accepted: 7 December 2017

Abstract

The use of antibiotics in chicken farming is one of the main concerns for consumers since these compounds are usually administrated to control microbial infections in poultry. For comparing the antibiotic resistance pattern in *Escherichia coli* (*E. coli*) isolated from different growing conditions (conventional and without antibiotic), the *E. coli* strains were isolated from chicken meat and cecal content of chickens in Isfahan Province. After purification of *E.coli* strains on specific bacterial culture, and approve of bacterial strains according to biochemical tests, the isolates were cultured on Mueller-Hinton culture. The antibiotic resistance pattern was examined by disc-diffusion agar test. The results showed that the antibiotic resistance to different medicinal and veterinary antibiotics has occurred in two different growing conditions but the antibiotic resistance was lower in the chickens raised with no antibiotic use than conventionally raised chickens.

Keywords: *Escherichia coli*, Isfahan, without antibiotic chicken.