

## اثربخشی شناخت درمانی گروهی و رفتار درمانی دیالکتیکی گروهی بر سلامت عمومی دانشجویان

سعید نجارپور استادی<sup>۱</sup> و جواد خلعتبری<sup>۲</sup>

دریافت مقاله March 14, 2016

پذیرش مقاله Des 30, 2016

از آنجا که احساس سلامت در افراد، بهبود عملکرد روانی، اجتماعی، شغلی و خانوادگی را فراهم می-آورد؛ هدف پژوهش حاضر، مقایسه‌ی اثر بخشی شناخت درمانی گروهی و رفتار درمانی دیالکتیکی گروهی بر سلامت عمومی دانشجویان بود. بدین منظور، طی یک مطالعه‌ی نیمه آزمایشی<sup>۳</sup> دانشجو به صورت در دسترس از نظر سلامت عمومی بررسی و از بین آنها ۴۵ نفر که بالاترین نمره را اخذ کرده بودند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل کاربندی شدند. گروه اول به مدت هشت جلسه‌ی دو ساعته تحت رفتار درمانی دیالکتیکی و گروه دوم به همان نحو تحت شناخت درمانی قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ گونه آموزشی دریافت نکرد. آزمودنی‌ها در آخرین جلسه‌ی آموزش مجدد از نظر سلامت عمومی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که پس از تعديل نمرات پیش آزمون، بین میانگین‌های نمرات سه گروه در پس آزمون، تفاوت معناداری وجود دارد. بررسی میانگین‌های تعديل شده نیز نشان از اثر بخشی آموزش مهارت‌های شناخت درمانی در مقایسه با آموزش مهارت‌های رفتار درمانی دیالکتیکی داشت. بنابراین می‌توان گفت که روش شناخت درمانی بر افزایش سلامت عمومی دانشجویان تاثیر داشته است اما، روش رفتار درمانی دیالکتیکی، بهبودی معناداری در سلامت آزمودنیها ایجاد نکرده است.

**واژه‌های کلیدی:** شناخت درمانی، رفتار درمانی دیالکتیکی، سلامت عمومی

### مقدمه

سلامتی به منزله‌ی حقوق انسانی و نیز یک هدف اجتماعی برای کل دنیا محسوب شده و جهت ارضای نیازهای عمدی و ارتقای کیفیت زندگی بشر مورد توجه قرار گرفته است (بوتین و گریفین، ۲۰۰۴). سازمان بهداشت جهانی<sup>۳</sup> پیش‌بینی کرده است که تا سال ۲۰۲۰ میلادی، اختلالات خلقی دومین بیماری شایع در جهان خواهد بود (از صادقیان، فرهادی نسب و فلاحتی نیا، ۲۰۰۹). سلامت روان، به عنوان بارزترین خصوصیت دوره‌ی نوجوانی و جوانی، در اغلب مواقع نظر پژوهشگران را به

۱. دپارتمان روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران (نویسنده‌ی مسؤول) saeedno@live.com

۲. دپارتمان روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران.

3. world health organization

خود جلب کرده است (آدامز، ۲۰۰۸) زیرا پرداختن به موضوع سلامت روان دانشجویان ارتباط مستقیمی با پیشرفت تحصیلی آنها دارد (قری، محمد بیگی و محمد صالحی، ۲۰۱۰) و از ضروریات اساسی زندگی دانشجویی است. در ضمن، پرداختن به آن شرط اساسی در بهره وری بهینه از نیروهای کارآمد و تحصیل کرده است (دوارته، ۲۰۰۲). روابط بین فردی بهنجار، از ویژگی‌های مهم سلامت روان افراد قلمداد می‌شود و این موضوع آنقدر مهم است که روان درمانگرها در تعیین سطح سلامتی روان شناختی افراد، از آن بهره می‌برند (ریگر، فان بورن، بیشاب، تانوفسکی-کراف و همکاران، ۲۰۱۰). از آنجا که احساس سلامت در افراد، بهبود عملکرد روانی، اجتماعی، شغلی و خانوادگی را فراهم می‌آورد (ساراسون و ساراسون، ۲۰۰۸)، بنابراین بهبود وضعیت بهداشت روان دانشجویان علاوه بر تضمین موقیت‌های تحصیلی، می‌تواند روابط بین فردی آنها را نیز بهبود بخشیده و منجر به بالندگی آنان شود.

رفتار درمانی دیالکتیک، برای درمان طیف وسیعی از اختلالات روان‌شناختی استفاده می‌شود که از آن جمله به درمان اختلالات شخصیت (وزیری و لطفی کاشانی، ۲۰۱۴؛ سولر، پاسکال، تیانا، باراچینا و همکاران، ۲۰۰۹) و سو مصرف مواد (لینهان، دایمف، رینولدز، کومتویس و همکاران، ۲۰۰۲) می‌توان اشاره کرد. اثر بخشی این روش در مورد اختلالات خلقی و هیجانی نیز محرز شده است (چو، ۲۰۰۶). در این روش، سعی بر آن است که ابتدا فعالیت‌های فرد تحت کنترل درآید، سپس مهارت‌های رفتاری به وی آموزش داده شود تا احساس بهتر بودن در او ایجاد شود و بتواند بر مشکلات زندگی خویش غلبه کند و در نهایت به او کمک شود به دنبال کسب لذت و موفقیت باشد. این روش درمانی، مبنی بر سه رویکرد نظری علوم رفتاری، فلسفه‌ی دیالکتیکی و تمرین‌های ذن<sup>۱</sup> است. این روش درمانی چهار ویژگی ذهن آگاهی فرآگیر<sup>۲</sup>، تحمل پریشانی<sup>۳</sup>، تنظیم هیجانی<sup>۴</sup> و تاثیرگذاری بین فردی<sup>۵</sup> را برای ایجاد تغییر در فرد پیشنهاد می‌کند (لینهان و دکستر-ماز، ۲۰۰۸؛ از پادروند، شریفی درآمدی، بگیان کوله مرز و ویسی، ۲۰۱۳؛ میلر، راتوس و لینهان، ۲۰۰۷؛ میلر و راتوس، ۲۰۰۶). شناخت درمانی نیز بر این فرض استوار است که افکار و شیوه‌ی تعبیر و تفسیر افراد از رویدادها، بیشتر از خود رویدادهای بیرونی بر خلق و روان آنها موثر است و نحوه‌ی ارزیابی افراد در مورد یک رویداد، نقش مهمی در عملکرد هیجانی آنها دارد (هافمن و رینکه، ۲۰۱۰؛ از عزیزی و مومنی، ۲۰۱۴؛ شرر، ۲۰۰۵). در این روش، نقش درمانگر کمک به فرد برای شناسایی تفکر فرد-ویژه‌ی خود و اصلاح آن از طریق به

1.Zen

2.core mindfulness

3.distress tolerance

4.emotion regulation

5.interpersonal effectiveness

کارگیری معیارهای منطقی و تجربی است. شناخت درمانگران، به بیماران یاد می‌دهند تا پیش فرض-های افسردگی‌زا و اضطراب‌آور را زیر سوال ببرند، بنابراین از این طریق آنها را درگیر تفکر علمی و عاقلانه می‌کنند (لی‌هی، ۲۰۱۴). اثر بخشی این روش در درمان برخی اختلالات، از جمله افسردگی بیماران دچار نارسایی قلبی (دکر، موسر، پدن و لنى، ۲۰۱۱) و کاهش هراس اجتماعی (مورتبرگ، کلارارک، ساندین و وستدت، ۲۰۰۷) تایید شده است.

پژوهش‌های متعددی بیانگر اثر بخش بودن هر یک از روش‌های شناخت درمانی و رفتار درمانی دیالکتیکی، در رفع مشکلات و اختلالات افراد است (اهرس و همکاران، ۲۰۱۳؛ بیرامی، هاشمی، بخشی‌پور، محمود علیلو و همکاران، ۲۰۱۴؛ خالقی‌پور و زرگر، ۲۰۱۴؛ حقی، سلیمی، دباغی و ربیعی، ۲۰۱۴؛ جوکار کمال‌آبادی، احمدی، اعتمادی، و همکاران، ۲۰۱۲؛ عزیزی، برجلی و گلنزاری، ۲۰۱۰؛ سولر و همکاران، ۲۰۰۹؛ هارلی، اسپریچ، سافرن، جاکوبو و همکاران، ۲۰۰۸). در پژوهش لینچ مورس، مندلسون و راینز (۲۰۰۳) یافته‌ها نشان داد که رفتار درمانی دیالکتیکی می‌تواند افسردگی افراد میانسال را کاهش دهد. بررسی آسمند، مامی و ولی زاده (۲۰۱۵) مشخص کرد که رفتار درمانی دیالکتیکی منجر به کاهش باورهای غیر منطقی و اضطراب آزمودنی‌ها شده اما، بر کاهش افسردگی موثر نبوده است. در یک مطالعه توسط علوی، مدرس غروی، امین بزدی و صالحی فدردی (۲۰۱۱) نتایج مشخص کرد که رفتار درمانی دیالکتیکی، منجر به افزایش معنی‌دار شاخص‌های ذهن‌آگاهی فراگیر و تحمل پریشانی شده و این امر نیز موجب کاهش افسردگی می‌شود. با توجه به موارد مطرح شده، هدف این پژوهش مقایسه‌ی اثر بخشی آموزش مهارت‌های شناخت درمانی گروهی و رفتار درمانی دیالکتیکی گروهی بر سلامت عمومی دانشجویان بود.

## روش

پژوهش حاضر، یک پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل ۲۴۸ نفر از دانشجویان دانشکده‌ی علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر بود. از این تعداد، ۴۵ نفر که نمره‌ی کل پرسشنامه‌ی سلامت عمومی (GHQ-28)<sup>۱</sup> آنها یک انحراف معیار بالاتر از میانگین بود، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل کاربندی شدند. نمرات اولیه‌ی هر سه گروه به عنوان نمره‌ی پیش آزمون در نظر گرفته شد. پس از جایگزینی افراد در گروه‌های آزمایش و کنترل، آزمودنی‌های گروه اول و دوم به صورت مجزا

به مدت ۸ جلسه‌ی دو ساعته تحت مداخله‌ی رفتار درمانی دیالکتیکی و شناخت درمانی قرار گرفتند، اما، گروه کنترل هیچ گونه مداخله‌ای دریافت نکرد. در هشتمین جلسه، هر سه گروه مجدد به وسیله‌ی پرسشنامه‌ی سلامت عمومی مورد آزمون قرار گرفتند.

پرسشنامه‌ی سلامت عمومی دارای ۲۸ سوال است و به بررسی وضعیت روانی فرد در یک ماه اخیر می‌پردازد. این پرسشنامه، علایم و نشانه‌های جسمانی (سوالات ۱ تا ۷)، اضطراب (سوالات ۸ تا ۱۴)، اختلال در عملکرد اجتماعی (سوالات ۱۵ تا ۲۱) و افسردگی (سوالات ۲۱ تا ۲۸) را بررسی می‌کند. سوالات پرسشنامه چهار گزینه دارد و نمره‌ای بین صفر تا سه به هر یک از پاسخ‌ها تعلق می‌گیرد. نمره گذاری پرسشنامه به شکلی است که با افزایش نمرات، از میزان سلامت عمومی فرد کاسته می‌شود. در یک مطالعه، پایایی کل و مولفه‌های جسمانی، اضطراب، اختلال در عملکرد اجتماعی و افسردگی با روش آلفای کرونباخ به ترتیب  $.89$ ,  $.86$ ,  $.77$ ,  $.80$  و  $.88$  به دست آمد (صادقی موحد و همکاران، ۲۰۱۰). در بررسی بخشایش و دهقانی (۲۰۱۳) نیز برای مولفه‌های فوق و با روش آلفای کرونباخ، ضرایب به ترتیب  $.77$ ,  $.88$ ,  $.82$ ,  $.80$  و  $.93$  به دست آمد.

## روش اجرا

در جدول ۱ محتوای جلسات رفتار درمانی دیالکتیکی و شناخت درمانی ارایه شده است.

**جدول ۱: محتوای جلسات رفتار درمانی دیالکتیکی و شناخت درمانی**

شناخت درمانی	رفتار درمانی دیالکتیکی
اول	<p>تعیین ساختار جلسات، قولان و مقررات، توضیح در مورد تعريف دیالکتیک، اصول و روش‌های تفکر و رفتار به شیوه‌ی دیالکتیک آشنایی با هشیاری فراگیر و حالات ذهنی هیجانی، خردگرایی و منطقی ارایه‌ی تکلیف جلسه بعد.</p> <p>مرور تکالیف جلسه‌ی قبل، آموزش مهارتهای بنادین تحمل آشتنگی از قبیل: روش‌های مختلف توجه برگردانی از رفتارهای خود آسبب رسان، توجه برگردانی از طریق فعالیتهای لذت‌بخش، معطوف کردن توجه به کار یا موضوعی دیگر، ترک موقعيت و...، تدوین برنامه‌ی توجه برگردانی، خود آرامش بخشی، تدوین طرح آرمیدگی، ارایه‌ی تکلیف جلسه بعد.</p> <p>مرور تکالیف جلسه‌ی قبل، ارایه‌ی تکیکهای جستجوی نوسان در یک باور خاص، مقوله بندي تحریکهای شناختی، پیکان رو به پایین، محاسبه‌ی احتمالهای متواالی، حدس زدن فکر، ارایه‌ی تکالیف جلسه‌ی بعد.</p> <p>مرور تکالیف جلسه‌ی قبل، ارایه‌ی تکیکهای تعريف واژه‌ها، تحلیل مزایا و معایب، بررسی شواهد، بررسی کیفیت شواهد، وکیل مدافع، ایفای نقش هر دو جنبه‌ی فکر، تمايز رفتار از شخصیت، تغییر افکار منفی از طریق تغییر رفتار، ارایه‌ی مقابله‌ای برای شرایط ضروری، ارایه‌ی تکلیف جلسه‌ی بعد.</p>
دوم	
سوم	

<p>چهارم مرور تکالیف جلسه‌ی قبل، ارایه‌ی تکیکهای شناسایی مفروضه‌های زیربنایی یا قواعد، چالش با تفکر باید اندیشه‌ی شناسایی باورهای شرطی، بررسی نظام ارزشی، عود مشکل فرضی برای یادگیری، ارایه‌ی تکالیف جلسه‌ی بعد.</p>
<p>پنجم مرور تکالیف جلسه‌ی قبل، ارایه‌ی تکیکهای ایجاد مفروضه‌ها و معیارهای جدید و انطباقی، شناسایی نگرانی‌ها، بررسی مزایا و معایب نگرانی، تبدیل نگرانی‌ها به پیش‌بینی‌ها، بررسی افکار و پیش‌بینی‌های قبلی، ارایه‌ی تکالیف جلسه‌ی بعد.</p>
<p>ششم مرور تکالیف جلسه‌ی قبل، آموزش مهارت‌های بنیادین و پیشرفت نظم بخشی: هیجانها و نحوه‌ی عمل آنها، مهارت‌های نظام بخشی هیجانی، غله بر مانع هیجانهای سالم، کاهش آسیب پذیری جسمی در برابر هیجانهای افزایش هیجانهای مثبت، رویارویی با هیجان، حل مسالم، ارایه‌ی تکالیف جلسه‌ی بعد.</p>
<p>هفتم مرور تکالیف جلسه‌ی قبل، آموزش مهارت‌های بنیادین ارتباط مؤثر: خود-کامبixin، غرقه‌سازی در بلاتکلیفی، ماشین زمان، نادیده گرفتن مشکلات، پذیرش، تحلیل منطقی افکار و باورها، ارایه‌ی تکالیف جلسه‌ی بعد.</p>
<p>هشتم مرور تکالیف جلسه‌ی قبل، آموزش مهارت‌های پیشگویی‌های رفتار منفعل-پرخاشگرانه، تناسب خواسته‌های من و آنها، نسبت خواسته‌ها و بایدها، مهارت آموزی، مهارت‌های کلیدی بین فردی، مانع استفاده از مهارت‌های بین فردی، ارایه‌ی تکالیف جلسه‌ی بعد.</p>

برای تحلیل داده‌ها از روش‌های تحلیل کوواریانس استفاده شد. داده‌ها با نوزدهمین ویرایش نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت.

### یافته‌ها

در جدول ۲ میانگین و انحراف معیار سلامت عمومی در پیش آزمون و پس آزمون به تفکیک گروههای مورد مطالعه ارایه شده است. اطلاعات ظاهری این جدول نشان می‌دهد که میانگین گروههای آزمایش پس از مداخلات، تا حدودی کاهش داشته است. برای مقایسه‌ی میانگین‌ها و آزمودن معنادار بودن این تفاوتها بعد از بررسی مفروضه‌های لازم از تحلیل کوواریانس استفاده کردیم (جدول ۳).

## جدول ۲. مولفه‌های توصیفی نمرات سلامت عمومی در پیش آزمون و پس آزمون گروه‌های مورد مطالعه

کنترل		شناخت درمانی		رفتار درمانی دیالکتیکی		متغیرها	
Sd	M	Sd	M	Sd	M		
۵/۲۵	۳۵/۸۰	۴/۳۸	۳۴/۵۳	۵/۴۲	۳۵/۸۶	پیش آزمون	سلامت
۴/۸۰	۳۴/۹۳	۳/۷۱	۳۰/۹۳	۴/۵۶	۳۳/۸۶	پس آزمون	عمومی

## جدول ۳. خلاصه‌ی تحلیل کوواریانس سلامت عمومی در گروه‌ها

Eta	Sig.	F	MS	df	SS	منبع
۰/۱۶۰	۰/۰۰۸	۷/۸۲۱	۴۴/۷۹۶	۱	۴۴/۷۹۶	مقدار ثابت
۰/۷۰۹	۰/۰۰۰	۹۹/۹۰	۵۷۲/۷۵۷	۱	۵۷۲/۷۵۷	پیش آزمون
۰/۲۳۴	۰/۰۰۴	۶/۲۵۱	۳۵/۸۰۶	۲	۷۱/۶۱۲	بین گروهی
			۵/۷۲۸	۴۱	۲۳۴/۸۴۳	خطا

نتایج جدول ۲ نشان می‌دهد که پس از تعدیل نمرات پیش آزمون، اثر معنی دار عامل بین آزمودنی-های ( $F_{۴,۲}=۶/۲۵$   $P=۰/۰۰۰۵$  Partial  $\eta^2=۰/۲۳۴$ ) گروه‌ها وجود دارد. این نتایج نشان می‌دهد که اثر بخشی متغیرهای مستقل(رفتار درمانی دیالکتیکی و شناخت درمانی) بر متغیر وابسته (سلامت عمومی) معنادار است و می‌توان گفت که رفتار درمانی دیالکتیکی و شناخت درمانی بر سلامت عمومی موثراند.

## جدول ۴. مقایسه‌ی زوجی میانگین متغیر سلامت عمومی در گروه‌های آموزشی

گروهها	رفتار درمانی	شناخت درمانی	تفاوت میانگین	خطای استاندارد	Sig.
دیالکتیکی	کنترل	-۱/۱۱۵	-۰/۸۷۹	۰/۰۳۲	۰/۰۳۲
شناخت درمانی	رفتار درمانی دیالکتیکی	-۱/۹۵۷ <sup>*</sup>	۰/۸۷۹	۰/۰۳۲	۰/۰۰۹
کنترل	کنترل	-۳/۰۷۲ <sup>*</sup>	۰/۸۷۹	۰/۰۰۱	۰/۰۰۱
رفتار درمانی دیالکتیکی	رفتار درمانی دیالکتیکی	۱/۱۱۵	۰/۸۷۹	۰/۰۰۹	۰/۰۰۱
شناخت درمانی	شناخت درمانی	۳/۰۷۲ <sup>*</sup>	۰/۸۷۹	۰/۰۰۱	۰/۰۰۱

نتایج جدول ۴ نشان می‌دهد که تفاوت بین شناخت درمانی و رفتار درمانی دیالکتیکی و گروه کنترل معنادار است و این تفاوت به نفع شناخت درمانی است. به عبارت دیگر آموزش مهارت‌های شناخت درمانی، تاثیر بیشتری بر سلامت عمومی آزمودنی‌ها داشته است.

## بحث و نتیجه‌گیری

در سال‌های اخیر، روان‌شناسان و پژوهشگران به بررسی روز افزون علت یا علتهای اختلالات روانی و رفتاری پرداخته‌اند و از این منظر به موضوع نگاه می‌کنند که بسیاری از اختلالات و آسیب‌های افراد ریشه در ناتوانی آنها در تحلیل صحیح و مطلوب از توانایی‌های خویش، عدم احساس کنترل و توانایی فردی برای مقابله با موقعیت‌های سخت زندگی و عدم آمادگی برای حل مشکلات و دشواری‌های زندگی، به روش مناسب دارد. با توجه به تغییرات روز افزون در حوزه‌ی اجتماعی و مشکلات روزمره‌ای که افراد در هر جامعه‌ای با آنها رو به رو هستند، آماده نمودن افراد هر جامعه‌ای برای مقابله با این موقعیت‌ها، موضوعی مهم به نظر می‌رسد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آموزش مهارت‌های شناخت درمانی در افزایش سلامت عمومی آزمودنی‌ها اثر بخش بوده است. این بخش از یافته‌های پژوهش حاضر با پژوهش‌های اهلرس و همکاران(۲۰۱۳)، احمد و وستر(۲۰۰۹)، میچل و همکاران(۲۰۰۹)، تقدسی و همکاران(۲۰۱۴)، خالقی‌پور و زرگر(۲۰۱۴)، عزیزی و مومنی(۲۰۱۴)، عیسی‌زادگان و همکاران(۲۰۱۳)، پندیدن و کاکو جویباری(۲۰۱۳) و شرفی و همکاران(۲۰۱۳) همسو است اما، با نتایج پژوهش‌های بیرامی و همکاران(۲۰۱۴) و همتی ثابت و همکاران(۲۰۱۲) ناهمانگ است.

در تبیین این امر، می‌توان اظهار داشت که احتمالاً چون شناخت درمانی بر افکار و شیوه‌ی تعبیر و تفسیر افراد از رویدادها، بیشتر از خود رویدادهای بیرونی تاکید می‌کند(شر، ۲۰۰۵) و در این روش افراد عوامل به وجود آورنده‌ی افسردگی و اضطراب را زیر سوال می‌برند(لی‌هی، ۲۰۱۴) بنابراین می‌توانند با جایگزینی باورهای جدید به جای باورهای قبلی(عزیزی و مومنی، ۲۰۱۴) به نحوی رویدادها را تحلیل کنند که سلامت روان آنان را به خطر نیاندازد و با مشکلات زندگی روزمره به شکل منطقی-تر و معقول‌تری کنار بیایند. همچنین به نظر می‌رسد که شناخت درمانی با تغییر سبک زندگی افراد تغییر در نقش‌ها و در نتیجه تغییر در روابط اجتماعی افراد و نیز منطقی و عینی اندیشه‌ی به جای اغراق درباره‌ی رویدادهای اضطراب برانگیز، به نحو موثری می‌تواند کارکردهای روان‌شناختی افراد را تحت تاثیر قرار دهد. بنابر این می‌توان گفت افرادی که نوع نگاه خود را به رویدادها تغییر می‌دهند و رویدادها را به اشکال مختلف تعبیر و تفسیر می‌کنند، می‌توانند با استفاده از این روش، مهارت‌هایی به دست آورند؛ مانند تعاریف متفاوت از یک مشکل یا مساله‌ی خاص، شکل‌دهی افکار و ایده‌های مختلف و متنوع در مورد یک رویداد خاص، سبک و سنگین کردن تفسیرها در مورد یک رویداد خاص و لحاظ کردن نفع یا زیان هر یک از آنها و در نهایت تصمیم گیری در مورد انتخاب بهترین

تعییر و تفسیر که ناگفته پیداست به فرد، در پشت سر گذاشتن موانع یا حل مسایل کمک می‌کنند. افرادی که دارای این مهارت‌ها هستند، در مقایسه با سایر افرادی که فاقد این خصوصیات‌اند، اعتماد به نفس بالاتر، احساس خودکارآمدی بیشتر و آرامش خاطر زیادی خواهند داشت و استفاده از تجارب قبلی در حل مسایل گوناگون زندگی، از آنها افرادی متکی به خود خواهد ساخت. بدیهی است که همه‌ی این موارد، می‌توانند سلامت عمومی فرد را در سطح بالای نگهداشند.

یافته‌ی دیگر پژوهش این بود که آموزش مهارت‌های رفتار درمانی دیالکتیکی بر افزایش سلامت عمومی دانشجویان موثر نبوده است. این بخش از یافته‌ی پژوهش حاضر با پژوهش‌های جوکار، کمال آبادی و همکاران(۲۰۱۲)، عزیزی و همکاران(۲۰۱۰)، سولر و همکاران(۲۰۰۹)، هارلی و همکاران(۲۰۰۸)، لینچ و همکاران(۲۰۰۳) و زمانی و همکاران(۲۰۱۵) ناهمسوت اما، با بخشی از نتیجه‌ی مطالعه‌ی آسمند و همکاران(۲۰۱۵) هماهنگ است. از آنجا که رفتار درمانی دیالکتیکی تاکید بیشتری بر بهبود مهارت‌های رفتاری دارد و در این روش، کنترل فعالیت‌ها و آموزش مهارت‌های رفتاری از اهمیت بیشتری برخوردار است، بنابراین عدم اثر بخشی آن در افزایش سلامت عمومی آزمودنی‌ها را شاید بتوان این گونه تفسیر کرد، افرادی که بهداشت روان پایینی دارند احتمالاً به دنبال یافتن راه حل‌هایی هستند که در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مشکلات سلامتی آنها را برطرف نمایند و به نظر می‌رسد، تعییر نگاه و افکار نسبت به موضوعات و رویدادها(موضوعی که در شناخت درمانی بر آن تاکید می‌شود)، در دسترس‌تر از تغییرات رفتاری باشد که در طولانی مدت به ثمر می‌نشینند.

#### References

- Abdi masoleh, F., Kaviani, H., KhaghaniZade, M., & Momeni Araghi, A.(2007).The relationship between burnout and mental health among nurses. *Tehran University Medical Journal*, 65(6), 65-75. (Persian).
- Adams, C. J.(2008).Personality predictors of missionary effectiveness. *Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences & Engineering*, 68, 7652.
- Aghajani, M., Taghadosi, M., Rohollah, F., & Raygan, F.(2014). Effect of cognitive therapy on mental health in patients with HF. *Feyz, Kashan University of Medical Sciences & Health Services*, 18(1), 52-59.(Persian)
- Ahmed, M., & Westra, H. A.(2009).Impact of A treatment rationale on expectancy and engagement in cognitive behavioral therapy for social anxiety. *Cognitive Therapy and Research*, 33(3), 314-322.
- Alavi, K., Modarres Gharavi, M., Amin-Yazdi, S.A., & Salehi Fadardi, J.(2011).Effectiveness of group dialectical behavior therapy (based on core mindfulness, distress tolerance and emotion regulation components) on depressive symptoms in university students. *Journal of Fundamentals of Mental Health*, 13, 2, 24-35. (Persian)
- Asmand, P., mami, S., & valizadeh, R.(2015).Effectiveness of Dialectical Behavior Therapy in Irrational Beliefs Treatment, Anxiety, Depression among Young Male Prisoners Who Have Antisocial Personality Disorder. *journal of Ilam university of medical sciences*. 23 (1), 35-44. (Persian)
- Azizi, A., Borjali, A., & Golzari, M.(2010).The effectiveness of emotion regulation training and cognitive therapy on the emotional and additional problems of substance abusers. *Iran Journal Psychiatry*, 5(2), 60-5. (Persian)
- Azizi, M., & Momeni, K.(2014).The effectiveness of cognitive group therapy on reducing depression and anxiety in the Kermanshah older women. *Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences*, 3, 3, 178-187. (Persian)

- Bakhshayesh, A., & Dehghani, F.(2014).Surveying the Relation between D-personality Type, Coping Styles, and General Health.Clinical Psychology & Personality, 2 (9), 43-52. (Persian)
- Beyrami, M., Hashemi, T., Bakhshipour Roodsari, A., Mahmood Aliloo, M., & Eghbali, A.(2014). Comparison of the Effectiveness of Emotion Regulation Training and Mindfulness based Cognitive Therapy in Psychological Distress and Cognitive Emotion Regulation Strategies in Mothers of Children with Mental Retardation. Journal of Psychology, 9, 33, 51- 67.(Persian)
- Botvin, G., & Griffin, K. W.(2004).Life skills training: empirical findings and future directions.Journal of primery prevention. V 25(2), 211-232.
- Chew, C. E.(2006).The effect of dialectical behavioral therapy on moderately depressed adults [microform]:a multiple baseline design, Thesis (Ph. D.),University of Denver.
- Dekker, R. L., Moser, D. K., Peden, A. R., & Lennie, T. A.(2011). Cognitive therapy improves three-month outcomes in hospitalized patients with heart failure. Journal of Cardiac Failure; 18(1), 10-20.
- Duarte, C.M.(2002). Help- seeking behaviors among latino college students. Dissertation Abstract International- B: 63(09), 4366.
- Ehlers, A., Grey, N., Wild, J., Stott, R., Liness, S., Deale, A., Handley, R., Albert, I., Cullen, D., Hackmann, A., Manley, J., McManus, F., Brady, F., Salkovskis, P., & Clark, D.M.(2013). Implementation of cognitive therapy for PTSD in routine clinical care: effectiveness and moderators of outcome in a consecutive sample. Behavior Research Therapy, 51(11), 742-52.
- Ehyakonandeh, M., Shafibabadi, A., & Sudani, M.(2007).The relationship between emotional intelligence and mental health of female students. Knowledge & Research in Applied Psychology, 41, 1-16. (Persian)
- Farahbakhsh, S.(2003).A comparative study of Iranian Ph.D students in relation to their mental health. New Frontiers in Education, 33(1), 63-66.(Persian)
- Fath, N., Azad Fallah, P., Rasool-zadeh Tabatabaei, S. K., & Rahimi, C.(2013).Validity and Reliability of the Inventory of Interpersonal Problems (IIP-32). Journal of Clinical Psychology, 3 , 5(3), 69-80.(Persian)
- Ghamari, F., Mohammadbeigi, A., & Mohammadsalehi, N.(2010).The Association between Mental Health and Demographic Factors with Educational Success in the Students of Arak Universities. Journal of Babol University Medical Science, 12(5), 118-124. (Persian)
- Haggi, A.A., Salimi, S.H., Dabbagh, P., & Rabie, M.(2015).The Effectiveness of Mindfullness Based Cognitive Therapy on Quality of Life in Military Personnel. Nurse and Physician with War. 2, 3, 64-71. (Persian)
- Harley, R., Sprich, S., Safren, S., Jacobo, M., & Fava, M.(2008).Adaptation of dialectical behavior therapy skills training group for treatment-resistant depression. The Journal of Nervous & Mental Disease,196,(2), 136-43.
- Hemmati Sabet, A., Khalatbari, J., & Amini, D.(2012).Comparing the Efficacy of Group Training of Stress Management and Cognitive Group Therapy on Students Social Phobia. Clinical Psychology Studies, 2, 1, 1-22. (Persian)
- Issazadegan, A., Shiekhi, S., Hafeznia, M., & Khademi, A.(2013).The effectiveness of cognitive-behavioral group therapy on reduction of depression symptoms among patients with cancer. Urmia Medical Journal, 24(5), 339-346. (Persian)
- Joukar K, M., Ahmadi, S. A., Etemadi, O., Fatehizadeh, M., Bahrami, F., & Firoozabadi, A.(2012). A study of the effect of couple dialectical behavioral therapy on symptoms and quality of marital relationships and mental health of iranian borderline personality couples: a controlled trial.Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business; Vol. 3 .9, 1480.
- Khaleghipour, Sh., & Zargar. F.(2012).Effect of Mindfulness-based cognitive therapy on depression and life expectancy mentally retarded children. Journal of Research in Behavioral Sciences, 12, 36, 264-275. (Persian)
- khanjani, Z., & bahadori khosroshahi, J.(2012).The Prediction of General Health on the Basis of Body Image, Life Stress and Personality Characteristics. Knowledge & Research in Applied Psychology, 15, 4, 40-47. (Persian)
- Leahy, R. (2010).Cognitive Therapy Techniques. Translated by: Hamidpour, H., & Andoz, Z. Tehran: Arjomand.(Persian)
- Linehan, M. M., Dimeff, L. A., Reynolds, S. K., Comtois, K. A., Welch, S. S., Heagerty, P., & Kivlahan, D. R. (2002).Dialectical behavior therapy versus comprehensive validation therapy plus 12-step for the treatment of opioid dependent women meeting criteria for borderline personality disorder. Drug and Alcohol Dependence, 67, 13-26.
- Lotfi Kashani, F & Vaziri, Sh.(2013). The Effect of Dialectical Behavioral Therapy in Decreasing the Symptoms of Borderline Personality Disorder. 7(28), 27-36. (Persian)

- Lynch, T.R., Morse, J., Mendelson, T., & Robins, C. (2003). Dialectical behavior therapy for depressed older adults: a randomized pilot study. *American Journal of Geriatric Psychiatry*, 11, 33-45.
- Mahmoudi, M., Mohammadzadeh, Sh., Ahmadi, Z., Sahbaee, F., Ahmadi, Z., Mahmoudi, M., Mohammadzadeh Sh., & Sahbaee, F.(2007). Surveying mental health status of nursing and non-nursing students of Shahrood Islamic Azad University. *Medical Science Journal of Islamic Azad University*, 17, 2:107-111. (Persian)
- Mc Kay, M., Wood, J., & Brantley, J.(2014).The Dialectical Behavior Therapy. Translated by: Hamidpour, H., Jomepour, H., & Andoz, Z. Tehran: Arjmand.(Persian)
- Miller, A. M., Rathus, J. H., & Linehan, M. M.(2007). Dialectical behavior therapy with suicidal adolescent, New York: Guilford.
- Mörtsberg, E., Clark, D. M., Sundin, O., & Aberg Wistedt, A.(2007). Intensive group cognitive treatment and individual cognitive therapy vs. treatment as usual in social phobia: a randomized controlled trial. *Acta Psychiatrica Scandinavica*: 115(2), 142-54.
- Padervand, H., sharifidaramade, P., Bagian Kolemarz, J., & Veisiy, N.(2013).Exploring the Effectiveness of Group Dialectical Behavior Therapy on the Life Quality Improvement and Decrease of Oppositional Defiant Disorder in the Students. *Clinical Psychology Studies*, 12, 3, 149-170.(Persian)
- Pandidan, N., & Kakojouybari, A.A.(2013).The effectiveness of cognitive therapy to improve mental health nurses in rehabilitation centers Exceptional Children. *Health Psychology*, 2, 8, 83-95.(Persian)
- Rieger, E., Van Buren, D. J., Bishop, M., Tanofsky-Kraff, M., Welch, R., & Wilfley, D. E. (2010). An eating disorder-specific model of interpersonal psychotherapy (IPT-ED): causal pathways and treatment implications.*Clinical Psychology Review*. 30(4), 400-410.
- Sadeghi Mowahed, F., Molawi, P., Sharghi, A., Narimani, M., Mohammadniya, H., Deylami, P., & Rajabi, S.(2010).On the relationship between coping strategies and mental health of diabetic patients. *Journal of Fundamentals of Mental Health*, 12, 46, 2010, 111-115.(Persian).
- Saki, K.,& Kaikhavani, S.(2002).Mental health of [lam medical university students. *journal of Ilam university of medical sciences*, 10, 34-35, 11-25. (Persian)
- Sarason, B., & Sarason, E.(2006). Abnormal Psychology. Translated by: Asgharimogadam, M.A., Dehgani, M., & Najariyan, B.Tehran: Roshd.(Persian)
- Scherer, K. R. (2005). "What are emotions? And how can they be measured?.*Social Science Information*. 44(4), 693–727.
- Shams Alizadeh, N., Bolhari, B., & Shahmohammadi, D.(2001).Epidemiology of mental disorders in a village in Tehran province. *Iranian Journal of Psychiatry & Clinical Psychology*, 2001, 7(1 and 2), 19-27. (Persian)
- sharafi, A., Sadeghi, K., & Khazaie, H.(2013).The comparison of efficacy pharmacotherapy and group cognitive therapy in dimensions of temperament and character of patients with major depression disorder. *Journal of Kermanshah university of Medical Sciences*, 17, 4, 230-236. (Persian)
- Shavelson, R.(2014). Statistical Reasoning in the Behavioral Sciences. Translated by:Alireza Kiamanesh. Tehran: Jahad-e Daneshgahi.
- Soler, J., Pascual, J.C., Tiana, T., Cebria, A., Barrachina, J., Campins, M.J., Gich, I., Alvarez, E., & Pérez. V.(2009). Dialectical behaviour therapy skills training compared to standard group therapy in borderline personality disorder: a 3-month randomised controlled clinical trial. *Behavior Research Therapy*, 47(5), 353-8.
- zamani, N., Habibi, M., & Darvishi, M.(2015).To Compare the effectiveness of Dialectical Behavior Therapy and Cognitive Behavioral Group Therapy in Reducing Depression in Mothers of Children with Disabilities. *Arak University of Medical Sciences Journal*.2015; 18 (1), 32-42. (Persian)
- Zare, N., Daneshpajoooh, F., Amini, M., Razeghi, M., & Fallahzadeh. (2007).The Relationship between Self-esteem, General Health and Academic Achievement in Students of Shiraz University of Medical Sciences. *Iranian Journal of Medical Education*, 7(1), 59-67. (Persian)
- Zins, J. E., Bloodworth, M. R., Weissberg, R. P., & Walberg, H. J.(2004).The scientific base linking social and emotional learning to school success. In J. Zins, R. Weissberg, M. Wang, and H. J. Walberg (Eds.), *Building academic success on social and emotional learning: What does he research say?* (pp. 3-22). NY: Teachers College Press.

Journal of  
Thought & Behavior in Clinical Psychology  
Vol. 10 (No. 38), pp. 17-26, 2014

**The effectiveness of group cognitive therapy and dialectical behavior therapy  
on students' general health**

Njarpur Ostadi, Said  
**Islamic Azad University, Rasht, Iran**  
Khalatbari, Javad  
**Islamic Azad University, Tonekabon Branch, Tonekabon, Iran**

Received: March 14, 2016

Accepted: Des 30, 2016

Mental health effects general health, psychological well-being, , network of social support and interpersonal relationships and skills. Since feeling of being healthy improve psychological, social, occupational and family performances, this study aims to investigate the effectiveness of group cognitive therapy and dialectical behavior therapy on students' general health. Therefore, in a quasi-experimental study, 250 students were selected through availability method and evaluated for general health. From this, 45 people who had the highest scores were selected and randomly assigned to one control and two experimental groups ( $n=15$ ). The first experimental group received eight two-hour sessions of dialectical behavior therapy and second experimental group received eight two-session of cognitive therapy. The control group received no therapy. In the last session, participants were evaluated again for general health. Analysis of covariance showed that after scores adjustment of pre-test, there are significant differences between the means of three groups' post-test scores. Additionally, examination of adjusted means demonstrated the effectiveness of teaching the cognitive therapy skills in comparison to dialectical behavioral therapy skills. It can be conclude that cognitive therapy is effective in increasing the general health of students; however, dialectical behavior therapy has not made a significant improvement in participants' general health.

**Keywords:** cognitive therapy, dialectical behavior therapy, general health