

بررسی ویژگی‌های روان‌سنجدی سیاهه‌ی شخصیت بزرگسال منطبق با DSM-5

سهراب امیری^۱

دریافت مقاله ۲۷/۱/۲۰۱۷
Jul 27, 2017
پذیرش مقاله ۱۷/۱۲/۲۰۱۷
Dec 17, 2017

با توجه به نگرانی‌های گوناگون در ارتباط با طبقات اختلال شخصیت از زمان نسخه‌ی سوم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی، یک مدل جایگزین اختلال شخصیت در بخش سوم DSM-5 فراهم شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روان‌سنجدی سیاهه‌ی شخصیت-DSM-5 بزرگسال بر روی جامعه‌ی بهنچار بود. برای این منظور ۲۷۸ نفر از دانشجویان به صورت نمونه-گیری خوش‌ای چند مرحله‌ای انتخاب و با سیاهه‌ی شخصیت-DSM-5 بزرگسال، مقیاس سه‌گانه تاریک و پرسشنامه پنج عامل شخصیت مورد آزمون قرار گرفتند. اعتبار ملکی پرسشنامه با دیگر مقیاس‌ها حاکمی از اعتبار تفکیکی و همگرایی مطلوب بود. همچنین ساختار عاملی آن با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی ارزیابی شد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد سیاهه‌ی شخصیت-DSM-5 بزرگسال دارای ۵ عامل است و بررسی اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضرایب آلفا، باز آزمایی و دونیمسازی نشان دهنده‌ی ثبات پرسشنامه بود. در مجموع یافته‌ها نشان داد که سیاهه‌ی شخصیت-DSM-5 بزرگسال دارای ویژگی روان‌سنجدی مطلوبی در نمونه جمعیتی ایرانی است و می‌توان از این ابزار در مطالعات صورت گرفته در فرهنگ ایرانی استفاده کرد. واژگان کلیدی: سیاهه‌ی شخصیت، پنج عامل بزرگ، صفات تاریک، روان‌سنجدی

مقدمه

با توجه به نگرانی‌های گوناگون در ارتباط با طبقات اختلال شخصیت از زمان نسخه‌ی سوم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (انجمن روان‌پژوهشی آمریکا، ۱۹۸۰) مانند فقدان نمرات برش دارای اعتبار تجربی، هم‌ریختی گسترده و عدم ثبات زمانی (ویدیگر و ثورل، ۲۰۰۷)، یک مدل جایگزین اختلال شخصیت^۱ (AMPD) در بخش سوم DSM-5 (AMPD) در بخش سوم (که شامل ملاک‌های اختلال شخصیت محور دوم کلاسیک فهرست شده در بخش دوم DSM-IV) مدل جایگزین اختلال شخصیت DSM-5 مستلزم شواهد مربوط به اختلال خود و کارکردهای بین فردی شخصیت (ملأک A) حداقل در سطح متوسط برای تشخیص اختلال

۱. دپارتمان روان‌شناسی، دانشگاه ارومیه. ارومیه. ایران. Amirysohrab@yahoo.com

شخصیت است. یک مولفه‌ی اصلی (ملاک B) مدل جایگزین اختلال شخصیت-5 DSM، مدل تجربی صفات شخصیت ناسازگارانه است (کروگر و مارکون، ۲۰۱۴). به طور خاص، مدل جایگزین اختلال شخصیت به متخصصان بالینی این امکان را می‌دهد که پنج حیطه‌ی اصلی شخصیت ناسازگارانه شامل عاطفی منفی^۱ (فراوانی و شدت تجربه‌ی سطوح بالای هیجان‌های منفی در گستره‌ی وسیع)، گسلش^۲ (اجتناب از تجارب اجتماعی و هیجانی)، آنتاگونیسم^۳ (رفتارهایی که فرد را در مقابل با دیگران قرار می‌دهد)، عدم بازداری^۴ (جهت‌گیری به سمت ارضای فوری و رفتار تکانشی) و سایکوتیک^۵ (رفتارها و شناخت‌هایی که از نظر فرهنگی غیرعادی، عجیب و غریب و نامعمول است) را در نظر بگیرند.

این مدل بازنمایی کننده مجموعه‌ای از مدل‌های بعدی آسیب‌شناسی شخصیت است، بر روی انواع ناسازگارانه‌ی شخصیت تمکر کرده است (کلارک، ۲۰۰۷؛ هارکنس، مک‌نالتی و بن‌پوراث، ۱۹۹۵؛ ثورل و دورن، ۲۰۰۵؛ ویدیگر و سیمونسن، ۲۰۰۵). اگرچه اجماع نظر وجود دارد که صفات شخصیت برای تشخیص اختلال شخصیت کافی نیست (لیورسلی و جانگ، ۲۰۰۰؛ واک‌فیلد، ۲۰۰۸)، باید توجه داشت که صفات سیاهه‌ی شخصیت DSM-5 صفات شخصیتی ناسازگارانه هستند و نه صفات شخصیتی سازگارانه. در واقع، پنج صفت شخصیتی ناسازگارانه خاص را در بر می‌گیرد با تمکر بر روی قطب‌هایی که با تعاریف کلاسیک اختلال شخصیت مرتبط است. اگرچه ارزیابی سطوح شدت اختلال در خود عملکرد بین فردی شخصیتی نمی‌تواند به سادگی از طریق ارزیابی سطوح صفات اختلال شخصیت مبتنی بر مدل جایگزین اختلال شخصیت DSM-5 انجام شود، اما باید تاکید داشت که صفات شخصیت ناکارآمد بازنمایی کننده‌ی شاخص‌های شناختی، رفتاری و عاطفی ناکارآمدی شخصیتی هستند؛ یعنی هر دو اختلال متوسط تا شدید کارکرد شخصیتی (خود/بین فردی)، وجود یک یا بیشتر صفات شخصیتی آسیب‌شناختی برای تشخیص اختلال شخصیت بر اساس مدل جایگزین اختلال شخصیت DSM-5 ضروری است (اسکودل، ۲۰۱۴).

بر اساس مدل جایگزین اختلال شخصیت کروگر و همکاران سیاهه‌ی شخصیت DSM-5 (PID-5) را شکل دادند؛ PID-5 یک پرسشنامه‌ی خودگزارش‌دهی ۲۲۰ ماده‌ای با طیف پاسخ چهار درجه‌ای است؛ این شامل ۲۵ مقیاس اولیه است که می‌تواند در قالب ۵ عامل سطح بالا (عاطفی منفی، گسلش، آنتاگونیسم، عدم بازداری و سایکوتیک) قرار گیرد. در واقع، ادبیات روبه رشدی شواهد همسانی برای اعتبار مدل صفات DSM-5 فراهم ساخته است همچنان که این صفات در PID-5 عملیاتی شده است.

1. Negative Affectivity
2. Detachment

3. Antagonism
4. Disinhibition

5. Psychoticism

شواهد گستره‌ای نشان می‌دهد که PID-5 قادر است واریانس قابل توجه و پایداری از اختلالات شخصیت DSM-IV را تبیین کند و نیز برای سازه‌های بالینی خاص فراتر از صفات و اختلال‌های شخصیتی قابل کاربرد است (کروگر و مارکون، ۲۰۱۴)؛ علاوه بر این صفات-5 همچنان که در PID-5 عملیاتی شده است می‌تواند در قالب گستره ناسازگارانه‌ی مدل پنج عامل شخصیت در نظر گرفته شود (سوزوکی، سامویل، پاهلن و کروگر، ۲۰۱۵). همچنین مقیاس‌های PID-5 در فراهم ساختن ابعادی برای تشخیص ساختار تجربی آسیب‌شناسی روانی سودمند هستند (رأیت و سیمز، ۲۰۱۴). داده‌ها قویاً از ساختار سلسله مراتبی صفات آسیب‌شناختری PID-5 با یک مدل دوعلاملی (صفت آسیب‌شناسی درون‌سازی و صفت آسیب‌شناسی برون‌سازی) و یک مدل سه عاملی (درونوسازی، برون‌سازی و گسلش) تا مدل پنج عاملی ابعاد شخصیت ناسازگارانه حمایت می‌کنند (رأیت و همکاران، ۲۰۱۲). PID-5 به تعدادی از زبان‌ها شامل فرهنگ‌ایتالیایی ترجمه شده است (فوساتی، کروگر، مارکون، برونی و همکاران، ۲۰۱۳).

یک فرم بسیار کوتاه از PID (PID-5-BF)^۱ برای محققان و متخصصان بالینی در دسترس است (انجمن روانپژوهی آمریکا، ۲۰۱۳ ب). PID-5-BF به عنوان نسخه‌ی تضمینی سنجش مدل جایگزین اختلال شخصیت بیان نشده است. این مقیاس برای غربال‌گری اختلالات احتمالی شخصیت بر اساس ملاک B در DSM-5 طراحی شده است. به عنوان یک مقیاس غربال‌گری آسیب‌شناسی شخصیت، PID-5-BF دارای چندین مزیت بالقوه است. PID-5-BF یک مقیاس ۲۵ ماده‌ای خودگزارش‌دهی صفات شخصیت ناسازگارانه برای هر دو بزرگسال و نوجوان است. ماده‌های PID-5-BF برگرفته از PID خودگزارش‌دهی ۲۲۰ ماده‌ای است و همانند PID-5 بر اساس طیف چهار درجه‌ای نمره‌گذاری می‌شود (انجمن روانپژوهی آمریکا، ۲۰۱۳ ب). از طرفی دسترسی‌پذیری یک مقیاس کوتاه و معتبر غربال‌گری برای ابعاد ناسازگارانه‌ی شخصیت می‌تواند احتمال تشخیص زوردرس آسیب‌شناسی بالقوه شخصیتی را افزایش داده و به دنبال آن ارزیابی رسمی‌تر را انجام داد (نوین، وتنا و شارپ، ۲۰۱۳؛ پاتل، شارپ و فوناگی، ۲۰۱۱).

بنابراین با توجه به اهمیت نقش شخصیت در طیف وسیعی از کارکردهای روان‌شناختری بهنجار و مرضی، نقش مهم آن در سازگاری افراد، بدیع بودن سیاهه‌ی شخصیت-5 DSM بزرگسال و عدم بررسی اعتبار و روایی این ابزار در فرهنگ ایرانی، بررسی خصوصیات روان‌سنگی و ساختار

عاملی با توجه به جامعه‌ی ایرانی، ضروری می‌نماید. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف تهیه‌ی نسخه‌ی سیاهه‌ی شخصیت ۵-DSM بزرگسال و بررسی خصوصیات روان‌سنگی آن انجام شده است.

روش

این پژوهش یک پژوهش توصیفی و روان‌سنگس است. جامعه‌ی آماری مطالعه شامل دانشجویان دانشگاه بولی سینا در سال تحصیلی ۹۵-۹۶ بودند. از این جامعه، ۲۷۸ نفر دانشجو به صورت نمونه‌گیری خوش‌های چند مرحله‌ای انتخاب و بعد از اخذ رضایت‌کتبی با پرسشنامه‌ی سیاهه‌ی شخصیت ۵-DSM، مقیاس سه‌گانه تاریک کوتاه (SD3)^۱، پرسشنامه‌ی پنج عامل شخصیت^۲ (فرم کوتاه ۶۰ سوالی) مورد آزمون قرار گرفتند.

سیاهه‌ی شخصیت ۵-DSM بزرگسال شامل ۲۵ ماده است که برای پنج بعد ارزیابی صفات مدل جایگزین اختلال شخصیت شامل عاطفی منفی، گسلش، آتناگونیسم، عدم بازداری و سایکوتیک در هر دو بزرگسالان و نوجوانان طراحی شده است. هر خرده مقیاس دربردارنده‌ی ۵ ماده است و بر اساس طیف لیکرت چهار درجه‌ای از کاملاً نادرست=۰ تا کاملاً درست نمره‌گذاری می‌شود (کروگر، درینگر، مارکون، واتسون و همکاران، ۲۰۱۳). به منظور تهیه‌ی نسخه‌ی فارسی سیاهه‌ی شخصیت ۵-DSM بزرگسال، محقق و دو متخصص زبان انگلیسی پرسشنامه مذکور را به فارسی روان برگردانده و سپس متن ترجمه شده مورد ویراستاری قرار گرفت. در گام بعد متن ترجمه شده، توسط محقق و متخصصان زبان انگلیسی دوباره به زبان انگلیسی برگردانده شده و دو نسخه با یکدیگر منطبق شدند. سپس پرسشنامه در اختیار دو تن از متخصصان روان‌شناسی قرار گرفت تا روایی صوری آن را بررسی نمایند. پس از مطابقت دو نسخه ترجمه و اصلی و رفع ایرادات، پرسشنامه بر روی ۴۰ نفر از دانشجویان مشابه با جامعه‌نهایی پژوهش اجرا و پس از دریافت بازخوردهای لازم درباره‌ی محتوای گوییها و رفع ضعف‌های مطرح شده، نسخه‌نهایی پرسشنامه جهت استفاده تهیه گردید.

مقیاس سه‌گانه تاریک کوتاه (SD3) شامل ۲۷ ماده و سه زیرمقیاس است. هر یک از سه زیر مقیاس این پرسشنامه نیز شامل ۹ ماده است که به منظور ارزیابی سه صفت شخصیتی ماکیاولیستی، خودشیفتگی و جامعه‌ستیزی به کار می‌رond. تهیه کنندگان مقیاس نمره‌ی برش جهت صفات سه‌گانه تاریک مشخص نساخته‌اند و به این منظور باید از نمرات استاندارد شده بهره گرفت. در پژوهش جان و پایلوس (۲۰۱۴) دامنه‌ی ضرایب آلفای ۰/۶۸ و همچنین همبستگی درونی ۰/۲۲ تا ۰/۴۰ برای

زیر مقیاس‌های این مقیاس به دست آمده است. اعتبارسنجی همتا نیز بر روی ۶۵ دانشجو صورت پذیرفت (جان و پایلوس، ۲۰۱۴). ضرایب باز آزمایی در بازه‌ی زمانی دو هفته ۰/۷۷ تا ۰/۸۴ گزارش شده است (پایلوس و جان، ۲۰۱۱). بررسی ویژگی‌های روانسنجی مقیاس سه‌گانه تاریک در جامعه ایران بیانگر ویژگی‌های مطلوب این بود، ضرایب آلفای کرونباخ زیرمقیاس‌های جامعه‌ستیزی، ماکیاولیسم و خودشیفتگی به ترتیب برابر با ۰/۶۹، ۰/۷۱ و ۰/۸۲ به دست آمده است. همچنین ضرایب باز آزمایی برابر با ۰/۷۹، ۰/۷۳ و ۰/۶۶ گزارش گردیده است که نشان دهنده‌ی ثبات مطلوب این مقیاس است (امیری و یعقوبی، ۲۰۱۶).

پرسشنامه‌ی پنج عامل شخصیت (فرم کوتاه ۶۰ سوالی) در سال ۱۹۸۵ توسط مک کری و کاستا ارایه شده و در سال ۱۹۹۳ مورد تجدیدنظر قرار گرفته بynam NEO-PI-R ارایه شده است که پنج عامل اصلی و شش ویژگی هر عامل را می‌سنجد. زیرمقیاس‌های آن نیز هم‌سانی درونی خوبی را نشان داده‌اند، به طوری که مک کری و کاستا ضرایب آلفای کرون باخ ۰/۶۸ برای موافق بودن تا ۰/۸۶ برای روان رنجور خوبی را برای آن گزارش کرده‌اند (کاستا و مک کری، ۱۹۹۲). این آزمون در ایران توسط حق‌شناس اجرا و هنجاریابی شده است که ضرایب آلفای کرون باخ آن در مطالعه نمونه ۵۱۲ نفری، به ترتیب برای روان‌رنجورخوبی، بروون‌گرایی، باز بودن به تجربه، توافق و وجودانی بودن ۰/۸۰، ۰/۶۷، ۰/۵۱، ۰/۵۴ و ۰/۶۰ گزارش شده است (حق‌شناس، ۲۰۰۹).

به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب آلفای کرونباخ، باز آزمایی و دونیم سازی و تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد. داده‌ها با استفاده از بیست و دومین ویرایش نرم افزار SPSS و Lisrel 8.8 مورد تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها

در جدول ۱ مولفه‌های توصیفی مقیاسها ارایه شده است

جدول ۱. مولفه‌های توصیفی زیر مقیاس‌های سیاهه‌ی شخصیت DSM-5 بزرگسال

زیر مقیاس	M	(sd)	α	ضریب باز آزمایی	دونیم کردن
عاطفه منفی	۱۱/۸۶	(۳/۱۲)	۰/۸۲	۰/۵۹***	۰/۸۲
گسلش	۱۱/۲۶	(۲/۰۸)	۰/۷۵	۰/۶۱***	۰/۷۲
آناتاگونیسم	۱۰/۴۴	(۲/۰۳)	۰/۷۴	۰/۴۸***	۰/۷۱
عدم بازداری	۱۱/۶۱	(۲/۴۲)	۰/۷۷	۰/۷۲***	۰/۶۹
سایکوتیک	۱۰/۸۸	(۲/۶۶)	۰/۶۸	۰/۶۲***	۰/۶۲

** P<0/01

نتایج جدول ۱ نشان می‌دهد که ضرایب آلفای کرونباخ رضایت‌بخش بوده و همچنین، داده‌های تمام ضرایب باز آزمایی و دو نیمسازی معنادار هستند. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که سیاهه‌ی شخصیت DSM-5 بزرگسال (کروگر و همکاران، ۲۰۱۳)، از همسانی درونی مطلوبی برخوردار است. روایی سیاهه‌ی شخصیت DSM-5 (کروگر و همکاران، ۲۰۱۳)، با دو روش روایی ملاکی (اجرای هم‌زمان با مقیاس سه‌گانه تاریک کوتاه و پرسشنامه پنج عامل شخصیت و همبستگی بین زیرمقیاس‌ها مورد بررسی قرار گرفت که در جدول ۲ درج گردیده است.

جدول ۲. ضرایب همبستگی بین زیرمقیاس‌های سیاهه‌ی شخصیت DSM-5 بزرگسال با صفات تاریک و پنج عامل شخصیت

زیرمقیاس	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	
عاظمه منفی												
گسلش	۱	.۰/۴۳**										
آناگونیسم		۱	.۰/۳۲**									
عدم بازداری			۱	.۰/۴۹**								
سایکوتیک				۱	.۰/۴۲**							
ماکیاولیسم					۱	.۰/۳۴**						
خدوشیفته						۱	.۰/۴۰**					
سایکوپات							۱	.۰/۴۵**				
گشودگی								۱	.۰/۶۳**			
با وجود بودن									۱	.۰/۱۴**		
برونگرایی										۱	.۰/۰۹	
موافق بودن											۱	
روان‌رنجوری												۱

** P<0/01 * P<0/05

الگوی ضرایب همبستگی بین زیرمقیاس‌ها در جدول ۲ نشان می‌دهد که روابط درونی مناسبی بین زیرمقیاس‌ها وجود دارد. همچنین الگوی ضرایب همبستگی زیرمقیاس‌ها مقیاس سه‌گانه تاریک کوتاه (جان و پایلوس، ۲۰۱۴) و پرسشنامه‌ی پنج عامل شخصیت (کاستا و مک‌کری، ۱۹۹۲) بیانگر روایی ملاکی هم‌زمان مطلوب سیاهه‌ی شخصیت DSM-5 بزرگسال (کروگر و همکاران، ۲۰۱۳) است. به منظور بررسی ساختار مجموعه سوال‌ها از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تایید یا استفاده شد. تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش‌های مختلف و با استفاده تحلیل مولفه‌ی اصلی و چرخش واریماکس انجام شد. میزان ارزش به دست آمده برای کفایت نمونه‌گیری کیسر-مییر-الکین (KMO) برابر با

۰/۶۳۰ بود و همچنین آزمون کرویت بارتلت (Chi-Square=۳۶۶۹/۸۰۱) نشان داد که تحلیل عاملی امکان‌پذیر است. نتایج نمودار شبیه دامنه‌ی عوامل (اسکری پلات) و تحلیل مولفه‌های اصلی وجود ۵ مولفه‌ی با ارزش‌های بیشتر از ۱ را نشان داد. داده‌های نشان می‌دهد که بارهای عاملی استخراج شده بالاتر از ۰/۴۰ هستند و توزیع ماده‌ها در عامل‌ها با زیربنای نظری ساختار اصلی پرسشنامه مطابقت دارد و در مجموع ۵ عامل مذکور ۵۰/۷۵ درصد واریانس را تبیین می‌کردند. به منظور بررسی برآش ساختار ۵ عاملی سیاهه‌ی شخصیت DSM-5 بزرگسال (کروگر و همکاران، ۲۰۱۳) از تحلیل عاملی تاییدی به روش حداکثر درست نمایی^۱ و با استفاده از نرم‌افزار لیزرل استفاده شد (جورسگوگ و سوربوم، ۲۰۰۶). تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم‌افزار لیزرل سه طبقه از شاخص‌های برآش مدل را ارایه داد. شاخص‌های برآزندگی هنجرشده^۲ (NFI)، برآزندگی نسبی^۳ (RFI) و نیکویی برآش^۴ (GFI) هر چقدر نزدیک به یک باشد بیانگر برآش مطلوب الگو است. در پژوهش حاضر از معتبرترین نمرات برش برای ارزیابی برآش مدل استفاده شد. <0.08 نشان دهنده‌ی برآش مطلوب و <0.10 نشان دهنده‌ی برآش قابل قبول و زمانی که SRMR است مدل رد می‌شود (هو و بنتلر، ۱۹۹۹).

ارزش شاخص $\leq .8$ RMSEA نشان دهنده س مدل خوب، $.08 \leq \text{RMSEA} \leq .10$. نشان دهنده‌ی مدل قابل قبول است. در نهایت $.95 \geq \text{CFI} \geq .90$ نشان دهنده‌ی برآش خوب مدل است (هو و بنتلر، ۱۹۹۹). به دلیل اینکه آماره X^2 نسبت به اندازه‌ی نمونه حساس است، از همین رو میزان X^2 همراه با درجه آزادی (X^2/df) برای ارزیابی برآش کلی مدل محاسبه گردید. میزان $2 < X^2/df < 3$ نشان دهنده‌ی برآش خوب مدل و میزان df/X^2 پیرامون ۳ نشان دهنده‌ی برآش قابل قبول مدل است. میزان df/X^2 برابر ۳.۲۱ بود که پیرامون ۳ بوده و بنابراین نشان دهنده‌ی برآش قابل قبول مدل است. علاوه بر این شاخص برآزندگی $.02 = \text{SRMR}$ نشان دهنده‌ی برآش مطلوب مدل هشت عاملی بود و شاخص‌های برآش $.02 = \text{RMSEA}$ و $.94 = \text{CFI}$ برآش خوب مدل را نشان داد.

بحث و نتیجه‌گیری

ابزارهای خود گزارش دهی به منظور سنجش ابعاد شخصیت شکل یافته است. با این حال، این ابزارها منطبق با تغییرات نسخه پنجم راهنمای تشخصی و آماری اختلالات روانی طراحی نشده است. از این

-
- 1. Maximum likelihood method
 - 2. Normed Fit Index (NFI)

- 3. Relative Fit Index (RFI)
- 4. Goodness of Fit Index (GFI)

رو، مطالعه‌ی حاضر به ارزیابی و اعتبار سنجی سیاهه‌ی شخصیت DSM-5 بزرگسال با استفاده از بررسی اعتبار، روایی و ساختار عاملی در نمونه‌ی جمعیتی بهنجار پرداخت. یافته‌های حاضر حمایت روشنی برای اعتبار و روایی سیاهه‌ی شخصیت DSM-5 بزرگسال، به عنوان پرسشنامه‌ی جدید شخصیت جهت از بین بردن محدودیت‌های پرسشنامه‌های موجود فراهم ساخت. همچنان که از پژوهش‌های پیشین انتظار می‌رفت (کروگر و همکاران، ۲۰۱۳)، تحلیل عاملی پرسشنامه SCQA نشان داد که راه حل پنج عاملی از برازش مطلوبی برخوردار است. این یافته همسو با مطالعاتی است که ساختار عاملی سیاهه‌ی شخصیت DSM-5 بزرگسال را مورد بررسی قرار داده‌اند (کروگر و همکاران، ۲۰۱۳). نتایج نشان داد که پنج زیر مقیاس عاطفه‌ی منفی، گسلش، آناتاگونیسم، عدم بازداری، و سایکوتیک از روایی درونی مطلوبی برخوردار هستند. بررسی ساختار عاملی و الگوهای بارهای عاملی سیاهه‌ی شخصیت بزرگسال با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی نتایج مشابه راه حل پنج عاملی کروگر و همکاران (۲۰۱۳) به دست داد و تمام بارهای عاملی بالای ۰/۴ قرار داشتند.

بررسی اعتبار سیاهه‌ی شخصیت بزرگسال از طریق محاسبه‌ی ضرایب آلفا، ضرایب باز آزمایی و دونیم سازی نشانگر اعتبار مطلوب این مقیاس بود. ضرایب آلفا زیر مقیاس‌ها ۱۱. ۱۱. عاطفه‌ی منفی (عامل اول) ۲. گسلش (عامل دوم) ۳. آناتاگونیسم (عامل سوم) ۴. عدم بازداری (عامل چهارم) ۵. سایکوتیک (عامل پنجم) به ترتیب ۰/۸۲، ۰/۷۴، ۰/۷۵، ۰/۷۷ و ۰/۶۸ و به دست آمد و دامنه‌ی ضرایب باز آزمایی و دو نیمسازی حاکی از مطلوب بودن اعتبار سیاهه‌ی شخصیت بزرگسال است، این یافته‌ها همسو با مطالعه کروگر و همکاران (۲۰۱۳) است که نسخه‌ی اصلی سیاهه‌ی شخصیت بزرگسال را شکل دادند. روایی سیاهه‌ی شخصیت بزرگسال نوجوانان با مقیاس سه‌گانه تاریک کوتاه (جان و پایلوس، ۲۰۱۴) و پرسشنامه پنج عامل شخصیت (کاستا و مک‌کری، ۱۹۹۲) نشان دهنده ضرایب همبستگی مطلوب بین زیر مقیاس‌های سیاهه‌ی شخصیت بزرگسال و صفات تاریک بود ($P<0.001$). این نتیجه نشان دهنده روایی همگرایی سیاهه‌ی شخصیت بزرگسال بود. زیر مقیاس‌های سیاهه‌ی شخصیت بزرگسال و پرسشنامه‌ی پنج عامل شخصیت همبستگی معناداری را نشان داد ($P<0.01$). ویژگی‌های روان‌سنجی سیاهه‌ی شخصیت بزرگسال در پژوهش حاضر به ترتیب با مطالعات انجام گرفته در نسخه‌ی اصلی (کروگر و همکاران، ۲۰۱۳) همسوی نشان داد. با توجه به آنچه بیان شد فقدان ابزار مختص و در عین حال معتبر و سودمند به منظور سنجش ابعاد شخصیتی از نقاط ضعف پژوهش‌های حیطه‌ی شخصیت است. در نتیجه بدون توجه به زبان و فرهنگ و با در نظر داشتن الگوی بارهای عاملی همسان با پژوهش‌های پیشین (کروگر و همکاران، ۲۰۱۳) به نظر می‌رسد که سیاهه‌ی شخصیت بزرگسال ابزار

سودمندی جهت سنجش بهتر سازه‌های بنیادین شخصیت است. در مجموع ویژگی‌های روان‌سنجدی مطلوب سیاهه‌ی شخصیت بزرگسال، قابلیت کاربرد در سطح وسیع و سنجش شخصیت را دارا بوده، و همچنین قابلیت این را داراست تا در سطوح پژوهشی و بالینی مورد استفاده قرار گیرد.

در مجموع تحلیل‌های اعتبار و روایی و تحلیل عاملی تاییدی نشان دهنده‌ی ویژگی‌های روان‌سنجدی مطلوب سیاهه‌ی شخصیت بزرگسال بوده و یافته‌های پژوهش حاضر با نتایج نسخه اصلی نتایج همسویی را گزارش داد (کروگر و همکاران، ۲۰۱۳)؛ و اینکه سیاهه‌ی شخصیت بزرگسال نشان داد که ابزار معبری برای ارزیابی صفات شخصیتی است. همچنین شاخص‌های محاسبه شده جهت بررسی برازش مدل سیاهه‌ی شخصیت بزرگسال نوجوانان نشان داد که شاخص‌های (RMSEA)، (SRMR)، (X²/df) به عنوان معتبرترین شاخص‌های برازنده‌گی (براون، ۲۰۰۶؛ شرمیله / انگل و همکاران، ۲۰۰۳؛ هایر و همکاران، ۲۰۰۹؛ هو و بنتلر، ۱۹۹۹؛ تاباچنگ و فیل، ۲۰۰۷) از برازش مدل حمایت می‌کنند. که این یافته همسو با نتایج نسخه اصلی سیاهه‌ی شخصیت بزرگسال نوجوان بود (کروگر و همکاران، ۲۰۱۳).

References

- Amiri, S., & Yaghoob, A. (2016). Evaluation of the psychometric properties scale of Dark Triad of personality. *Research in Clinical Psychology and Counseling*, 6(1): 77-97.
- HqShnas, H. (2009). personality psychology. Faculty of Medical Sciences and Health Services.
- American Psychiatric Association. (1980). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (3rd Ed.). Washington, DC: Author.
- American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th Ed.). Washington, DC: Author.
- American Psychiatric Association. (2013a). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th Ed.). Washington, DC: Author.
- American Psychiatric Association. (2013b, June 15). Online assessment measures: The Personality Inventory for DSM-5-Brief Form (PID-5-BF)—Child Age 11–17. Retrieved from <http://www.psychiatry.org/practice/dsm/dsm5/online-assessment-measures>.
- Brown, T. A. (2006). *Confirmatory factor analysis for applied research*. New York: Guilford Press.
- Clark, L. A. (2007). Assessment and diagnosis of personality disorder: Perennial issues and emerging conceptualization. *Annual Review of Psychology*, 58, 227-258.
- Costa, p.t Jr. & McCrae, R.R. (1992). Revised NEO Personality (NEO-PI-R) and NEO Five-factor Inventory (NEO-FFI) Professional manual-odessa, f1: psychologal Assessment Resources.
- Fossati, A., Krueger, R. F., Markon, K. E., Borroni, S., & Maffei, C. (2013). Reliability and validity of the Personality Inventory for DSM-5 (PID-5) predicting DSM-IV personality disorders and psychopathy in community-dwelling Italian adults. *Assessment*, 20, 689-708.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2009). *Multivariate data analysis*. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
- Harkness, A. R., McNulty, J. L., & Ben-Porath, Y. S. (1995). The Personality Psychopathology Five (PSY-5): Constructs and MMPI-2 scales. *Psychological Assessment*, 7, 104-114.
- Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. *Structural Equation Modeling A: Multidisciplinary Journal*, 6, 1-55.
- Jones, D. N., & Paulhus, D. L. (2014). Introducing the Short Dark Triad (SSD3): A brief measure of dark personality trait. *Assessment*, 21(1):28-41.
- Jöreskog K. G., Sörbom, D. (2006). *LISREL 8.80 for Windows [Computer Software]*. Lincolnwood, IL: Scientific Software International, Inc.

- Krueger RF, Derringer J, Markon KE, Watson D, Skodol AE. (2013). The Personality Inventory for DSM-5 Brief Form (PID-5-BF). Manuscript in preparation.
- Krueger, R. F., & Markon, K. E. (2014). The role of the DSM-5 personality trait model in moving toward a quantitative and empirically based approach to classifying personality and psychopathology. *Annual Review of Clinical Psychology*, 10, 477-501.
- Livesley, W. J., & Jang, K. L. (2000). Toward an empirically based classification of personality disorder. *Journal of Personality Disorders*, 14, 137-151.
- Noblin, J. L., Venta, A., & Sharp, C. (2013). The validity of the MSI-BPD among inpatient adolescents. *Assessment*, 21,210-217.
- Patel, A. B., Sharp, C., & Fonagy, P. (2011). Criterion validity of the MSI-BPD in a community sample of women. *Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment*, 33, 403-408.
- Paulhus, D. L., & Jones, D. N. (2011). *A short measure of the Dark Triad*. Presented at meeting of the Society for Personality and Social Psychology, San Antonio, Texas.
- Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness of fit measures. *Psychological Research*, 8, 23-74.
- Skodol, A. E. (2014). Personality disorder classification: stuck in neutral, how to move forward? *Current Psychiatry Reports*, 16, 1-10.
- Suzuki, T., Samuel, D. B., Pahlken, S., & Krueger, R. F. (2015). DSM-5-alternative personality disorder model traits as maladaptive extreme variants of the five-factor model: An itemresponse theory analysis. *Journal of Abnormal Psychology*, 124, 343-354.
- Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). *Using multivariate statistics (5th ed)*. Boston, MA: Pearson.
- Trull, T. J., & Durrett, C. A. (2005). Categorical and dimensional models of personality disorder. *Annual Review of Clinical Psychology*, 1, 355-380.
- Wakefield, J. C. (2008). The perils of dimensionalization: Challenges in distinguishing negative traits from personality disorders. *Psychiatric Clinics of North America*, 31, 379-393.
- Widiger, T. A., & Simonsen, E. (2005). Alternative dimensional models of personality disorder: Finding a common ground. *Journal of Personality Disorders*, 19, 110-130.
- Widiger, T. A., & Trull, T. J. (2007). Plate tectonics in the classification of personality disorder. *American Psychologist*, 62, 71-83.
- Wright, A. G., & Simms, L. J. (2014). On the structure of personality disorder traits: Conjoint analyses of the CAT-PD, PID-5, and NEO-PI-3 trait models. *Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment*, 5, 43-54.
- Wright, A. G., Thomas, K. M., Hopwood, C. J., Markon, K. E., Pincus, A. L., & Krueger, R. F. (2012). The hierarchical structure of DSM-5 pathological personality traits. *Journal of Abnormal Psychology*, 121, 951-957.

Journal of
Thought & Behavior in Clinical Psychology
Vol. 11 (No. 45), pp. 27-36, 2017

Psychometric properties of adult Personality Inventory according DSM-5

Amiri, Sohrab

Department of Psychology, University of Urmia, Urmia, Iran

Received: Jul 27, 2017

Accepted: Dec 17, 2017

With regard to various concerns regarding the category of personality disorder since the third edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, an alternative personality disorder model is provided in the third part of DSM-5. The purpose of this study was to examine the psychometric properties of DSM-5 adult Personality Inventory on the normal population. For this purpose, 278 students were selected by using multi-stage cluster sampling, and tested with adult DSM-5 personality inventory, Dark Triad Scale and Big Five Personality Questionnaire. The validity of the questionnaire with other scales showed eligible discriminant and convergence validity. As well as its factor structure was assessed by using exploratory and confirmatory factor analysis. The results of the factor analysis indicated that the DSM-5 adult Personality Inventory has five factors, check the reliability of the questionnaire using Cronbach's alpha, retest and splitting coefficient reflects the reliability of the Inventory. The inventory, has required psychometric properties in Iranian population sample, and Inventory can be used in studies in the Iranian culture.

Keywords: Personality Inventory, big five, dark traits, psychometrics