

بررسی میزان بروز بیماری شیردان بزاقی در دو مزرعه پرورش گوسفند صنعتی و سنتی

حسین اسماعیلی^۱، محمد مهدی صفری^۲

۱. هیات علمی گروه میکروبی شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
۲. دانشجوی دوره دکتری عمومی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

hesmaeli@ut.ac.ir

دریافت مقاله: ۱۵ تیر ۱۴۰۰؛ پذیرش نهایی: ۲۵ شهریور ۱۴۰۰



JOURNAL OF VETERINARY CLINICAL RESEARCH

دوره سیزدهم، شماره یک، بهار و تابستان ۱۴۰۱

شیردان بزاقی یا Salivary Abomasum Disease یک بیماری است که در بره‌ها و بزغاله‌های شیرخوار با سن ۳ تا ۱۷ روز گزارش شده است. اتیولوژی بیماری به طور کامل شناخته شده نیست. علائم بره‌ها عبارتند از بی‌حالی، ضعف، قطع مکش، عدم تعادل و اتساع شکم می‌باشد. در ادامه بره‌ها زمین‌گیر شده و تلف می‌شوند. میزان بروز بیماری در دو گله پرورش گوسفند مورد بررسی قرار گرفت. علائم بالینی و کالبدگشایی ارزیابی شدند. کالبدگشایی بره‌ها اتساع شیردان همراه با خونریزی‌های کوچک دیده می‌شود. درمان موارد مبتلا با اریترومايسين و سرم بيكربنات سدیم ۱/۳٪ پاسخ خوبی داشته است. مراقبت از بره‌ها و فراهم کردن شرایط پرورشی بهداشتی در کنترل و پیشگیری از این بیماری موثر است.

واژگان کلیدی: شیردان بزاقی، تلفات نوزادان، بره، بزغاله، اسهال