

## گزارش یک مورد پريتونيت ناشی از پارگی معده در یک رأس اسب



JOURNAL OF VETERINARY CLINICAL RESEARCH

دوره سیزدهم، شماره یک، بهار و تابستان ۱۴۰۱

افشین جعفری دهکردی<sup>۱</sup>، کیوان غنی زاده<sup>۲\*</sup>

۱. دانشیار گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد  
۲. رزیدنت بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

[keyvan.ghanizadeh73@gmail.com](mailto:keyvan.ghanizadeh73@gmail.com)

دریافت مقاله: ۲۲ تیر ۱۴۰۰؛ پذیرش نهایی: ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

پريتونيت در اثر عوامل متعددی در اسب به وجود می‌آید. پريتونيت اوليه در اسب‌های بالغ نادر است اما ممکن است در نوزاد عفونی یا مبتلا به نقص در پاسخهای ایمنی از طریق گسترش خونی باکتریای یا در اسب‌های جوان در معرض عفونت استرپتوکوکوس اکوئی رخ دهد. پريتونيت ثانويه ممکن است در اثر زخم‌های متنفذه شکم، آزدگی‌های شیمیایی، تورم کبد، پارگی مثانه و ... ایجاد شود. یک رأس اسب ۳ ساله که مبتلا به کولیک شدیدی بود و علی‌رغم درمان‌های صورت گرفته همچون پارافین، فلونکسین و سرم تراپی بدون بهبودی تلف گردیده بود جهت کالبدگشایی به کلینیک دامپزشکی ارجاع داده شد. در کالبدگشایی معایعات محوطه بطني که حدوداً ۱۰ لیتر بود از شکم خارج شد. مایعات آغشته به پارافین و محتویات دستگاه گوارش بودند که پس از بررسی کامل لاشه وجود زخم معده و پارگی معده مورد تأیید قرار گرفت. در نهایت بر اساس علائم کالبدگشایی علت پريتونيت پارگی معده در اثر زخم معده مورد تأیید قرار گرفت.

واژگان کلیدی: اسب، پريتونيت، پارگی معده