

## بررسی خطرآفرینی درختان کاج ایرانی (*Pinus eldarica* Medw.) حاشیه خیابان ها (مطالعه موردی: شهرستان بابل)

محمد رضا پور مجیدیان<sup>۱</sup>، حامد آقاجانی<sup>\*۲</sup>، اصغر فلاح<sup>۱</sup>، مازیار حیدری<sup>۲</sup>

تاریخ دریافت: ۹۲/۰۷/۸ تاریخ پذیرش: ۹۳/۱۰/۱۶

### چکیده

خیابان مشخصه مهم حیطه عمومی است و یکی از مباحث مهم در بحث خیابان‌های شهری، فضای سبز با زیبا شناختی آن است. فضای سبز شهری بهدلیل ارزش‌های زیست محیطی از مشخصه‌های مهم هر شهر است، بطوریکه اولین قدم برای برنامه ریزی و مدیریت فضای سبز شهری، دانستن اطلاعاتی در مورد درختان خیابانی می‌باشد. با توجه به اتفاقات اخیر صورت گرفته خطرآفرینی درختان شهرستان بابل، در این پژوهش میزان خطرآفرینی درختان کاج ایرانی (*Pinus eldarica* Medw.) در دو سمت خیابان در بخشی از خیابان فلسطین تا دانشکده علوم پزشکی و مسیر دوم از چهارراه فرهنگ تا میدان قاضی‌کتبی شهرستان بابل با روش آماربرداری صدرصد و با استفاده از معیارهای خطرآفرینی مورد مطالعه قرار گرفت. در مجموع ۱۲۰ اصله درخت اندازه‌گیری شد و پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها، سهم هر یک از معیارهای خطرآفرین در آنها مشخص و طبقه‌بندی میزان خطرات انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که دو معیار شاخه و سرشاخه‌های خشکیده و مشکلات ریشه (به ترتیب با ۷۵ و ۶۵ درصد از تعداد کل درختان) بیشترین سهم را در خطرآفرینی درختان کاج دارند در حالی که معیار شاخه‌دهی نامناسب کم اهمیت‌ترین عامل است. وزن‌دهی معیارهای خطرآفرین نشان داد که ۱۲ درخت (۱۰ درصد کل درختان) در طبقه بسیار خطرناک قرار دارند و باید قطع شوند. در مورد سایر درختان نیز باید اقدامات اصلاحی از جمله هرس تاج انجام شود.

واژه‌های کلیدی: پوسیدگی، جنگلداری شهری، محیط زیست شهری، هرس تاج

<sup>۱</sup>- دانشیار گروه جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

<sup>۲</sup>- دانشجوی دکتری جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

\* نویسنده مسئول: Email: [Hamed\\_Aghajani\\_85@yahoo.com](mailto:Hamed_Aghajani_85@yahoo.com)

(۲۸). درختان محیط‌های شهری علاوه بر دارا بودن مزایای متعدد، گاهی موقع خطراتی نیز دارند که به دلیل تماس مستقیم و دائمی مردم با آنها جدی تلقی می‌شوند.

کاج ایرانی با نام علمی (*Pinus eldarica* Medw.) بومی الدار گرجستان است و به نام کاج ایرانی و کاج تهران شهرت دارد و در نقاط مختلف با آب و هوای مرطوب و نیمه مرطوب و نیمه خشک براحتی می‌روید (۲۷). درخت خطر آفرین<sup>۲</sup> به درختی گفته می‌شود که دارای نقصی در تمام یا بخشی از اندام هوایی خود بوده به طوریکه در شرایط نامناسب جوی ایجاد خطر نماید (۲۵، ۱۹). این خطرات متوجه سلامت انسان، وسایل نقلیه، ساختمان‌ها و غیره می‌باشد. درختان خیابانی نوعی ارزیابی جنگلداری شهری را نشان می‌دهند (۵) اما اغلب عملکرد عمومی دارند (۴).

امروزه در مدیریت جنگل‌های شهری به خطرآفرینی درختان اهمیت خاصی داده می‌شود. درختان خطر آفرین در اغلب موارد نادیده گرفته می‌شوند، مگر آنکه بواسطه خطرآفرینی آسیبی ایجاد شود (۱۹). همچنین ما نمی‌توانیم بطور مرتب درختان خطر آفرین و غیرخطر آفرین را از هم جدا کنیم، چون همه درختان پتانسیل خطر آفرینی را دارند (۱۰). برای پایش درختان در محیط‌های شهری و تعیین میزان خطرآفرینی آنها معیارهای مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد، ولی به طور کلی عیوب‌های درختان را می‌توان در ۸ گروه اصلی طبقه‌بندی نمود که عبارتند از شاخه و

## مقدمه

در دنیای امروز با گسترش شهرها و ازدحام روز افزون جمعیت در آنها، انسانها با مشکلات مختلفی چون آلودگی هوا، آلودگی صوتی دست و پنجه نرم می‌کنند. در این شرایط ضروری است که به فضای سبز و درختان شهری و حتی جنگلداری شهری و تاثیر مثبت آنها توجه بیشتری شود. فضای سبز شهری به دلیل ارزش‌های زیست محیطی از مشخصه‌های مهم هر شهر است و برای برنامه ریزی و اداره فضای سبز شهری، دانستن اطلاعاتی در مورد درختان خیابانی اولین قدم برای مدیریت صحیح می‌باشد. خیابان مشخصه مهم حیطه عمومی است و به کیفیت زندگی شهری‌دانی که در آن ساکن بوده و یا از آن عبور می‌کنند کمک می‌کند (۳۰). از اصول و معیارهای طراحی خیابان شهری در کشورهای مختلف جهان برای مولفه زیست محیطی و زیبایی شناختی، فاکتورهای مختلفی مدنظر قرار می‌گیرند که از مهم ترین آنها می‌توان به عوامل زیر اشاره کرد: سلامت اکولوژیکی، نگرشی جامع به خیابان سبز، تقویت عناصر فضای سبز، طراحی پایدار خیابان، توجه به معیارهای زیست محیطی، توجه به منظر خیابان، ایجاد جذابیت بیشتر برای افراد پیاده می‌باشد (۹). یکی از بخش‌های مدیریت شهری فضای سبز یا جنگلداری شهری<sup>۱</sup> است که موارد متعددی نظیر حفاظت از درختان شهری، حیات وحش شهری، فرصت‌های تفریجگاهی، طراحی چشم اندازها، تولید چوب، علوفه، گل و گیاه را در بر می‌گیرد

(۲۳). درختان جوان معمولاً درون چوب آنها سالم بوده و خطر آفرین نیستند، اما این وضعیت کاملاً بستگی به شرایط زیست و شرایط محیطی دارد. با توجه به اینکه اغلب مشکلات مربوط به ریشه در زیر خاک بوده و قابل مشاهده نیستند، علائم ظاهری قابل مشاهده در سطح خاک دیده نمی‌شود. ضعف مکانیکی یا ساختاری اشاره به الگوی رشد درخت دارد که معمولاً به دنبال بروز عواملی از قبیل طوفان، شرایط نامناسب رشد، هرس نادرست و غیره رخ می‌دهد. تمایل درخت یا انحراف تنہ درخت از حالت قائم و ضریب قدکشیدگی نیز از جمله عواملی هستند که به الگوی رشد درخت مربوط می‌شوند (۷، ۱).

بسته به شرایط منطقه مورد مطالعه مجاورت تاج درختان با خطوط انتقال برق از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این خصوص ممکن است سرشاخه‌هایی که در تماس با خطوط برق هستند، باعث انتقال جریان برق به سمت پایین یعنی پیاده رو شده و خطر برق گرفتگی را برای عابرين ایجاد نمایند (۱۲). امروزه در کشورهای مختلف پیشرفتی معیارهای تشخیصی درختان خطرآفرین و شناسایی و پاییش آنها در محیط شهری مدنظر پژوهشگران فضاهای سبز شهری قرار گرفته است (۳۱، ۲۶، ۲۵، ۲۱، ۱۷، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۹، ۴، ۱).

در واقع با شناسایی و ارزیابی این خطرات قدم اول در برنامه‌های مدیریت درختان خطرآفرین می‌توان داشت و شاخص‌های ارزیابی خطرات درختان خیابانی در مالزی با ارائه روش دلفی بررسی شد (۱۷).

سرشاخه‌های خشکیده، شکاف یا ترک، شاخه دهی نامناسب، پوسیدگی تنہ و شاخه، زخم، مشکلات ریشه، وضعیت و ضعف ساختاری، تماس با خطوط انتقال برق (۱، ۱۷، ۲۵). درختان فرتوت و ضعیف همواره در معرض انواع مخاطرات بوده و پتانسیل زیادی جهت خطرآفرینی دارند، بنابراین انتخاب نهال برای کاشت در فضاهای سبز شهری از اهمیت زیادی برخوردار است. نژاد و مبدأ نهال باید مورد بررسی قرا بگیرد و ریشه نهال کاشته شده باید سالم و ساقه آن مستقیم، تاج آن متقارن، پوست آن به رنگ طبیعی و خود نهال باید از زخم و آسیب حشرات عاری باشد (۲۰). همچنین ریشه بسیاری از مشکلات اشاره شده نیز به نوع درخت مرتبط می‌باشد، به عنوان مثال درختان سریع‌الرشدی مانند صنوبرها به دلیل تولید چوب سست و نامقاوم، استعداد پوسیدگی و یا شکستن شاخه و تنہ را در سنین جوانی دارند، از این‌رو برخی پژوهشگران اشاره کرده‌اند که نوع گونه، مهمترین معیار برای تشخیص درختان خطر آفرین است (۱۱). از طرف دیگر معمولاً در درختان مسنی که به سن پیری و دیرزیستی فیزیولوژیک رسیده‌اند و ابعاد قابل ملاحظه‌ای دارند و معمولاً از درون چهار پوسیدگی می‌شوند، این قبیل درختان نیاز به توجه خاصی دارند. در مورد عیوب فوق لازم به توضیح است که گاهی اوقات تنہ درخت از یک نقطه دو یا چند شاخه شده و شاخه‌های تولید می‌کند که دارای ساختار و مقاومت ضعیفتری بوده و استعداد خطر آفرینی دارد. معمولاً پوسیدگی درختان از داخل (درون چوب) آغاز شده و به سمت بیرون گسترش می‌یابد.

طول شرقی واقع شده است. آب و هوای شهرستان بابل به دلیل قرار گرفتن میان کوه و دریا، معتدل و مروطوب می باشد. منطقه مورد مطالعه در دو سمت خیابان در بخشی از ابتدای خیابان فلسطین تا محوطه دانشکده علوم پزشکی بابل که طول مسیر آن ۸۰۰ متر و دارای ۹۰ اصله کاج در دو طرف خیابان و مسیر دوم از چهارراه فرهنگ تا میدان قاضی کتی شهرستان بابل (شکل ۱) بوده که طول مسیر آن ۷۵۰ متر و ۳۰ اصله کاج در دو طرف خیابان وجود دارد. برای اندازه گیری درختان کاج که ۷۸ ساله بودند (۲۴) <sup>۱</sup> از روش آماربرداری صد درصد استفاده شد (۲۵).

قطر برابر سینه و ارتفاع تمام درختان اندازه گیری و بر اساس معیارهای تشخیص درختان خطرآفرین (۲۵، ۱۵)، درجه بندی وضعیت خطرآفرینی درختان به شرح زیر انجام و در فرم های آماربرداری از پیش طراحی شده ثبت شد:

۱) شاخه و سرشاخه های خشکیده (۲۵)

- خطر کم: شاخه های فرعی و سرشاخه ها خشک شده باشند.
- خطر متوسط: تاج درخت شامل شاخه های قطور و اصلی خشک شده باشند به طوری که بین یک سوم تا دو سوم تاج درخت خشکیده باشد.

- خطر زیاد: تاج درخت کاملاً خشکیده باشد.

(Ellis 2011) با ارائه روش ارزیابی و راهکارهای مدیریت درختان خطرآفرین، به اهمیت و دستور العمل اجرایی در خصوص مدیریت آنها اشاره نمود. Porhashemi *et al.*, (2012) به ارزیابی خطرآفرینی درختان چنار (*Platanus orientalis* L.) خیابان ولیعصر تهران پرداختند و به این نتیجه رسیدند که درصد خطر آفرین ترین درختان با معیارهای خشکیدگی شاخه و سرشاخه ها و ضعف ساختاری به ترتیب ۸۰ و ۶۹ درصد است و معیارهای شاخه دهی نامناسب و پوسیدگی کم اهمیت ترین معیارها هستند و در کل ۴ درصد درختان خیابان ولیعصر دارای پتانسیل خطرآفرینی بالای هستند.

با توجه به اینکه در شهرستان بابل خطرآفرینی درختان چنار و اوجا مشاهده شده است و اینکه با بدست آوردن اطلاعات کمی و کیفی درختان خطر آفرین اولین اقدام برای جلوگیری از این مخاطرات طبیعی در بحث مدیریت جنگلداری شهری است و با برنامه ریزی های جدید از این خطرآفرینی نابهنجام جلوگیری کنیم. بنابراین هدف از این پژوهش ارزیابی خطر آفرینی درختان کاج تهران و میزان خطرات آنها در منطقه مورد مطالعه می باشد.

## مواد و روش ها

شهرستان بابل از دیرباز معروف به شهرستان بهار نارنج بوده و از سال ۱۳۷۹ بطور رسمی نیز در منابع به این نام شناخته شده است (۱۶). شهرستان بابل بین "۳۵° ۳۶° ۵'۰۰" تا "۳۰° ۳۰'۰۰" عرض شمالی و "۴۵° ۴۵'۰۰" تا "۵۲° ۵۲'۰۰" طول شرقی.

۱- به نقل از ابراهیم پورمجیدیان، ناظر بر اجرای درختکاری مسیر جاده

- خطر متوسط: وجود پوسیدگی پیشرفته در تنۀ اصلی

- خطر زیاد: در محل پوسیدگی پیشرفته در تنۀ اصلی، عیب‌های دیگری از قبیل شکاف، دو یا چندشاخه شدن تنۀ نیز وجود داشته باشند.

(۵) زخم

- خطر کم: محیط زخم کمتر از ۱۰ درصد از محیط کل تنۀ را شامل شود.

- خطر متوسط: محیط زخم بیشتر از ۱۰ تا ۳۰ درصد محیط کل تنۀ را شامل شود.

- خطر زیاد: محیط زخم بیشتر از ۳۰ درصد از محیط کل تنۀ را شامل شود و در محل زخم هم عیب‌های دیگری از قبیل شکاف یا حفره در اثر عوامل زنده و غیرزنده وجود داشته باشند.

$$C = d \times \pi$$

محیط درخت

$$C$$
 محیط درخت

$$d$$
 قطر برابر سینه

(۶) مشکلات ریشه


- خطر کم: علائم کمبود مواد غذایی که به صورت رنگ پریدگی، سوختگی و یا تغییر رنگ برگ‌ها بروز می‌نماید، مشاهده شود.

- خطر متوسط: پوسیدگی پیشرفته روی ریشه‌ها یا گورچه‌ها مشاهده شود.

- خطر زیاد: بیش از نیمی از ریشه‌های زیر سطح تاج درخت بریده شده یا شکسته شده و یا بیرون زدگی ریشه داشته باشد.

(۷) وضعیت و ضعف ساختاری یا ضعف فیزیکی

- خطر کم: یک شاخه بزرگ و اصلی درخت بیرون از فضای اصلی تاج قرار گرفته باشد (تناسب تاج را بر هم زند و باعث عدم تقارن تاج شود



شکل ۱- موقعیت منطقه مورد مطالعه

(۲) شکاف یا ترک

- خطر کم: شاخه‌های قطره داری ترک یا شکاف باشند.

- خطر متوسط: تنۀ اصلی درخت دارای شکاف عمقی بوده و این شکاف طول زیادی از تنۀ را شامل شود یا اینکه در بخش مشخصی از تنۀ تعداد ۲ شکاف و یا بیشتر وجود داشته باشد.

- خطر زیاد: در محل شکاف تنۀ، عیب‌های دیگری (مثلًا پوسیدگی یا بیماری) نیز وجود داشته باشد.

(۳) شاخه‌دهی نامناسب

- خطر کم: تنۀ اصلی درخت دوشاخه شده باشد.

- خطر متوسط: تنۀ اصلی درخت چندشاخه شده باشد.

- خطر زیاد: در محل دو یا چندشاخه شدن تنۀ عیب‌های دیگری از قبیل خشک بودن شاخه وجود داشته باشد.

(۴) پوسیدگی تنۀ و شاخه

- خطر کم: وجود پوسیدگی پیشرفته در شاخه‌های اصلی قطره

- خطر متوسط: خطوط انتقال برق نزدیک به تاج درخت و در فاصله ۲-۳ متری آن قرار گرفته است.

- خطر زیاد: عبور خطوط انتقال برق در امتداد و مجاور آن یا از داخل تاج رد شده باشد (۲۵).  
شکل های ۲، ۳، ۴، ۵ وضعیت خطر آفرینی درختان کاج تهران (*Pinus eldarica*) شهرستان بابل را نشان می دهند.



شکل ۳ - زخم روی تنہ

معیارهای درنظر گرفته شده بین صفر تا ۲۴ می باشد. بدین ترتیب هرچه این عدد بزرگتر باشد، میزان خطرآفرینی درخت بیشتر می باشد. سپس بر مبنای اعداد بدست آمده و براساس طبقه بندی تجربی به ۶ طبقه خطر آفرینی (جدول ۳) تقسیم شدند و نحوه توزیع درختان در طبقه های خطرآفرینی مشخص شد (۲۵).

- خطر متوسط: درخت کمی کج بوده (انحراف از حالت قائم و بین ۱۵ تا ۳۰ درجه) و یا ضریب قدکشیدگی بین ۸۰ تا ۱۰۰ باشد (۳).

- خطر زیاد: کج شدگی درخت بیش از حد بوده (بیشتر از ۳۰ درجه) و یا ضریب قدکشیدگی بیشتر از ۱۰۰ باشد.

۸) تماس با خطوط انتقال برق

- خطر کم: خطوط انتقال برق با فاصله ۱۰ متری از درخت قرار دارد.



شکل ۲ - بیرون زدگی ریشه ها از خاک

برای بررسی وضعیت خطرآفرینی درختان از روش وزن دهی استفاده شد، بدین ترتیب که در هر معیار به طبقه خطر کم وزن یک، خطر متوسط وزن دو و خطر زیاد وزن سه داده شد و حاصل جمع نمره های فوق برای هشت معیار فوق بررسی گردید و برای هر درخت نمره خطرآفرینی مشخص شد که با توجه به



شکل ۵- خشک شدن تاج و رنگ پریدگی در برگ



شکل ۴- شکاف عمقی

درختان دارای چه عیوب‌هایی هستند. همچنین سهم هر یک از معیارهای خطرآفرین و درجه اهمیت آنها در درختان مورد مطالعه در جدول ۲ ارائه شده است.

## نتایج

در مجموع تعداد ۱۲۰ درخت مورد اندازه‌گیری قرار گرفتند که آماره‌های توصیفی متغیرهای کمی آنها در جدول ۱ آورده شده است. براساس داده‌های بدست آمده مشخص شد که هر یک از

جدول ۱- آماره‌های توصیفی متغیرهای کمی اندازه‌گیری شده در درختان

ضریب قدکشیدگی		ارتفاع (متر)		قطر برابر سینه (سانتی‌متر)	
دامنه	میانگین	دامنه	(انحراف‌معیار) میانگین	دامنه	(انحراف‌معیار) میانگین
۱۳-۳۸	۲۴	۹/۴-۱۸/۵	۱۳/۵ (۳/۳)	۳۰-۷۰/۵	۶۵ (۱۸/۵)

جدول ۲- سهم خطرآفرینی درختان کاج تهران

تعداد درختان سالم در طبقه معیار موردن بررسی	درختان خطرآفرین		درجه اهمیت	معیار خطرآفرین
	درصد	تعداد		
۳۱	۴۸	۵۷	کم	شاخه و سرشاخه‌های خشکیده
	۱۷	۲۰	متوسط	
	۱۰	۱۲	زیاد	
	۷۵	۸۹	مجموع	
۵۷	۲۳	۲۷	کم	شکاف یا ترک
	۸	۱۰	متوسط	
	۲۲	۲۶	زیاد	
	۵۳	۶۳	مجموع	
۸۰	۱۷	۲۰	کم	شاخدهی نامناسب
	۱۲	۱۴	متوسط	

	۵	۶	زیاد	
	۳۴	۴۰	مجموع	
۵۳	۲۷	۳۲	کم	زخم
	۱۵	۱۸	متوسط	
	۱۴	۱۷	زیاد	
	۵۶	۶۷	مجموع	
	۲۴	۲۹	کم	
۴۷	۲۰	۲۴	متوسط	پوسیدگی
	۱۷	۲۰	زیاد	
	۶۱	۷۳	مجموع	
	۳۴	۴۱	کم	
۴۱	۱۸	۲۲	متوسط	مشکلات ریشه
	۱۳	۱۶	زیاد	
	۶۵	۷۹	مجموع	
	۲۷	۳۲	کم	
۵۰	۱۸	۲۱	متوسط	وضعیت و ضعف ساختاری
	۱۱	۱۳	زیاد	
	۵۶	۶۶	مجموع	
	۱۷	۲۰	کم	
۵۶	۲۰	۲۴	متوسط	داخل با خطوط انتقال برق
	۱۷	۲۰	زیاد	
	۵۴	۶۴	مجموع	

از طرف دیگر معیار شاخه‌دهی نامناسب کمترین سهم خطر آفرینی (۳۴ درصد) را داشته است.

جدول ۲ نشان می‌دهد که در بین هشت معیار فوق دو معیار شاخه و سرشاخه‌های خشکیده و مشکلات ریشه به ترتیب با ۷۵ و ۶۵ درصد بیشترین سهم را در خطرآفرینی درختان دارند.

جدول ۳- طبقه‌بندی میزان خطرآفرینی درختان

کد طبقه	نمره خطرآفرینی	وضعیت خطرآفرینی	درصد درختان	تعداد درختان
۱	۰	بی خطر	۸	۹
۲	۱-۵	خطر بسیار کم	۲۵	۳۰
۳	۶-۱۰	خطر کم	۲۵	۳۰
۴	۱۱-۱۵	خطر متوسط	۳۴	۴۱
۵	۱۶-۲۰	خطر زیاد (خطرناک)	۶	۷
۶	۲۱-۲۴	خطر بسیار زیاد (خیلی خطرناک)	۲	۳

می باشد و درختان ۷۸ ساله کاج مورد مطالعه از نظر ضریب قدکشیدگی پایداری خوبی دارند که نشان می دهد درختان کاج در مقابل وزش بادهای شدید پایدار هستند، با توجه به اینکه در شهرستان بابل با وزش بادهای شدید درختان چنار و اوجا ریشه کن شدند (شکل ۶ و ۷). که نشان می دهد درختان اوجا و چنار برخلاف کاج از پایداری خوبی از نظر ضریب قدکشیدگی برخوردار نیستند و از این خطر آفرینی خساراتی بر روی وسایل نقلیه بوجود آوردن.

نتایج نشان داده است که ۱۰ درصد کل درختان مورد مطالعه (با درجه خطر زیاد) دارای شاخه و سرشاخه های خشکیده بودند که احتمال شکستن آنها در برابر وزش بادهای شدید بسیار زیاد است.



شکل ۶- افتادن درخت اوجا در شهرستان بابل

قطع این گونه درختان در برنامه های مدیریت درختان خطر آفرین همواره مورد تأکید بوده است که با نتایج Bassuk & Cowett, 2014 Albers et al., 1996; Maruthaveeran, & (2012) Porhashemi et al., 2010, Yaman, 2010, همخوانی دارد. با توجه به سهم این معیار در

نتایج جدول ۳ نشان داده است که ۵۸ درصد درختان آماربرداری شده دارای طبقه خطرآفرینی بی خطر، خطر بسیار کم و خطر کم هستند. همچنین نتایج نشان داده است که ۸ درصد درختان دارای خطر آفرینی زیاد (خطر زیاد و خطر بسیار زیاد) هستند و می باید مورد توجه قرار گیرند.

### بحث و نتیجه گیری

امروزه یکی از مباحث مهم در بحث خیابان های شهری، فضای سبز با زیبا شناختی آن است. لازم است که به فضای سبز و درختان شهری و حتی جنگلداری شهری و تاثیر مثبت آنها توجه بیشتری شود. درختان خیابانی از مهمترین عناصر سازنده پوشش های سبز شهری به شمار می آیند (۲۲). مشخصات و اطلاعات کمی و کیفی درختان خیابانی به ما برای برنامه ریزی های بعدی کمک می کند. با توجه به این موضوع که در مجاورت این درختان ساختمان ها و بناهای مختلفی وجود دارد و همچنین روزانه افراد و وسایل نقلیه زیادی در خیابان و پیاده رو در حرکت هستند، هر گونه عیب و نقصی در این درختان می توانند ایجاد خطرات مالی و جانی نماید (۲۵). بنابراین ضروری است وضعیت خطر آفرینی درختان در کلاسه های خطر آفرینی بررسی گردد و در کشورهای پیشرفته دنیا به آن توجه شده است (۹). نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که متوسط قطر برابر سینه و ارتفاع و ضریب قدکشیدگی به ترتیب ۶۵ سانتی متر،  $13/5$  متر و ۲۴ است (جدول ۱). این امر نشان دهنده تناسب ارتفاع و قطر زیاد درختان که ضریب قدکشیدگی درختان مناسب



شکل ۷- افتادن درخت چنار در شهرستان بابل



شکل ۸- وجود زخم و پوسیدگی درختان کاج

خطرآفرینی درختان، لزوم توجه بیشتر به این نقصه و اجرای اقدامات ترمیمی لازم از قبیل هرس شاخه‌های خشکیده احساس می‌شود. هرس به موقع درختان خیابانی باعث کاهش مخاطرات و خطرآفرینی می‌شود (۲). معیار شاخه دهی نامناسب خوشبختانه در مورد درختان کاج تهران سهم چندانی در خطرآفرینی نداشته است. زخم و پوسیدگی از دیگر معیارهای خطرآفرین کاج تهران بودند که به ترتیب ۱۴ و ۱۷ درصد از کل تعداد درختان را به خود اختصاص دادند. در واقع با افزایش سن درختان کاج در محیط شهری، در اثر عوامل طبیعی یا انسانی این زخم‌ها یا پوسیدگی‌ها پیش می‌آید (شکل ۸) که وجود زخم در تنہ امکان شکستن درخت از محل زخم را فراهم می‌سازد (۲۵).

مشکلات ریشه‌ای شامل طیف متنوعی می‌باشد که از مهمترین آنها می‌توان به بیرون‌زدگی ریشه‌ها، قطع شدن آنها و پوسیدگی ریشه اشاره نمود (۲۵) نتایج نشان داد که ۱۳ درصد درختان کاج دارای بریدگی و بیرون‌زدگی ریشه با درجه خطر زیاد بودند. این مقدار بخارتر درست‌کردن چند باره جدول، آبیاری و عبور مردم که باعث فشرده شدن خاک و بیرون آمدن ریشه می‌شود که با نتایج Porhashemi et al., (2012) برای گونه چنار در تهران همخوانی دارد. از مهم‌ترین مشکلات ریشه می-توان به بیرون‌زدگی ریشه‌ها که باعث کنده شدن سنجگفرش پیاده‌روها می‌شود و پوسیدگی شدید ریشه‌ها به دلایل مختلف از جمله به خاطر عبور و مرور وسایل نقلیه از روی آنها و یا



می‌شود. بنابراین باید توجه داشت که حدود نیمی از درختان دارای معايیت هستند که آنها را در طبقه‌های درختان خطر آفرین یا نزدیک به خطر آفرینی قرار داده است و در صورت برطرف نکردن معايیت اين درختان ممکن است در آينده نزدیک ميزان خطرآفرینی آنها بيشتر شده و نياز به هرس، تاجبرى یا قطع داشته باشند.

در نهايىت با توجه به اهميت موضوع اين پژوهش پيشنهاد مى‌شود ارزىابي خطرآفرینى درختان در كلية محيطهای شهرى بهخصوص در مورد درختان خيابانى و درختان موجود در پارك‌های شهرى در دستور کار متوليان امر قرار گيرد تا بتوان با شناسايى خطرات احتمالي هرچه سريع‌تر در صدد جلوگيرى از خطرات احتمالي برآمد.

ضرورت قطع درختان خطر آفرین شهرى بيش از مزاياي نگهداري آنهاست چرا که ماندن آنها موجب غافلگيرى و سقوط نابهنهنگام آنها، خطرات غير قابل جبران به همراه خواهد داشت. بدويهی است هرچه معايib درختان زودتر شناخته شود و اقدامات اصلاحی و پرورشی در سنين كمتر در مورد درختان اعمال شود، نتایج حاصل مفیدتر و خطرات احتمالي آتی كمتر خواهد شد. همچنین پيشنهاد مى‌شود در انتخاب گونه جهت کاشت در فضاهای شهری از نظر مقاومت و پايداری، زيباىی و ديرزيسىتى، بردباری و سازگاری نهايىت دقت بعمل آيد.

### References

- 1-Albers, J., T. Eiber, E. Hayes, P. Bedker, M. MacKenzie, J. O'Brien, J. Pokorny, & M. Torsello, 1996. How to recognize hazardous defects in trees. USDA Forest Service, NA-FR-01-96, 20 p.
- 2-Bassuk, N.L., Cowett, F.D, 2014. Statewide assessment of street trees in New York State, USA. Urban Forestry & Urban Greening 13: 213–220.

پوشاندن اطراف طوقه درخت با مصالح ساختماني اشاره نمود (۲۵). برای فاكتور وضعیت و ضعف ساختاري نتایج خطر آفرین با درجه زياد ۱۱ درصد بدبست آمد. اين نشان مى‌دهد که رنگ پريديگى درختان ممکن است به خاطر كمبود مواد غذائي در خاک آن باشد (۲۵). برای فاكتور تداخل با خطوط انتقال برق نتایج خطر آفرین با درجه زياد ۱۷ درصد بدبست آمد. اين نشان مى‌دهد که اگر درختان کاج حتماً باید از نظر خطر آفرینى مورد توجه قرار بگيرند. همچنین مجاورت خطوط انتقال برق با شاخه‌های خشکيده درختان، پتانسیل اين درختان را برای آتش‌سوزی بيشتر نموده به‌طوری که هرس شاخه‌های خشک آنها را الزامي مى‌سازد، بنابراین هرس زودهنگام و به موقع از توسيعه يك تاج جلوگيرى مى‌كند (۲۱).

وزن دهی طبقه‌های خطر آفرینى معيارهای هشتگانه برای كلية درختان کاج تهران نشان داد که ۵۸ درصد درختان آماربرداری شده دارای طبقه خطرآفرینى بي خطر، خطر بسيار کم و خطر کم هستند. همچنین نتایج نشان داده است که ۸ درصد درختان خطرآفرینى زيد (خطر زياد و خطر بسيار زياد) هستند و مى‌باید مورد توجه قرار گيرند که با نتایج (Porhashemi *et al.*, 2012) همخوانی دارد. قطع به موقع درختان خيابانى باعث کاهش مخاطرات از جمله افتادن شاخه‌ها یا تنه درختان پوسيده بر روی ماشين‌های عبوری

- 3-Burschel, P., & J. Huss., 1987. Grundriss des waldbaus. Verlag Paul Parey, Humburg und Berlin. 352 p.
- 4-Cumming, A.B., Twardus, D.B., Hoehn, R., Nowak, D.J., Mielke, M., Rideout, R., Butalla, H., Lebow, P., 2008. Wisconsin Street Tree Assessment 2002–2003. USDA Forest Service, Northeast Area State and Private Forestry, NA-FR-02-08, Retrieved from [http://na.fs.fed.us/pubs/fhm/street\\_trees/wi\\_street\\_tree\\_assessment\\_hr.pdf](http://na.fs.fed.us/pubs/fhm/street_trees/wi_street_tree_assessment_hr.pdf)
- 5-Dwyer, J.F., Nowak, D.J., Noble, M.H., Sisinni, S.M, 2000. Connecting people with ecosystems in the 21st century: an assessment of our nation's urban forests. Gen. Tech. Rep. PNW-GTR-490, U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Pacific Northwest Research Station, Portland, OR, 483 p. Retrieved from <http://www.ncrs.fs.fed.us/pubs/2517>
- 6-Ellis, D., 2011. Tree risk assessment and management, <http://www.decah.com>, 9 p.
- 7-Fazio, J.R., 1989. How to recognize and prevent hazard trees. Tree City USA Bulletin, No: 15. Nebraska City, NE: National Arbor Day Foundation, 8 p.
- 8-Gibbs, J.N., & B.J.W. Greig, 1990. Survey of parkland trees after the great storm of October 16 1987. Journal of arboriculture, 14: 321-347.
- 9-Golkar, K, 2001. Components of urban design quality. Journal of Soffeh, 11, 32: 38-65
- 10-Harris, R.W., Clark, J.R., Matheny N.P., 1999. Arboriculture: Integrated management of landscape trees, shrubs and vines. P. 484–509. Prentice-Hall, NJ.
- 11-Httf (Hazard Tree and Tree Felling) task group., 2008. Principles of Hazard tree risk management, Working Paper, 11 p.
- 12-Kane, B., 2008. Tree failure following a windstorm in Brewster, Massachusetts, USA 2007. Urban forestry and greening, 7: 15-23.
- 13-Kong, E., 2000. The hazard tree handbook. Mogavis Publishing. 131 p.
- 14-Laflamme, G., B.A. Gardinner, J.C. Ruel, A. Achim, & S. Meunier, 2005. Modeling the vulnerability of balsam fir forests to wind damage. Forest Ecology and Management, 1: 35-50.
- 15-Lonsdale, D., 1999. The principles of tree hazard assessment and management (research for amenity trees 7). Forestry Commission Handbook, Stationary Office Books, Vol. 7, 388 p.
- 16-Malekshahi, Gh., Anoshe, H., Esmaeilpor, A., Shokri, M., Kardgar, A., Zabihollahi, H., Rezvanian, E., Gholipour, Sh., Hosseini, H., 2001, Babol city of Citrus, Cheshmeh press, 544p.
- 17-Maruthaveeran, S., Yaman, A.R, 2010. The Identification of Criteria and Indicators to Evaluate Hazardous Street Trees of Kuala Lumpur, Malaysia: A Delphi Study. Journal of Forestry:360-364.
- 18-Miller, R.W., 1997. Urban forestry: planning and managing urban green spaces. Second edition, New Jersey, Prentice Hall, U.S.A, 502 p.
- 19-Mortimer, M.J., & B. Kane, 2004. Hazard tree liability in the United States: uncertain risks for owners and professionals, Urban Forestry and Urban Greening, 2(3): 159-165.
- 20-Mossadegh, A., 2005. Afforestation and forest nursery. University of Tehran press, 3<sup>th</sup> Edition. 516p.
- 21-Murad, A.G., 2000. Hazard evaluation of mature urban street trees in Kuala Lumpur. Unpubl. Masters thesis, Universiti Putra Malaysia, Selangor, Malaysia. 105 p.

- 22-Panahi, P., M. Zobeiri, S.M. Hoseini, & M. Makhdoum., 2003. Determination of appropriate inventory method in urban forestry. Iranian Journal of Natural Resources 56:191-200.
- 23-Pourmajidian, M.R., 2004. Technical Note of forest protection. Faculty of Natural Resources, Sari Agricultural and Natural Resources University, Sari, 50 p.
- 24-Pourmajidian, M.R., 2004. Technical Note of Afforestation and forest nursery. Faculty of Natural Resources, Sari Agricultural and Natural Resources University, Sari, 58 p.
- 25-Porhashemi, M., Khosropour, E., Heydari, M., 2012. The assessment of hazardous oriental plane (*Platanus orientalis* Linn.) trees in Valiasr street of Tehran. Iranian Journal of Forest, 4, 3:265-275.
- 26-Roloff, A., Korn, S., Gillner, S, 2009. The Climate-Species-Matrix to select tree species for urban habitats considering climate change. Urban Forestry &Urban Greening 8, 295–308.
- 27-Sabeti, H., 2008. Forests, Trees and Shrubs of Iran. University of Yazd press, 5<sup>th</sup> Edition. 806p.
- 28-Salavati, P., 2011. Quantity the benefits of urban forests and their management to estimate benefits, M.Sc. thesis, Islamic Azad University, Science and Research, 56p.
- 29-Smiley, E., R.B. Fraedrich, & P. Fengler., 2007. Hazard tree inspection, evaluation, and management. Urban and Community Forestry in the Northeast, Chapter 17: 277-294.
- 30-Soltani, A., Khoda Parast, B., 2011. Urban Street Evaluation Using a Human-Oriented Approach, Armanshahr Journal, 4: 97-110.
- 31-Yang, J., 2009. Assessing the impact of climate change on urban tree species selection: a case study in Philadelphia. Journal of Forestry 107, 364–372.



## **An investigation of dangers rate of Pine (*Pinus eldarica* Medw) trees in urban margins in Babol city**

M. R. Pourmajidian<sup>1</sup>, H. Aghajani<sup>2\*</sup>, A. Fallah<sup>1</sup>, M. Heydari<sup>2</sup>

### **Abstract**

The trees play a significance role in streets of cities. Hence, An important characterization of the public domain is street and one of the most important topics in the city streets, landscape with its aesthetic. Urban green space due to the environmental values is the main characteristic of each city. The first step for all of the management and planning of urban landscape, knowing information about urban trees is the first step to proper management. Due to recent occurrences the risk creation of trees in the Babol city. In this research, the assessment of hazardous pinus (*Pinus eldarica* Medw) in the Felestin street to University of Medical Sciences and Intersection of Farhang to Ghaziketi square, and all tree perfect inventoried. Trees were carried out on both sides of Farhang and Farmandari Street. Detected the types of tree defects were using risk criteria. Totally, 120 trees were sampled. After the analysis of data classify the level of hazardous in each criterion. The results showed that the dead woods and root problems tree structure are the main tree defects (with values of 75 and 65 percent of all sample trees, respectively), while weak branch unions and decay have less importance. With Regard to combination of tree defects, 12 trees (10% of all trees) were classified as very dangerous and must be removed. Other tree (average hazardous) must be crown pruning.

**Key words:** decay, urban forestry, urban environment, crown pruning

---

<sup>1</sup> - Professor of Forestry department, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari, Iran

<sup>2</sup> - Ph.D student of Silviculture and Forest Ecology, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari, Iran

\*Hamed\_Aghajani\_85@yahoo.com