

اثر پرایمینگ بر قدرت جوانه زنی بذر ذرت علوفه ای در شرایط تنش شوری

مسعود زاده باقری^{*}، استادیار گروه علوم باگبانی دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران
شورانگیز جوانمردی، محقق دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، استان فارس - ایران
محمد مجتبی کامل منش، استادیار گروه گیاه پزشکی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، ایران

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی تأثیر پرایمینگ بذر روی برخی از خصوصیات جوانه زنی گیاه ذرت علوفه ای انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل پرایمینگ با چهار سطح (صفر، ۱، ۲ و ۳ میلی مولار) سالیسیلیک اسید و تنش شوری شامل ۴ غلظت (صفر، ۱، ۲ و ۳٪) کلرید سدیم بود. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۳ تکرار در آزمایشگاه فیزیولوژی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز انجام گردید. پرایمینگ با سالیسیلیک اسید باعث بهبود درصد، سرعت و شاخص جوانه زنی شد. نتایج نشان داد که تأثیر پرایمینگ با سالیسیلیک اسید و اعمال تنش شوری بر درصد، سرعت و شاخص جوانه زنی، شاخص بینه بذر، وزن تر گیاهچه و ریشه‌چه معنی‌دار بود. بالاترین درصد، سرعت و شاخص جوانه زنی مربوط به بذرهایی بود که توسط سالیسیلیک اسید ۱ و ۲ میلی مولار پرایم شده و در محیط فاقد تنش شوری قرار داشتند. شاخص بینه بذر، وزن تر گیاهچه و ریشه‌چه معنی‌دار بود. بالاترین درصد، سرعت و شاخص در شرایط تنش شوری ۱٪ قرار داشتند. بیشترین مقدار را دارا بود. افزایش غلظت سالیسیلیک اسید به ۳ میلی مولار سبب کاهش صفات ارزیابی شده در این پژوهش شد. وزن تر گیاهچه در بذرهایی که توسط غلظت ۲ میلی مولار پرایم شده و در شرایط شوری ۰.۲٪ قرار داشتند بیشترین مقدار را داشت. بررسی اثر متقابل غلظت‌های مختلف سالیسیلیک اسید و کلرید سدیم تفاوت معنی‌داری به لحاظ وزن تر ریشه‌چه نشان نداد.

واژه های کلیدی: پرایمینگ، درصد جوانه زنی، ذرت علوفه ای، سالیسیلیک اسید، کلرید سدیم

* نویسنده مسئول: E-mail: zadehbagheri@iaushiraz.ac.ir

تاریخ پذیرش مقاله: ۹۴/۷/۱۳

تاریخ دریافت مقاله: ۹۳/۱۱/۱۵

مقدمه

در طبیعت گیاهان در برابر نوسانات محیطی مختلفی از جمله خشکی و شوری قرار دارند که رشد آنها را محدود می‌کند (۷). گیاهان برای حفظ بقای خود، مکانیسم‌های مختلفی برای سازش با این تغییرات محیطی دارند که از آن جمله می‌توان به مکانیسم‌های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و تغییرات مولکولی اشاره کرد (۷). تنفس شوری می‌تواند بر فرآیندهای فیزیولوژیکی، از جوانهزنی تا تکوین گیاه تأثیر گذار باشد. عدم جوانهزنی گیاهان در خاک شور، اغلب در اثر تجمع زیاد نمک در ناحیه کاشت بذر، به دلیل حرکت رو به بالای محلول خاک و متعاقب آن، وقوع تجمع نمک در سطح خاک می‌باشد (۲۴). در این شرایط، پیش تیمار بذر یکی از روش‌های بهبود جوانهزنی و رشد آن در شرایط تنفس محیطی می‌باشد. پرایمینگ در حقیقت روش تکامل یافته خیساندن و پیش جوانهدار کردن بذر است که طی آن مقدار پتانسیل آب طوری کنترل می‌شود که مرحله جذب آب و بخش عمدۀ فعالیت آنزیمی انجام شود، ولی ریشه‌چه خارج نگردد. این عمل ممکن است به روش‌های مختلف با استفاده از محلول‌های نمکی (پرایمینگ اسمزی)، مواد ماتریکسی، موجودات زنده نظیر باکتری‌ها، قارچ‌ها و جلبک‌ها (بیوپرایمینگ) و یا استفاده از آب در ظروف متحرک (پرایمینگ دروم) انجام شود (۲۱). علت تسريع جوانهزنی در این بذرها می‌تواند ناشی از افزایش فعالیت آنزیم‌های تجزیه کننده نظیر آلفا آمیلاز، افزایش سطح شارژ انرژی زیستی در قالب افزایش مقدار ATP، افزایش سنتز RNA و DNA، افزایش تعداد و در عین حال ارتقاء عملکرد میتوکندری‌ها باشد (۳). بذرهای تیمار شده وضعیت مطلوب‌تری از نظر عملکرد و ساختار غشای سلولی در مقایسه با بذرهای شاهد دارا می‌باشند. این موضوع از طریق مطالعه هدایت الکتریکی عصاره بذری قابل بررسی است.

به طوری که تراوش متابولیت‌های درون سلولی از غشای بذرهای تیمار شده کمتر می‌باشد. این امر در مورد بذر گراس‌ها به اثبات رسیده است (۲۲). یکی از ترکیبات مؤثری که می‌تواند در تیمار بذر مورد استفاده قرار گیرد، سالیسیلیک اسید است.

سالیسیلیک اسید از ترکیبات فنولی است که در گیاهان تولید می‌شود. این گروه از ترکیبات می‌تواند به عنوان تنظیم کننده رشد عمل کنند. کاربرد سالیسیلیک اسید ممکن است روی بسیاری از فرآیندهای گیاهان مانند جوانهزنی بذور (۹)، بسته شدن روزنه‌ها (۱۶) و تبادل و انتقال یون‌ها (۱۳)، نفوذپذیری غشاها (۵)، فتوستتر و سرعت رشد (۱۸) اثر داشته باشد. با توجه به اینکه مشکل شوری آب و خاک در بیشتر مزارع وجود دارد و همچنین ذرت یکی از کشت‌های اصلی سایر مناطق استان فارس می‌باشد، این مطالعه به منظور تعیین بهترین غلظت سالیسیلیک اسید جهت پرایمینگ و تأثیر آن در شرایط تنفس شوری بر جوانهزنی ذرت علوفه‌ای انجام شد.

مواد و روش‌ها

این آزمایش در آزمایشگاه فیزیولوژی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. ظروف پتروی شیشه‌ای جهت ضدغونی، با دمای ۱۲۱ درجه سانتی‌گراد به مدت ۱۵ دقیقه به اتوکلاو منتقل شدند. بذرهای ذرت را توسط هیپوکلریت سدیم ۱٪ ضدغونی شد و سپس ۳-۲ مرتبه توسط آب مقطر سترون شسته شدند. بعد از تهیه غلظت‌های صفر، ۱، ۲ و ۳ میلی‌مolar سالیسیلیک اسید، بذر ذرت علوفه‌ای (رقم ۷۰۴) به مدت ۲۴ ساعت در این محلول‌ها قرار گرفتند. پس از طی شدن دوره مورد نظر، بذرها با آب مقطر سترون شسته و روی کاغذ خشک کن کاملاً خشک شدند و تعداد ۵۰ عدد بذر به ظروف پتروی حاوی کاغذ صافی سترون در کف آن، انتقال یافت. برای ایجاد تنفس شوری از محلول کلرید سدیم با غلظت‌های صفر، ۱، ۲ و ۳٪ به میزان ۱۰ میلی‌لیتر به ازای هر ظرف پتروی استفاده شد. سپس درب آنها با پارافیلم کاملاً مسدود و برای جوانه‌زنی در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد به ژرمیناتور منتقل شدند.

جوانه‌زنی در این آزمایش به صورت خروج ریشه‌چه و گیاه‌چه حداقل به میزان ۵ میلی‌متر در نظر گرفته شد. شمارش بذرهای جوانه‌زده هر روز پس از شروع آزمایش انجام شد. روز هفتم وزن تر ریشه‌چه و گیاه‌چه اندازه‌گیری و ثبت گردید. سایر شاخص‌های مرتبط با جوانه‌زنی بذر به صورت زیر محاسبه گردید (۱۹).

درصد نهایی جوانه‌زنی (^۱FGP):

$$FGP = \sum \text{تعداد کل بذرها} / (100 \times \text{تعداد بذرهای جوانه‌زده تا روز I}) \quad (\text{رابطه ۱})$$

سرعت جوانه‌زنی (^۲GR) از رابطه ۲ زیر استفاده شد:

$$GR = \sum I / (100 \times \text{تعداد بذرهای جوانه‌زده تا روز I}) \quad (\text{رابطه ۲})$$

^۳I = شماره روزهای مورد نظر پس از شروع آزمایش
همچنین شاخص جوانه‌زنی (GI) به صورت زیر محاسبه شد:

$$GI = (g_n \times i_1) + (g_{n-1} \times i_2) + \dots + (n - (n-1) \times i_n) \quad (\text{رابطه ۳})$$

^۴i = آخرین روزی که تمام بذور جوانه‌زده در همان روز
شاخص بنیه بذر (VI): بر اساس رابطه ۴ محاسبه گردید (۲):

$$VI = 100 / (\text{درصد جوانه‌زنی} \times \text{میانگین طول ساقه‌چه (mm)}) \quad (\text{رابطه ۴})$$

۱- Final germination percent

۲- Germination Rate

۳- Germination Index

۴- Vigor Index

از نرم افزار SAS برای تجزیه آماری دادهها استفاده شد و مقایسه میانگین ها با آزمون LSD در سطح احتمال ۵٪ صورت گرفت.

نتایج و بحث

تأثیر پرایمینگ بذور توسط سالیسیلیک اسید بر سایر صفات مورد بررسی

بر اساس نتایج حاصل از مقایسه میانگین مشاهده شد، بذرهایی که توسط غلظت‌های ۱ و ۲ میلی‌مولار پرایم شدند، دارای بیشترین مقدار درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی، شاخص جوانه‌زنی و شاخص بنیه بذر بودند. همچنین کاربرد غلظت ۲ میلی‌مولار سالیسیلیک اسید به عنوان پیش تیمار سبب شد وزن تر گیاه‌چه و ریشه‌چه بیشترین مقدار را دارا باشد (جدول ۱).

جدول ۱: تأثیر پرایمینگ سالیسیلیک اسید بر صفات مورد بررسی

وزن تر ریشه‌چه (گرم)	وزن تر گیاه‌چه (گرم)	شاخص بنیه بذر	شاخص جوانه‌زنی	سرعت جوانه‌زنی	درصد جوانه‌زنی	غلظت سالیسیلیک اسید
۰/۰۱۷b	۰/۰۹۱c	۲۱/۶۶b	۲۱۰/۳۰b	۳۴۵/۰۰b	۶۹/۰۰b	آب مقطّر (صفرا)
۰/۰۱۳b	۰/۰۹۷b	۲۶/۶۴a	۲۹۱/۱۰a	۴۲۳/۳۰a	۸۴/۶۷a	۱ میلی‌مولار
۰/۰۲۵a	۰/۱۱۹a	۲۸/۶۷a	۲۷۹/۴۰a	۴۱۵/۸۰a	۸۳/۱۷a	۲ میلی‌مولار
۰/۰۱۱b	۰/۰۸۸c	۲۰/۱۰b	۲۲۰/۰۰b	۳۴۶/۷۰b	۶۹/۳۳b	۳ میلی‌مولار

میانگین های دارای حروف مشابه در هر ستون در سطح احتمال ۵٪ تفاوت معنی داری با یکدیگر ندارند

تأثیر تنش شوری بر سایر صفات مورد بررسی

بررسی صفات در اثر اعمال تنش شوری نشان داد، بذرهایی که در شرایط بدون تنش (شاهد) قرار داشتند، بیشترین درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی و شاخص جوانه‌زنی را دارا بودند. افزایش غلظت نمک منجر به کاهش صفات مذکور شد. بیشترین مقدار شاخص بنیه بذر (۳۰/۸۵) و وزن تر ریشه‌چه (۰/۰۲۴ گرم) مربوط به بذرهایی بود که در شرایط شوری یک درصد قرار داشتند. وزن تر گیاه‌چه‌هایی که در شرایط شوری ۲٪ قرار داشتند بیشترین مقدار را دارا بود (جدول ۲).

جدول ۲: تأثیر تنش شوری بر صفات مورد بررسی

وزن تر ریشه‌چه (گرم)	وزن تر گیاه‌چه (گرم)	شاخص بنیه بذر	شاخص جوانه‌زنی	سرعت جوانه‌زنی	درصد جوانه‌زنی	غلظت کلرید سدیم
۰/۰۱۳bc	۰/۰۶۶d	۲۴/۰۳b	۳۱۶/۳۰a	۴۵۲/۹۰a	۹۰/۵۸a	صفرا
۰/۰۲۴a	۰/۱۱۱b	۳۰/۸۵a	۲۷۰/۰۰b	۴۱۲/۵۰b	۸۲/۵۰b	٪ ۱
۰/۰۱۸b	۰/۱۱۷a	۲۳/۵۱b	۲۱۵/۹۰c	۳۵۱/۳۰c	۷۰/۲۵c	٪ ۲
۰/۰۱۰c	۰/۱۰۱c	۱۸/۶۷c	۱۹۸/۵۰c	۳۱۴/۲۰d	۶۲/۸۳d	٪ ۳

میانگین های دارای حروف مشابه در هر ستون در سطح احتمال ۵٪ تفاوت معنی داری با یکدیگر ندارند

بررسی اثر متقابل غلظت های مختلف سالیسیلیک اسید و تنفس شوری

در بررسی اثر متقابل غلظت های مختلف سالیسیلیک اسید و تنفس شوری مشاهده گردید، پرایم کردن بذور توسط غلظت ۱ و ۲ میلی مولار سالیسیلیک اسید و عدم استفاده از کلرید سدیم (غلظت صفر شوری) منجر به افزایش درصد، سرعت و شاخص جوانهزنی شد. بذرهایی که توسط آب مقطر پرایم شدند (هیدروپرایمینگ) و سپس در شرایطی که غلظت کلرید سدیم ۳٪ بود، قرار گرفتند کمترین درصد، سرعت و شاخص جوانهزنی را دارا بودند.

شاخص بنیه بذوری که توسط آب مقطر و یا اسید سالیسیلیک اسید با غلظت ۱ و ۲ میلی مولار پرایم شدند، در شرایط تنفس شوری با غلظت ۱٪ بیشترین مقدار را داشتند. وزن تر گیاهچه در بذوری که توسط غلظت ۲ میلی مولار سالیسیلیک اسید پرایم شدند و در شرایط تنفس شوری با غلظت ۲٪ قرار داشتند بیشترین مقدار را نشان داد. کاربرد آب مقطر به عنوان پیش تیمار و عدم استفاده از نمک سبب شد وزن تر گیاهچه ها به شدت کاهش یابد.

اثر متقابل غلظت های مختلف سالیسیلیک اسید و کلرید سدیم نشان داد که بذرهای پرایم شده توسط غلظت ۲ میلی مولار توانسته اند تا غلظت ۲٪ کلرید سدیم را تحمل کنند و از بیشترین وزن تر ریشه چه برخوردار بودند. افزایش غلظت سالیسیلیک اسید به ۳ میلی مولار سبب کاهش وزن تر ریشه چه شد. به طوری که بذرهای پرایم شده با این غلظت، در شرایط تنفس شوری ۳٪ کمترین وزن تر ریشه چه را دارا بودند (جدول ۳). با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش چنین استنباط می شود که، سالیسیلیک اسید با غلظت ۱ و ۲ میلی مولار از طریق کاهش اثر سمی و مخرب تنفس شوری باعث افزایش درصد، سرعت و شاخص جوانهزنی در بذرهای ذرت علوفه ای شده است. غلظت های ۱ و ۲ میلی مولار سالیسیلیک اسید بیشترین تأثیر را بر سرعت و درصد جوانهزنی داشتند و با افزایش غلظت پیش تیمار سالیسیلیک اسید به ۳ میلی مولار سرعت و درصد جوانهزنی در شرایط تنفس شوری افزایش نیافت (جدول ۳). پرایمینگ بذر با غلظت های مختلف هورمون های گیاهی موجب افزایش قابل ملاحظه جوانهزنی، رشد و عملکرد محصول در گونه های مختلف گیاهان زارعی تحت شرایط تنفس و نرمال گردیده است (۱۵ و ۱۷). بر اساس اظهارات وانگ و همکاران (۲۰۰۶)، سالیسیلیک اسید در رفع آسیب های اکسیداتیو طی جوانهزنی دخالت دارد و موجب بهبود جوانهزنی می شود.

همچنین سالیسیلیک اسید باعث افزایش بعضی از هورمون های گیاهی شامل اکسین و سیتوکنین ها می شود که این هورمون ها در تحریک جوانهزنی مؤثرند (۲۳).

جدول ۳: بررسی اثر متقابل غلظت‌های مختلف سالیسیلیک اسید و تنش شوری بر صفات مورد بررسی

وزن تر ریشه‌چه (گرم)	وزن تر گیاه‌چه (گرم)	شاخص بنیه بذر	شاخص جوانه‌زنی	سرعت جوانه‌زنی	درصد جوانه‌زنی	تنش شوری	غلظت سالیسیلیک اسید
۰/۰۱۸bcd	۰/۰۴۵i	۲۱/۵۵cdef	۲۸۷/۰۰bc	۴۲۶/۷۰bc	۸۵/۳۳bc	صفرا	آب مقطر (صفرا)
۰/۰۲۰bc	۰/۱۰۸de	۳۴/۱۰a	۲۸۰/۷۰bc	۳۹۶/۷۰cd	۷۹/۳۳cd	% ۱	
۰/۰۱۸bcd	۰/۱۲۲bc	۲۱/۷۲cdef	۱۵۲/۳۰ef	۳۲۰/۰۰fg	۶۴/۰۰fg	% ۲	
۰/۰۱۱cde	۰/۰۸۸fg	۹/۲۷g	۱۲۱/۰۰f	۲۳۷/۷۰h	۴۷/۳۳h	% ۳	
۰/۰۱۲cde	۰/۰۵۸h	۲۳/۷۵bcd	۳۳۵/۷۰a	۴۷۰/۰۰a	۹۴/۰۰a	صفرا	۱ میلی مولار
۰/۰۱۹bc	۰/۱۰۷de	۳۵/۲۵a	۲۹۳/۷۰bc	۴۴۳/۳۳ab	۸۸/۳۷ab	% ۱	
۰/۰۱۳bede	۰/۱۱۱cde	۲۲/۶۴bcde	۲۶۰/۰۰cd	۳۹۱/۷۰cd	۷۸/۳۳cd	% ۲	
۰/۰۰۷de	۰/۱۱۴cd	۲۴/۹۱bc	۲۷۵/۲۰bc	۳۸۸/۳۰de	۷۷/۶۷de	% ۳	
۰/۰۱۴bcde	۰/۰۸۴fg	۲۶/۵۱b	۳۴۳/۰۰a	۴۶۶/۷۰a	۹۳/۳۳a	صفرا	۲ میلی مولار
۰/۰۴۵a	۰/۱۲۷b	۳۴/۰۲a	۲۷۶/۸۰bc	۴۵۸/۳۰ab	۹۱/۶۷ab	% ۱	
۰/۰۲۴b	۰/۱۴۲a	۳۱/۴۹a	۲۶۶/۵۰bc	۳۹۱/۷۰cd	۷۸/۳۳cd	% ۲	
۰/۰۱۶bcde	۰/۱۲۱bc	۲۲/۶۶bcde	۲۳۱/۲۰d	۳۴۶/۷۰f	۶۹/۳۳f	% ۳	
۰/۰۰۹cde	۰/۱۰۲g	۲۴/۳۳bcd	۲۹۹/۷۰b	۴۴۸/۳۰ab	۸۹/۶۷ab	صفرا	۳ میلی مولار
۰/۰۱۲cde	۰/۱۰۲e	۲۰/۰۰def	۲۲۸/۸۰d	۳۵۱/۷۰ef	۷۰/۳۳ef	% ۱	
۰/۰۱۸bcd	۰/۰۹۰f	۱۸/۲۱ef	۱۸۴/۸۰e	۳۰۱/۷۰g	۶۰/۳۳g	درصد	
۰/۰۰۶e	۰/۰۸۲fg	۱۷/۸۴f	۱۶۶/۸۰e	۲۸۵/۰۰g	۵۷/۰۰g	% ۳	

میانگین‌های دارای حروف مشابه در هر ستون در سطح احتمال ۵٪ تفاوت معنی‌داری با یکدیگر ندارند

غلظت‌های بالای اکسین مانع جوانه‌زنی می‌شود، اما غلظت‌های پایین معمولاً محرك است (۲۳). بنابراین چنین استنباط می‌شود که، کاهش سرعت و درصد جوانه‌زنی بذور ذرت پرایم شده توسط سالیسیلیک اسید ۳ میلی مولار در اثر تولید اکسین با غلظت بالا می‌باشد. تأثیر پرایمینگ در افزایش سرعت جوانه‌زنی تعدادی گیاهان گزارش شده است. تحقیقات نشان داده که گیاه‌چه‌های حاصل از بذرهای تیمار شده این گیاهان با سرعت بیشتری استقرار می‌یابند (۸، ۱۲ و ۱۸). دوهال و برادفورد (۱۹۹۹) گزارش کردند که اثر اصلی پرایمینگ بر روی گوجه‌فرنگی از طریق کوتاه کردن فرصت زمان لازم جهت بیدار شدن (فعال شدن) نهایی اندوسپرم و افزایش توانایی جنین در جذب آب صورت می‌گیرد. همچنین هورلی و همکاران (۱۹۹۱) اعلام کردند که پرایمینگ سبب ایجاد برخی تغییرات فیزیولوژیکی از قبیل تغییر در مقدار قند و ترکیبات آلی و یون‌های تجمع یافته در بذر، ریشه و حتی برگ‌های گیاه می‌شود که باعث افزایش سرعت جوانه‌زنی و مقاومت بیشتر آن به شرایط نامساعد می‌گردد.

شاخص جوانه‌زنی نیز نشان داد که پرایم کردن بذور با سالیسیلیک اسید ۲ میلی مولار و عدم تنش شوری سبب افزایش این شاخص می‌شود. شاخص جوانه‌زنی به عنوان معیاری از سرعت سبز کردن بوده و به

عنوان شاخصی مناسب از ویگور و توان گیاهچه در نظر گرفته می شود. بزرگتر بودن کمیت عددی این صفت نشان دهنده حالت مناسبتر از نمود یا کارکرد گیاهچه در شرایط مزرعه می باشد. جوانهزنی بذر که اولین مرحله رشد و نمو گیاه است، ممکن است با عوامل محدود کننده محیطی مواجه گردد. این امر موجب انجام تحقیقات در مناطقی گردیده که در آنها وجود بستر سور برای جوانهزنی بذر و رشد اولیه گیاه چه یک مشکل عام و فراگیر می باشد (۲۰). اگر بذور یک رقم زراعی بتواند در شرایط نامطلوب نظیر سوری خاک، فعالیت آنزیمی را شروع کرده و با جوانهزنی در زمین استقرار یابد، می تواند تراکم بوته مطلوبی را ایجاد کرده و در نهایت عملکرد خوبی تولید نماید (۴).

در میان صفات مورد بررسی، در مرحله جوانهزنی به دلیل این که شاخص بنیه بذر از میانگین طول ساقه- چه ضرب در درصد جوانهزنی تقسیم بر ۱۰۰ حاصل می شود می توان غلظت هایی از سالیسیلیک اسید که از نظر این شاخص بالاتر هستند را به عنوان پیش تیمار مناسب جهت تحمل به سوری معرفی نمود. در میان غلظت های مورد بررسی، سالیسیلیک اسید از نظر این شاخص غلظت ۱ و ۲ میلی مولار بیشترین مقدار را دارا بود. گزارش شده است که بذرهای پرایم شده، بنیه بالاتری را نشان داده اند که این مسئله باعث سریعتر سبز شدن ساقه چه می شود (۶). همچنین خروج سریعتر گیاهچه باعث می شود تا گیاهچه سریعتر از شرایط نامطلوب فرار کرده و در نتیجه احتمال تولید گیاهچه زنده بیشتر خواهد بود.

علی رغم سریعتر بودن جوانهزنی بذور پرایم شده در غلظت ۱ و ۲ میلی مولار در شرایط فاقد سوری، بیشترین وزن تر گیاهچه در شرایط سوری ۲٪ مشاهده گردید. این مطلب نشان می دهد که برای تولید گیاهچه هایی با وزن تر بالاتر، تنها سرعت جوانهزنی بالاتر کافی نبوده و عوامل دیگری نیز در این مورد می توانند اثر گذار باشند. فریدون و همکاران (۲۰۰۳) گزارش کردند که فعالیت کربونیک آنهیدراز و سرعت فتوستتری در گیاهان خردل تیمار شده با سالیسیلیک اسید افزایش یافت. بر اساس اظهارات شکاری و همکاران (۱۳۸۹) استفاده از پرایمینگ باعث افزایش تعداد سلول های مزووفیل، غلظت کلروپلاست و مقدار کلروفیل شده و لذا هدر رفت نوری (نوری که از آن عبور می کند) کاهش یافته، که این مطلب باعث افزایش وزن تر گیاهچه می شود. نتایج نشان داد که پرایمینگ با سالیسیلیک اسید تأثیری بر وزن تر ریشه چه نداشت. احتمالاً تغییرات این صفت حاصل از سطوح مختلف بذور پرایم شده به صورتی بوده که این صفت تغییر معنی داری را نشان نداد. به عبارت دیگر، پیش تیمار بذر در بهبود رشد گیاهچه مؤثرتر از ریشه چه بوده است. بر اساس گزارش هریس و همکاران (۱۹۹۰)، با پرایم کردن بذور ذرت، برنج و نخود قبل از کاشت جوانهزنی و فاکتورهای مربوط به آن را تحت تنش شوری ارتقاء دادند.

منابع

- ۱- شکاری، ف.، بالحانی، ر.، صبا، ج.، افصحی، ک. و شکاری، ف. ۱۳۸۹. تأثیر پرایمینگ با سالیسیلیک اسید روی خصوصیات رشدی گیاهچه گاو زبان (*Boeago officinalis*). مجله دانش نوین کشاورزی، سال ششم، شماره ۱۸.

- 2- Abdul-Baki AA, Anderon JD.** 1973. Vigor determination in soybean by multiple criteria. *Crop Sci*13: 630-633.
- 3- Afzal I, Aslam N, Mahmood F, Hameed A, Irfan S, and Ahmad G.** 2004. Enhancement of germination and emergence of canola seeds by different priming techniques. *Caderno de Pesquisa Sér. Biological*, Santa Cruz do Sul 16 (1): 19-34.
- 4- Asgari, E. and Tagvayi, M.** 1998. Classification of durum wheat cultivars for drought resistance. Proceedings of 5th Iranian Congress of Crop Production and Plant Breeding. Seed and Plant Improvement Institute, Karaj, Iran. pp: 253-254. [In Persian with English Abstract].
- 5- Barkosky, R. R. and Einhellig, F. A.** 1993. Effects of salicylic acid on plant water relationship. *J. of Chem. Eco*.19: 237-247.
- 6- Basra SMA, Afzal I, Rashid RA, Hameed A.** 2005. Inducing salt tolerance in soybean by seed vigor enhancement techniques. *J.of Biotech. and Bioch* 1: 173-179.
- 7- Bohnert, H.J., Nelson, D.E., and Jensen, R.G.** 1995. Adaptation to environmental stresses. *Plant Cell* 7, 1099-111.
- 8- Capron, I, Corbineau, F. F., Dacher, C., Come, J. and Job, D.** 2000. Sugar beet seed priming: Effect of priming conditions on germination, solubilization, f1 I-S globulin and accumulation of LEA proteins. *Sci Res*. 10: 243-254
- 9- Cutt, J. R. and Klessig, D. F.** 1992. Salicylic acid in plants: A changing perspective. *Pharmaceutical Tech*. 16: 25-34.
- 10- Duhal, P. and Bradford, K. J.** 1990. Effects of priming and endosperm integrity on germination rates of tomato genotypes. II. Germination at reduced water potential. *Seed Science Research Journal of Experimental Botology* 41: 1441-1453.
- 11- Fariduddin, Q., Hayat, S. and Ahmad, A.** 2003. Salicylic acid influences net photosynthetic rate, carboxylation efficiency, nitrate reductase activity and seed yield in *Brassica juncea*. *Photosynthetica* 41: 281-28.
- 12- Foti, S., Cosentino, S. L., Basra, A. S. and Karssen, G. M.** 2002. Effect of osmoconditioning upon seed germination of sorghum, *Sorghum bicolor* (L.) Moench, under low temperatures. *Seed Sci. Tech*.30: 521-533.
- 13- Harper, J. P. and Balke, N. E.** 1981. Characterization of the inhibition of K⁺ absorption in oat roots by salicylic acid. *Plant Phys*. 68: 1349-1353.
- 14- Harris, D., A. Joshi., P. A. Khan., P. Gothkar., and P. S. Sodhi.** 1999. On-farm seed priming in semi-arid agriculture: Development and evaluation in maize, rice and chickpea in India using participatory methods. *Exp Agr*. 35: 15-29.
- 15- Hurly, R. F., Van Staden, J. and Smith, M. T.** 1991. Improved germination in seeds of guayule (*Parthenium argentatum*) following polyethylene glycol and gibberellic acid pretreatments. *Ann. Applied Bio*. 118:175-184
- 16- Larque-Saaveda, A.** 1979. Stomatal closure in response to salicylic acid treatment. *Plant phy*. 93: 371-375.
- 17- Lee, S. S., Kim, J. H., Hong, S. B., Yuu, S. H. and Park, E. H.** 1998. Priming effect of rice seeds on seedling establishment under adverse soil conditions. *Korean J. of Crop Sci* 43: 194-198.
- 18- Khan, W., Prithiviraj, B. and Smith, D.** 2003. Photosynthetic responses of corn and soybean to foliar application of salicylates. *J of Plant Phy*. 160: 485-492.
- 19- Khosh-Khui M.** 2005. Plant propagation: Principle and practices. Shiraz University Press, 378 pp. [In Persian with English Abstract].
- 20- Kyungjin, C., Ongseok, L., Dong, K. S. and Eunhi, H.** 1996. Dry matter production and seed yield of soybean cultivars as affected by excessive water stress at vegetative growth and flowering stages, RDA. *J. of Agri Sci. Upland Industry. Crop Sci* 38: 2. 117-122 .
- 21- Parera CA and Cantliff DJ.** 1994. Pre-sowing seed priming. In: J Janick (ed.). *Horticultural Rev*. 16: 119-141.
- 22- Pill W G, Necker AD.** 2001. The effect of seed treatment on germination and establishment of Kentucky blue grass (*Poa pretenses* L.). *Seed Sci. and Tech*. 29: 65-72.
- 23- Shakirova FM, Sahabutdinova DR.** 2003. Changes in the hormonal status of wheat seedlings induced by salicylic acid and salinity. *Plant Sci*. 164: 317-322.
- 24- Valdiani AR, Hassanzadeh A, Tajbakhsh M.** 2006. Study on the effects of salt stress in germination and embryo growth stages of the four prolific and new cultivars of winter rapeseed (*Brassica napus* L.). *Pajohesh and Sazandegi* 66: 23-32. [In Persian with English Abstract].
- 25- Wang L, Chen S, Kong W, Li S, Archbold DD.** 2006. Salicylic acid pretreatment alleviates chilling injury and affects the antioxidant system and heat shock proteins of peaches during cold storage. *Post harvest Bio. and Tech*. 41: 244-251.