

بررسی اثر عصاره تام الکلی ستاره شکننده دریایی خلیج فارس

به روش بروون تنی

سجاد فرج یار^۱، جواد بهار آرا^{۲*}، فریده نامور^۳، مرتضی بهنام رسولی^۴، طبیه رمضانی^۵

۱-دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی تکوینی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، خراسان رضوی، ایران.

۲-استاد، گروه زیست شناسی و مرکز تحقیقات بیولوژی کاربردی تکوین جانوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، خراسان رضوی، ایران.

baharara78@gmail.com

۳- گروه زیست شناسی و مرکز تحقیقات بیولوژی کاربردی تکوین جانوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، خراسان رضوی، ایران.

۴- استاد، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، خراسان رضوی، ایران.

۵- دانشجوی دکتری زیست شناسی تکوین جانوری، دانشکده علوم پایه، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

تاریخ دریافت: ۹۴/۱/۴ تاریخ پذیرش: ۹۴/۵/۲۵

چکیده

مقدمه و هدف: فرآورده های طبیعی در مقایسه با داروهای شیمیایی دارای عوارض جانبی کمتر و تهیه به مراتب آسان تر می باشند. ستاره شکننده دریایی واحد مواد فعال زیستی از جمله ساپونین ها و فنتاکوپیون است. در پژوهش حاضر اثرات عصاره تام الکلی ستاره شکننده دریایی خلیج فارس به روش بروون تنی بررسی شده است.

روش کار: عصاره تام الکلی ستاره شکننده دریایی در غلظت های ۴۰۰، ۳۰۰، ۲۰۰، ۱۰۰ میکروگرم/میلی لیتر تهیه شد. فعالیت ضد التهابی عصاره تام الکلی ستاره شکننده از طریق برسی مهار دناتوره شدن آلبومین، پایداری غشاء گلbul قرمز و مهار فعالیت پروتئینازی در مقایسه با آسپرین به عنوان داروی استاندارد ضد التهابی ارزیابی گردید. داده های حاصل با نرم افزار SPSS و آزمون آماری T در سطح معنی داری <0.05 P> تحلیل گردید.

یافته ها: نتایج حاصل نشان داد که عصاره تام الکلی ستاره شکننده خلیج فارس باعث مهار دناتوره شدن آلبومین در غلظت ۳۰۰ میکروگرم/میلی لیتر و باعث پایداری غشاء گلbul قرمز در غلظت ۴۰۰ میکروگرم/میلی لیتر و نیز مهار فعالیت پروتئینازی در غلظت ۴۰۰ میکروگرم/میلی لیتر شد.

نتیجه گیری: نتایج بیان گر آن است که عصاره تام الکلی ستاره شکننده خلیج فارس دارای اثرات ضد التهابی است و این فرآورده طبیعی دریایی می تواند کاندید مناسبی در مطالعات بیماری های رایج التهابی به شمار آید.
واژه های کلیدی: التهاب، ستاره شکننده، آلبومین، غشاء گلbul قرمز، فعالیت پروتئینازی.

amer baust asasun urouq xonni nahiye asib diideh mi grrdd
و موجب تراوایی مویرگ های خونی می شود که نتیجه
نهایی این فرآیندها افزایش جریان خون آن ناحیه می-
باشد(۱۴). یک پاسخ مفرط التهابی می تواند باعث فساد
و مرگ بافت و در ادامه این روند موجب بروز بیماری-
هایی با التهابات مشخص می گردد. از جمله این بیماری-
ها می توان به آرتربیت روماتوئید، کرون، آزلایمر،
مالیتیپل اسکلورازیس و ایسکمی قلب و مغز اشاره
نمود(۵). پاسخ های التهابی اکثر آن به وسیله جراحات بافتی
القا می شوند و سرانجام باعث بازگرداندن ساختار طبیعی

مقدمه

هنگامی که بافت بر اثر ورود باکتری ها، ضربه، مواد شیمیایی، گرما یا هر پدیده دیگر آسیب بیند، مواد متعددی از آن رها می شود که باعث تغیرات ثانویه شدید در بافت می گردد و به مجموعه ای این تغیرات بافتی التهاب اطلاق می شود(۲۲). هدف از این تغیرات حذف عامل التهاب زا و هم چنین افزایش سرعت تکثیر مجدد بافت آسیب دیده است. زمانی که یک بافت آسیب می بیند طیفی از مواد گوناگون نظری هیستامین و پروستاگلاندین را به طور گسترده آزاد می نماید که این

سیستم ایمنی و سیستم عصبی اثر خود را اعمال می نمایند و در نهایت ۶۸ متابولیت دریایی شناخته شده است که قادر به واکنش با گیرنده های متنوع مولکولی می باشند(۱۶). فرآورده های طبیعی حاصل از محیط های دریایی به جهت داشتن پتانسیل دارویی قوی در درمان بیماری های متعدد التهابی مورد توجه هستند(۲). در طب سنتی ارگانیسم های دریایی جهت ترمیم زخم و هم چنین بهبود ضایعات استفاده می شوند(۲۰). رده افیوریده متعلق به شاخه خارپستان می باشد که این شاخه از جانوران به علت داشتن توانایی در ترمیم بازوها مشهور هستند(۴). ستاره شکننده دارای مواد فعال بیولوژیکی از جمله نفتاکوئین، کارتونوئید سولفات و هم چنین گلیکوزیدهای استروئیدی می باشد(۱۰). از آن جا که اثرات التهابی عصاره ستاره شکننده خلیج فارس تاکنون بررسی نشده است در تحقیق حاضر به این مهم توجه شده است.

مواد و روش ها

این پژوهش تجربی در مرکز تحقیقات بیولوژی کاربردی تکوین جانوری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد انجام شده است. جهت انجام این پژوهش نمونه های زنده ستاره شکننده دریایی در اوایل فصل بهار سال ۹۲ از سواحل جزیره قشم از عمق ۳ تا ۴ متری جمع آوری و نمونه ها با توجه به مشخصات ذکر شده در منابع معتبر با همکاری کارشناسان اداره شیلات جزیره قشم شناسایی گردیدند(۱۳). نمونه ها بعد از شستشو در فریزر -۲۰ درجه سانتی گراد برای مدت ۲۴ ساعت منجمد و سپس به آزمایشگاه منتقل و پس از انجام بررسی های مورفومتریک لازم در فریزر -۸۰ سانتی گراد قرار داده شدند.

آماده سازی عصاره

نمونه های مورد نظر پس از یخ زدایی و خشک شدن به دور از نور آفتاب کاملاً با دستگاه هموژنایزر پودر شده

باft و عملکرد طبیعی آن به وسیله ترمیم خواهد شد(۳). شدت پاسخ التهابی عامل بسیار مهمی می باشد به طوری که یک پاسخ نامناسب می تواند باعث نقص سیستم ایمنی گردد که این اتفاق می تواند موجب آلودگی بیشتر گردد. به علاوه التهاب طولانی مدت می تواند زمینه ساز ظهور بسیاری از بیماری های دیگر از جمله سرطان گردد(۱۰). از این رو درمان و کاهش دوره ای التهاب ضروری به نظر می رسد. داروهایی که هم اکنون جهت کاهش و یا درمان التهاب استفاده می شوند به طور عمده از مواد مادر و یا سالسیلات و کورتیکوستروئیدها ساخته شده اند که دارای خاصیت سمی و عوارض جانبی فراوان هستند. بنابراین امروزه مطالعه فرآورده های طبیعی کانون توجه پژوهشگران قرار گرفته است(۱۹). اقیانوس ها چشم انداز وسیعی از مواد معدنی، داروها و غذاهای جدید را برای ما می گشایند و در عرصه های پزشکی، کشاورزی، علوم مواد و شیمی، فرآورده های طبیعی و پالایش زیستی کاربردهای زیادی دارد(۹). یکی از منابع اتمام ناپذیر برای تهیه مواد دارویی، آب های دریاها و اقیانوس ها هستند و سهم بزرگی از ترکیبات طبیعی از ارگانیسم های دریایی استخراج می شوند. تحقیقات سیستماتیک بر روی داروهای جدید، نشان می دهند که موجودات دریایی به ویژه اسفنج ها، تونیکات ها، اسیدین ها، خزه ها، هشت پاهای، حلزون ها، کرم ها و خارپستان نسبت به ارگانیسم های خشکی زی، دارای خواص آنتی بیوتیکی، ضدسرطانی و ضد التهابی بیشتری هستند(۹). به طور خلاصه یافته های فارماکولوژیکی جدید تاکنون، ۱۰۲ ترکیب دریایی که دارای اثرات آنتی باکتریایی، آنتی کوآگولانتی، ضدانگلی، ضدقارچی، ضد مالاریایی، ضد پروتوزوآئی و ضد ویروسی هستند، را معرفی می کنند(۱۶). هم چنین ۶۰ ترکیب دریایی نیز با اثرات ضد التهابی و ضد دیابتی گزارش شده است که با تاثیر روی

عصاره ستاره شکننده افزوده گردید. کلیه ی لوله ها در حمام آب گرم در دستگاه بن ماری (شرکت ریحان طب ساخت ایران) در دمای ۵۶ درجه سانتی گراد برای مدت زمان ۳۰ دقیقه انکوبه شدند. در انتهای زمان لازم انکوباسیون کلیه ی لوله ها در زیر جریان آب جهت سرد شدن قرار گرفتند. در نهایت محلول های به دست آمده در ۲۵۰۰ دور بر دقیقه به مدت زمان ۵ دقیقه سانتریفیوژ (supernatants) بالایی (Sigma, USA) گردیدند و جذب محلول اسپکتروفوتومتر (Bioteck, USA) خوانده و کلیه تجربیات ۳ مرتبه تکرار شد. درصد خاصیت پایدار کننده غشا گلbulous با فرمول زیر محاسبه گردید.

جذب کنترل / ۱۰۰ × (جذب نمونه - جذب کنترل) = درصد خاصیت پایدار کننده غشا

خاصیت مهار فعالیت پروتئینازی

آزمایش با توجه به روش Oyedepo و همکاران انجام شد (۱۰). محلول مورد آزمایش به حجم ۲ میلی لیتر شامل ۰/۰۶ میلی گرم تریپسین و ۱ میلی لیتر بافر Tris ۲۰ میلی مولار (pH: ۷/۴) به همراه ۱ میلی لیتر از نمونه در غلظت های ۱۰۰، ۴۰۰، ۸۰۰، ۲۰۰ میکرو گرم بر میلی لیتر تهیه گردید. محلول مورد آزمایش در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد به مدت ۵ دقیقه انکوبه و سپس ۱ میلی لیتر از محلول کازئین ۰/۸٪ حجمی / وزنی به آن اضافه شد. محلول به دست آمده دوباره برای مدت ۲۰ دقیقه شد. محلول کلروریک ۶۰٪ به محلول فوق اضافه شد. سپس محلول بعد از اضافه شدن اسید ابری گون گشته و جذب محلول رویی در ۲۱۰ نانومتر به وسیله اسپکتروفوتومتر (Bioteck, USA) قرائت گردید. کلیه تجربیات ۳ مرتبه تکرار و درصد فعالیت مهار پروتئینازی به وسیله فرمول زیر محاسبه شد.

و سپس به ازای هر ۱ گرم پودر خشک عصاره ۱۰ میلی لیتر متابول خالص اضافه گردید. پس از ۷۲ ساعت مخلوط با کاغذ واتمن شماره ۱ فیلتر و به وسیله دستگاه روتاری اوپوریتور عصاره تغليظ و در دستگاه انجماد در خلاء خشک شد (۱).

ارزیابی فعالیت ضد التهابی مهار دنا توره شدن آلبومین

با استفاده از روش Mizushima فعالیت ضد التهابی عصاره های ستاره شکننده دریایی بررسی (۱۵) و از آسپرین به عنوان داروی استاندارد استفاده گردید (۲۰). عصاره با غلظت های سریالی ۰، ۱۰۰، ۳۰۰، ۲۰۰، ۴۰۰ و ۶۰۰ میکرو گرم بر میلی لیتر به سرم آلبومین گاوی اضافه و به مدت ۲۰ دقیقه در ۳۷ درجه سانتی گراد انکوبه و سپس تا ۵۷ درجه سانتی گراد گرم شد، سپس در نهایت کدورت، در ۶۶۰ نانومتر اندازه گیری گردید. کلیه تجربیات ۳ مرتبه تکرار و درصد مهار دنا توره شدن پروتئین به وسیله فرمول زیر محاسبه شد.

جذب کنترل / ۱۰۰ × (جذب نمونه - جذب کنترل) = درصد مهار

حافظت از پایداری غشای گلbulous قرمز

خون تازه از افراد داوطلب سالم که در ۲ هفتگی منتهی به آزمایش هیچ گونه داروی ضد التهابی غیر استروئیدی مصرف نکرده بودند تهیه و به لوله های هپارینه منتقل گردید. لوله ها در ۳۰۰۰ دور بر دقیقه برای مدت ۱۰ دقیقه سانتریفیوژ و بعد از آن ۳ مرتبه با حجم مشخص برابر با سرم نرمال سالین شستشو گردیدند. حجم خون به دست آمده جهت تهیه محلول ۱۰٪ حجمی / حجمی به همراه نرمال سالین مورد استفاده قرار گرفت (۱۶). محلول مورد آزمایش به حجم ۲ میلی لیتر شامل ۱ میلی لیتر محلول داروی استاندارد و ۱ میلی لیتر محلول گلbulous های قرمز آمده گردید. در گروه کنترل به محلول گلbulous های نرمال سالین اضافه شد. به سایر لوله ها غلظت های ۶۰۰، ۵۰۰، ۴۰۰ میکرو گرم بر میلی لیتر از

۶۰۰ میکروگرم/میلی لیتر حفاظت معادل ۱۰ کاهش داشت(۰/۰۰۱ P) (جدول ۲).

خاصیت مهار فعالیت پروتئینازی
در این روش حداقل مهار فعالیت پروتئینازی عصاره ها در غلظت ۴۰۰ میکروگرم بر میلی لیتر بدست آمد. آسپرین به عنوان داروی استاندارد در غلظت ۲۰۰ میکروگرم بر میلی لیتر مهاری به اندازه ۴۶/۴۸٪ را نشان داد(۰/۰۰۱ P) (جدول ۳).

بحث و نتیجه گیری
دناتوره شدن پروتئین ها فرآیندی است که در طی آن پروتئین ها ساختار سوم و دوم خود را تحت تاثیر عوامل خارجی مانند: اسید یا باز، گرمای سرما، نمک های آلی و غیر آلی از دست می دهند. این تغییر باعث از بین رفتن عملکرد زیستی پروتئین ها می شود(۱۴). دناتوره شدن پروتئین ها یک دلیل بسیار خوب برای التهاب می باشد(۴).

جذب کنترل/ ۱۰۰×(جذب نمونه-جذب کنترل)
درصد خاصیت مهار پروتئینازی

داده های کمی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ توسط آزمون t و تست تعقیبی توکی در سطح $P < 0.05$ تحلیل شد.

نتایج

داده های حاصل از بررسی مهار دناتوره شدن آلبومین پس از آنالیزهای آماری لازم مورد ارزیابی قرار گرفتند(جدول ۱). نتایج حاصل نشان داد که غلظت های مختلف عصاره ستاره شکننده دارای قدرت مهار دناتوره شدن آلبومین می باشد. به طوری که بیشترین اثر مهاری در ۳۰۰ میکروگرم/میلی لیتر مشاهده گردید(۰/۰۰۱ P).

حفظاظت از پایداری غشای گلبول قرمز
بهترین نتیجه در این آزمایش در غلظت ۴۰۰ میکروگرم/میلی لیتر با حفاظتی معادل ۴۰/۵۵ بدست آمد(۰/۰۰۱ P). با افزایش غلظت عصاره قدرت حفاظت از پایداری غشاها کاهش یافت، به طوری که در غلظت

جدول ۱- مقایسه اثر غلظت های مختلف عصاره ستاره دریابی شکننده و آسپرین بر میانگین درصد مهار دناتوره شدن آلبومین گروه آزمایش غلظت(میکروگرم/میلی لیتر) درصد مهار

| کنترل | ۰ | ۱۱/۵۶ | ۱۰۰ |
|--------------|---|-------|-----|
| عصاره | ۰ | ۳۲/۳۷ | ۲۰۰ |
| ستاره شکننده | ۰ | ۳۶/۱۵ | ۳۰۰ |
| دریابی | ۰ | ۲۲/۳۹ | ۴۰۰ |
| آسپرین | ۰ | ۱۷/۱۷ | ۵۰۰ |
| | ۰ | ۱۴/۰۳ | ۶۰۰ |
| | ۰ | ۷۱/۳۶ | ۲۰۰ |

جدول ۲- مقایسه اثر غلظت های مختلف عصاره ستاره دریابی شکننده بر میانگین درصد حفاظت از پایداری غشای گلبول قرمز گروه آزمایش غلظت(میکروگرم/میلی لیتر) درصد حفاظت

| کنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
|---------------------|---|--------|-----|
| عصاره | ۰ | ۴۰/۵۵ | ۴۰۰ |
| ستاره شکننده دریابی | ۰ | *۳۱/۸۴ | ۵۰۰ |
| | ۰ | *۳۰/۳۱ | ۶۰۰ |

جدول ۳- مقایسه اثر غلظت های مختلف عصاره ستاره دریابی شکننده و آسپرین بر میانگین درصد مهار فعالیت پروتئینازی

| گروه آزمایش | غلظت(میکروگرم/میلی لیتر) | درصد مهار |
|-------------|--------------------------|-----------|
|-------------|--------------------------|-----------|

| | | کنتrol |
|-------|-----|---------------------------|
| ۵/۰۵ | ۱۰۰ | |
| ۵۷۵ | ۲۰۰ | عصاره ستاره شکننده دریایی |
| ۶۰۳ | ۴۰۰ | |
| ۵/۵۵ | ۸۰۰ | |
| ۴۶/۴۸ | ۲۰۰ | آسپرین |

حافظت از پایداری غشای گلبول قرمز

از دیگر عواملی که منجر به پیش برد التهاب می‌گردد ناپایداری غشای لیزوژوم ها می باشد(۱۸). پایداری غشای لیزوژومی در محدود کردن پاسخ التهابی مهمی است. این امر با جلوگیری از آزاد سازی محصولات نوتروفیل های فعال همانند: آنزیم های باکتریایی و پروتئینازی انجام می گیرد این عوامل باعث افزایش آسیب و التهاب بافتی می گردد و داروهای غیر استروئیدی ضد التهاب نیز به وسیله مهار آنزیم های لیزوژومی و یا پایداری غشا لیزوژومی عمل می کنند(۱۵). پایداری غشا گلبول های قرمز انسانی به عنوان روش برونشی براي مطالعه فعالیت ضد التهابی عصاره ستاره شکننده دریایی استفاده گردید. غشا گلبول های قرمز بسیار شبیه غشای لیزوژومی می باشد(۱۷). همان طور که می دانید گرمای بیشتر از ۴۰ درجه سانتی گراد باعث همولیز خون می شود. طی این پدیده دیواره گلبول های قرمز پاره شده و سلول های خونی ته نشین می گردند(۱۶). لذا با توجه به این که در طی التهاب دمای منطقه ای در گیر التهاب بالا می رود ممکن است سلول های خونی آن ناحیه دچار آسیب های فراوانی گردند و در نتیجه روند بهبودی با وقفه روپرو شود و از طرفی دیگر طی فرآیند التهاب پروتئین ها نیز به شدت در گیر می شوند و این در گیری ممکن است در مورد پروتئین های سطح سلول ها اتفاق بیافتد که این پدیده می تواند باعث افزایشی در انقباض یا چروک شدن غشای سلول شود که در نتیجه باعث لیز شدن غشا و پروتئین های آن

به طوری که در بسیاری از بیماری های التهابی برخی از پروتئین ها با از دست دادن ساختار سوم و چهارم خود عملاً دنا توره شده و فاقد عملکرد مشخص می گردد. بنابراین در طی مطالعات ضد التهابی بسیاری از محققین با استفاده از روش Mizushima به مطالعه ای این اثرات پرداختند(۷). نتایج این پژوهش نشان داد که بهترین غلظت عصاره ستاره دریایی که مانع از دنا توره شدن یا مهار آن می شود غلظت ۳۰۰ میکرو گرم/میلی لیتر است. غلظت های کمتر از این غلظت، احتمالاً به دلیل وجود کمتر مواد موثر و فعال بیولوژیکی، دارای اثرات مهاری کمتر در حالی که غلظت های بالاتر از این غلظت نیز دارای اثرات مهاری کمتر بودند. احتمالاً وجود ترکیبات و مواد دیگری از جمله ساپونین باعث ایجاد اثرات مخرب بر پروتئین ها می شوند که این امر نهایتاً باعث دنا توره شدن پروتئین در این آزمایش گردید(۲۱). در سال ۲۰۱۱ Govindappa و همکاران در بررسی اثرات ضد التهابی گیاه *Wedelia trilobata* از این روش استفاده کرددند و نشان دادند که عصاره الکلی برگ و ساقه گیاه فوق در غلظت هایی مشخص دارای اثرات مهاری بر دنا توره شدن پروتئین ها می باشند(۱۰). در پژوهشی که در سال ۲۰۱۰ توسط Sakat و همکارانش بر روی اثرات ضد التهابی و آنتی اکسیدانی گیاه *Oxalis corniculata* انجام شد، نتایج نشان دادند که عصاره الکلی گیاه فوق دارای اثرات ضد التهابی می باشد. برای این منظور آنان از روش میزو شیما با اندکی تغییر استفاده کردند(۱۷).

خاصیت مهار فعالیت پروتئینازی

پروتئینازها دارای عملکرد در واکنش های آرتیریتی هستند(۱۷). نوتروفیل ها به عنوان منبع مهمی از پروتئینازهای سرینی شناخته می شوند و این پروتئینازهای سرینی در لیزوژوم ها به فراوانی یافت می شوند(۱۸). قبل اگر ارش شده است که پروتئینازهای لوکوسیتی نقش مهمی را در پیشبرد آسیب های بافتی طی پاسخ التهابی ایفا می کنند و سطح معنا داری از محافظت در برابر التهاب توسط مهار فعالیت های پروتئینازی به وجود می آید به عبارت دیگر پایداری لیزوژومی در محدود کردن پاسخ التهابی که به وسیله جلوگیری از آزاد سازی اجزای نوتروفیل های فعال همانند آنزیم های باکتریایی و پروتئینازی که باعث التهاب بیشتر بافتی و آسیب آن به علت آزادسازی در فضای بین سلولی می شود بسیار مهم است(۱۹). یافته های پژوهش حاضر نشان داد که عصاره ستاره ای شکننده دریابی بیشترین خاصیت مهار فعالیت پروتئینازی را در 400 میکروگرم بر میلی لیتر معادل 60% نشان داد. به نظر می رسد عصاره ها در این آزمایش دارای توانایی کافی در مهار آبشارهای التهابی که توسط لوکوسیت ها به ویژه نوتروفیل ها راه اندازی می گردند، نمی باشند. در مطالعات فراوانی نشان داده است که فلاونوئیدها و پلی فنول ها می توانند به طور مشخص دارای نقش آنتی اکسیدانی و ضد التهابی باشند(۱۴). بنابراین احتمالاً حضور بسیار کم این مواد در عصاره ستاره شکننده دریابی باعث فعالیت کم ضد پروتئینازی این عصاره شده است. Li و همکارانش نیز در سال ۲۰۱۰، در پژوهش های خود پیتیدهای ضد میکروبی که مولکول های موثر و مهمی در سیستم ایمنی خارپوستان محسوب بیشتر دارای اثرات آنتی باکتریایی، آنتی ویروسی و

می شود(۶). نتایج نشان داد که حداقل حفاظت از غشای گلبول قرمز در غلظت $400\text{ میکروگرم}/\text{میلی لیتر}$ معادل $40/55\%$ مشاهده گردید. غلظت های پایین تر اثری بر حفظ پایداری غشا نداشت که می تواند به علت حضور کمتر مواد ضد التهابی در غلظت های کمتر عصاره باشد در حالی که در غلظت های بالاتر عصاره پدیده لیز غشا بیشتر می گردد. این پدیده بدین معنا است که غلظت های بالاتر عصاره منجر به پیشبرد تجزیه غشای گلبول قرمز می گردد. حضور برخی از مواد موجود در عصاره از جمله ساپونین و آستروساپونین ها می تواند در پیشبرد تجزیه سلول ها دخالت داشته باشد. در سال ۲۰۱۱ Govindappa و همکاران در بررسی اثرات ضد التهاب گیاه *Wedelia trilobata* از روش القای همولیز خون بر اثر گرما استفاده کردند. نتایج آن ها نشان داد که عصاره گیاه فوق از غشای گلبول های قرمز در مجاورت حرارت حفاظت می کند(۱۰). پیتیدهای ضد میکروبی، مولکول های موثر و مهمی در سیستم ایمنی خارپوستان محسوب می شوند که اثر ضد التهابی دارند(۱۵). هم چنین افیوروئیدین موجود در ستاره شکننده(به عنوان اولین تریپتانترین مشتق شده از فرماروی جانوران) نیز، دارای اثر ضد التهابی می باشد(۱۲). لذا به نظر می رسد در تحقیق حاضر به دلیل وجود پیتیدهای ضد میکروبی و تریپتانترین، احتمالاً با اثرات ضد التهابی در جهت کاهش دوره التهاب، پیش برده شده است. با توجه به یافته های فوق، به نظر می رسد بخشی از اثرات ضد التهابی ستاره شکننده در این تحقیق، احتمالاً به دلیل سایتوکاین های موجود در مایع سلومی درون بدن این نوع از بی مهره ای آبزی است که موجب پاسخ ایمنی همورال می گردد، این مولکول ها قادر به شناسایی و تغذیه مواد خارجی، ترویج مهاجرت سلولی و آگلوتینه کردن هستند و نقش ضد التهابی دارند(۸).

۴۰۰ میکروگرم / میلی لیتر منجر به حفظ ساختار پروتئین های حرارت دیده می گردد، هم چنین در این محدوده غلظت این عصاره مانع از تجزیه غشای گلبول قرمز شده و فعالیت پروتئینازی را کاهش می دهد. در مجموع می توان نتیجه گرفت که استفاده از منابع طبیعی دریابی می تواند منجر به شناسایی و کشف عوامل بالقوه ای گردد که در بهبود شرایط زندگی و درمان بیماری ها در خدمت انسان قرار گیرد.

تشکر و قدردانی

نویسندها این مقاله از همکاران محترم مرکز تحقیقات بیولوژی کاربردی تکوین جانوری که در اجرای این طرح همکاری داشتند کمال تشکر را دارند.

آنثی التهابی می باشد(۱۲). لذا به نظر می رسد در تحقیق حاضر ستاره شکننده با دارا بودن پیتیدهای ضد میکروبی و ضد التهابی باعث حفاظت از پایداری غشا گلبول های قرمز و هم چنین مانع شدن از دناتوره شدن آلبومین شده است. Hichem و Skhiri در مطالعات خود، لکتین استخراج شده از برخی ترکیبات طبیعی را دارای اثرات التیام آور توصیف کرده اند(۱۱). لذا ممکن است بخشی از خواص التیام بخشی و ضد التهابی در این پژوهش به حضور لکتین موجود در مایع سلومنی ستاره شکننده مربوط باشد(۸). در مجموع نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که عصاره تام الکلی ستاره شکننده خلیج فارس در غلظت های مشخص دارای فعالیت ضد التهابی بوده به طوری که در محدوده ۱۰۰ تا

منابع

- Adriani, W. (1998). N-methyl-D-aspartate and dopamine receptor involvement in the modulation of locomotor activity and memory processes. *Exp Brain Res*, 123(1-2); 52-9
- Andersen, P.H. (1990). Dopamine receptor subtypes: beyond the D1/D2 classification. *Trends Pharmacol Sci*, 11(6); 231-6.
- Andersen, P.H., Jansen, J.A. (1990). Dopamine receptor agonists: selectivity and dopamine D1 receptor efficacy. *Eur J Pharmacol*, 188(6); 335-47.
- Barros, D.M. (2000). Molecular signalling pathways in the cerebral cortex are required for retrieval of one-trial avoidance learning in rats. *Behav Brain Res*, 114(1-2); 183-92.
- Berendse, H.W., Groenewegen, H.J., Lohman, A.H. (1992). Compartmental distribution of ventral striatal neurons projecting to the mesencephalon in the rat. *J Neurosci*, 12(6); 2079-103.
- Brady, A.M., O'Donnell, P. (2004). Dopaminergic modulation of prefrontal cortical input to nucleus accumbens neurons in vivo. *J Neurosci*, 24(5); 1040-9.
- Cortese, B.M., Phan, K.L. (2005). The role of glutamate in anxiety and related disorders. *CNS Spectr*, 10(10); 820-30.
- Ding, D.C., Gabbott, P.L., Totterdell, S. (2001). Differences in the laminar origin of projections from the medial prefrontal cortex to the nucleus accumbens shell and core regions in the rat. *Brain Res*, 1;81-9.
- Doherty, M., Gratton, A. (2007). Differential involvement of ventral tegmental GABA(A) and GABA(B) receptors in the regulation of the nucleus accumbens dopamine response to stress. *Brain Res*, 1150; 62-8.
- Feenstra, M.G., van der Weij, W., Botterblom, M.H. (1995). Concentration-dependent dual action of locally applied N-methyl-D-aspartate on extracellular dopamine in the rat prefrontal cortex in vivo. *Neurosci Lett*, 201(2); 175-8.
- Garpenstrand, H. (2001). Human fear conditioning is related to dopaminergic and serotonergic biological markers. *Behav Neurosci*, 115(2); 358-64.
- Gingrich, J.A., Caron, M.G. (1993). Recent advances in the molecular biology of dopamine receptors. *Annu Rev Neurosci*, 16; 299-321.
- Groenewegen, H.J., Galis-de Graaf, Y., Smeets, W.J. (1999). Integration and segregation of limbic cortico-striatal loops at the thalamic level: an experimental tracing study in rats. *J Chem Neuroanat*, 16(3); 167-85.
- Harvey, B.H., Shahid, M. (2012). Metabotropic and ionotropic glutamate receptors as neurobiological targets in anxiety and stress-related disorders: focus on pharmacology and preclinical translational models. *Pharmacol Biochem Behav*, 100(4); 775-800.

- 15.**Heimer, L., Alheid, G.F. (1991). Piecing together the puzzle of basal forebrain anatomy. *Adv Exp Med Biol*, 295; 1-42.
- 16.**Hoffman, D.C., Beninger, R.J. (1985). The D1 dopamine receptor antagonist, SCH 23390 reduces locomotor activity and rearing in rats. *Pharmacol Biochem Behav*, 22(2); 341-2.
- 17.**Jafari-Sabet, M. (2006). NMDA receptor blockers prevents the facilitatory effects of post-training intra-dorsal hippocampal NMDA and physostigmine on memory retention of passive avoidance learning in rats. *Behav Brain Res*, 169(1); 120-7.
- 18.**Jardim, M.C. (2005). Role of glutamate ionotropic and benzodiazepine receptors in the ventromedial hypothalamic nucleus on anxiety. *Pharmacol Biochem Behav*, 82(1); 182-9.
- 19.**Jinks, A.L., McGregor, I.S (1997). Modulation of anxiety-related behaviours following lesions of the prelimbic or infralimbic cortex in the rat. *Brain Res*, 772(1-2); 181-90.
- 20.**Kalivas, P.W., Duffy, P., Barrow, J. (1989). Regulation of the mesocorticolimbic dopamine system by glutamic acid receptor subtypes. *J Pharmacol Exp Ther*, 251(1); 378-87.
- 21.**Kebabian, J.W., Calne, D.B. (1979). Multiple receptors for dopamine. *Nature*, 277(5692); 93-6.
- 22.**Killcross, S., Coutureau, E. (2003). Coordination of actions and habits in the medial prefrontal cortex of rats. *Cereb Cortex*, 13(4); 400-8.