

## مقاله تحقیقی

### بررسی فلوریستیک (پوشش گیاهی) و تعیین اشکال بیولوژیکی منطقه تله گون، شهرستان شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری

فریبا شریف نیا<sup>\*</sup>، فروغ سلیمی، صدیقه اربابیان

گروه زیست شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

\* مسؤول مکاتبات: دکتر فریبا شریف نیا، گروه زیست شناسی، واحد تهران شمال. ص.پ. ۱۹۵۸۵-۹۳۶ پست الکترونیکی: fa.sharifnia@gmail.com

محل انجام تحقیق: گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

تاریخ پذیرش: ۹۰/۱۰/۲۵

تاریخ دریافت: ۹۰/۸/۲۱

#### چکیده

منطقه تله گون با وسعت ۳۳۴ هکتار در شمال و شمال غربی شهرستان شهرکرد واقع شده است. این منطقه در محدوده عرض‌های جغرافیایی "۲۰°۳۰'۳۲" - "۲۰°۳۲'۲۱" طول جغرافیایی "۵۰°۵۰'۰۵" - "۵۰°۵۱'۳۰" قرار دارد. ارتفاع از سطح دریا ۲۱۵۰ متر، متوسط بارش سالانه در منطقه ۷۰۷ میلی‌متر و متوسط دمای سالانه ۱۱ درجه سانتی‌گراد است. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی گونه‌های گیاهی و معرفی فلور منطقه، تعیین شکل‌های زیستی گیاهان و پراکنش جغرافیایی آنها است. به این منظور نمونه‌های گیاهی منطقه در سال ۱۳۸۹-۱۳۸۸ مجموع آوری و با استفاده از فلورهای معتبر شناسایی، شکل‌های زیستی گونه‌ها تعیین و طیف زیستی منطقه ترسیم گردید. بر اساس اطلاعات به دست آمده از پراکنش جغرافیایی گونه‌های گیاهی و منابع موجود، جایگاه منطقه از نظر جغرافیایی گیاهی ایران مورد بررسی قرار گرفت. تعداد ۲۳۴ گونه متعلق به ۴۳ تیره و ۱۷۰ جنس شناسایی شدند که ۲۹ گونه (در حدود ۱۲٪) از این تعداد، اندمیک ایران هستند. فراوان ترین تیره‌های منطقه را از نظر تعداد گونه Asteraceae دهند. نمودار طیف زیستی منطقه نشان داد که تروفیت‌ها با ۱۱۹ گونه (۵۰٪) بیشترین فراوانی را دارند. منطقه تله گون با ۱۳۹ گونه ایرانی- تورانی (۴٪ درصد) منطقه‌ای ایرانی- تورانی محسوب می‌شود.

واژه‌های کلیدی: فلوریستیک، شکل زیستی، کوروتیپ، تله گون، ایران

#### مقدمه

توجه محققان داخلی است، بلکه بسیاری از محققان و دانشمندان خارجی نیز مطالعات و تحقیقات گسترده‌ای طی دو قرن گذشته روی آن انجام داده‌اند (۲). هنوز از اهمیت این گونه مطالعات و تحقیقات، کاسته نشده و مطالعات فلوریستیک با بهره‌گیری از روش‌های جدید، جایگاه خود را حفظ کرده است.

کشور ایران به دلیل تنوع آب و هوایی دارای فلوری بسیار غنی و متنوع است که آن را از لحاظ فلوریستیکی، بسیار مهم و کم‌نظیر ساخته است. این تنوع پوشش گیاهی، از آب و هوای متفاوت کشور و نیز از گذشته رستنی‌ها و توان بالقوه تکامل آن ناشی شده است (۱). پوشش گیاهی کشور، نه تنها مورد

متر از سطح دریا، جمعیت‌ها و گونه‌های زیادی را در خود جای داده است. این منطقه شرایط آب و هوایی تقریباً یکسانی دارد، ولی از نظر شیب و توپوگرافی، دارای تنوع است که در بررسی فلور آن، تأثیرگذار بوده است.

این منطقه از شمال به محله میرآباد غربی، از جنوب به محله کوی فرهنگیان، از غرب به دانشگاه شهرکرد و از شرق به پارک تفریحی تهلیجان محدود می‌شود.

در این پژوهش، کلیه نمونه‌های گیاهی منطقه، از اوخر اسفند ۸۸ تا مهر ۸۹ جمع‌آوری شدند و پس از انتقال به هرباریوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، با استفاده از فلورهای ایرانیکا<sup>(۲۰)</sup>، فلور ایران<sup>(۱۲)، (۱۳)</sup> و دیگر منابع موجود نظیر فلور رنگی ایران<sup>(۱۴)، (۱۵)</sup>، رده‌بندی گیاهی<sup>(۱۶)</sup>، گونه‌ای ایران<sup>(۱۷)</sup> و کوروموفیت‌های ایران<sup>(۱۸)</sup> مورد شناسایی قرار گرفتند. نمونه‌ها در هرباریوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال نگهداری می‌شوند. مناطق انتشار گونه‌های گیاهی نیز بر اساس فلورهای فوق مشخص شد. سپس کوروتیپ (پراکنش جغرافیایی) گونه‌ها با توجه به مناطق انتشار آن‌ها، بر اساس تلفیقی از تقسیم‌بندی‌های جغرافیایی رویش‌های ایران توسط Leonard Zohary<sup>(۲۱)</sup> و Raunkjaer<sup>(۲۲)</sup> تعیین شد. شکل تعیین گردید. همچنین بر پایه اطلاعات ایستگاه‌های هواشناسی منطقه، منحنی آمروترمیک (دما، بارش) منطقه رسم گردید (نمودار ۱).


تأثیر و کارایی گیاهان در حفاظت خاک و جلوگیری از فرسایش، استفاده از گیاهان مختلف در برنامه‌های ژنتیکی و اصلاح نژاد، اهمیت و ارزش دارویی برخی گیاهان، کاربرد برخی دیگر در صنعت، نقش تعدادی در تغذیه مستقیم انسان، قابلیت حشره‌کشی، تأمین علوفه و موارد بسیار دیگر، مستلزم شناخت فلور مناطق به منظور برنامه‌ریزی در راستای توسعه پایدار جوامع است. بدون شناخت نوع گونه‌های رویشی در هر منطقه، امکان برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری و استفاده بشر و اقتصادی نمودن فعالیتها وجود نخواهد داشت (۳).

در دهه اخیر پژوهش‌هایی در زمینه مطالعات فلوریستیکی مناطق مختلف کشور صورت گرفته است که از جمله می‌توان به تحقیقات عصری<sup>(۴)، (۵)</sup>، کاشی‌پزها<sup>(۶)</sup>، توکلی و مظفریان<sup>(۷)</sup>، پریشانی<sup>(۸)</sup>، ابوطالبی<sup>(۹)</sup>، ابراهیم‌پور<sup>(۱۰)</sup> و پارنج و همکاران<sup>(۱۱)</sup> اشاره کرد. در این پژوهش، تنوع گیاهی منطقه تله‌گون واقع در شهرستان شهرکرد، در راستای تکمیل مطالعات فلور ایران، مورد مطالعه قرار گرفت.

## مواد و روش‌ها

### منطقه مورد مطالعه

تله‌گون از نظر توپوگرافی، ویژگی‌های منحصر به فردی دارد. این منطقه که در عرض جغرافیایی ۳۲°۲۰'۰۰" الی ۳۳°۲۰'۰۰" و طول جغرافیایی ۵۰°۵۰'۰۰" الی ۵۱°۳۰'۰۰" قرار دارد، با مساحت ۳۴۴ هکتار و ارتفاع بین ۲۱۵۰ تا ۲۴۴۴ متر




نمودار ۱- منحنی دما بارش منطقه تله‌گون بر اساس اطلاعات ایستگاه هواشناسی شهرکرد.


(۳۰ گونه) Brassicaceae (۲۴ گونه) Fabaceae (۲۱ گونه) Lamiaceae (۱۷ گونه) Poaceae تشكیل می‌دهند (نمودار ۲). جنس‌های ۵ با Centaurea با ۱۳ گونه و Astragalus گونه، از بزرگترین جنس‌های این منطقه شناخته شدند.

#### نتایج

شناسایی فلور منطقه تله‌گون نشان می‌دهد که در این منطقه، ۲۳۴ گونه متعلق به ۴۳ تیره و ۱۷۰ جنس وجود دارد که ۱۴۲ گونه به ۳۸ تیره دولپه‌ای و ۲۸ گونه نیز به ۵ تیره تک لپه‌ای تعلق دارند. (جدول ۱). فراوان ترین تیره‌های منطقه را با اولویت بیشترین گونه‌ها به ترتیب (۴۰ گونه) Asteracea.



نمودار ۲- فراوانی تیره‌های گیاهی منطقه تله گون.



نمودار ۳- فرم زیستی گونه‌های گیاهی منطقه تله گون.

مدیترانه‌ای و ایرانی-تورانی اروپا-سیبری، بیشترین فراوانی را دارند.

#### بحث

در این پژوهش، تعداد ۲۳۴ گونه گیاهی در منطقه تله‌گون در شهرستان شهرکرد شناسایی شد (جدول ۱) که با توجه به مساحت منطقه ۳۴۴

نمودار طیف زیستی منطقه نشان داد که: تروفیت‌ها با ۵۰/۸۵ درصد بیشترین فراوانی را دارند (نمودار ۳). منطقه تله گون با داشتن درصد بالایی از گونه‌های ایرانی-تورانی (با ۱۳۹ گونه یا ۵۹/۴ درصد)، منطقه‌ای ایرانی-تورانی محسوب می‌شود و پس از آن گونه‌هایی با پراکنش جغرافیایی ایرانی-تورانی و

و خشک است، بیشتر بودن تعداد گونه‌های تروفیت نسبت به اشکال زیستی دیگر (۸۵/۵۰ درصد) در منطقه، تحت تاثیر این اقلیم است. بالا بودن تروفیت-ها، نشانه بارندگی زمستانی و تابستانهای گرم و خشک است. زیاد بودن تروفیت‌ها در یک منطقه را می‌توان به تخریب شدید منطقه، از جمله چرای مفرط دام، عملیات جاده‌سازی و جمع‌آوری گیاهان توسط اهالی نیز نسبت داد (۱۹). در منطقه مورد مطالعه ۸۵/۵ درصد گونه‌ها عناصر رویشی ایران-تورانی هستند که مطابق با نظر قربانی (۱۵) و بررسی نتایج حاصل از مطالعات انجام شده توسط پژوهشگرانی نظیر سرداری (۳)، ارتفاع بین ۲۱۶۰ تا ۲۴۴۴ می‌تواند قابلیت صفت ایرانی-تورانی را ثابت نماید. مرتفع بودن نسبی منطقه نیز نقش ارتفاع را در وجود صفت غالب ایرانی-تورانی نشان می‌دهد.

هکتار)، می‌توان گفت که منطقه مورد مطالعه، از تنوع گونه‌ای گیاهی خوبی برخوردار است. گونه‌های گیاهی منطقه اگر چه از نظر تاکسونومیکی نسبتاً متنوع هستند ولی از نظر ابعاد و اندازه، طیف محدودی را در بر می‌گیرند، به طوری که اغلب گونه‌ها تقریباً به حالت علفی و با ارتفاع ۱۰-۳۰ سانتی-متر هستند که این امر بیشتر تحت تاثیر ارتفاع منطقه است. بررسی شکل گیاهان منطقه بیان گر وجود تنوع نسبتاً خوب در اشکال زیستی، به دلیل سازگاری گیاهان منطقه با شرایط اقلیمی است. طبق نظر Archibald (۲۴)، فراوانی گیاهان همی-کرپتوفیت در یک منطقه، نشان‌دهنده اقلیم سرد و کوهستانی آن منطقه است. این نتایج با نتایج پای رنچ و همکاران (۱۱) مطابقت دارد. با توجه با این که اقلیم این منطقه نیز با استفاده از روش آمیرزه، سرد

جدول ۱- فیتوکورلوزی و فرم زیستی گونه‌های منطقه تله گون.

نام تاکسون	فرم زیستی	فیتوکورلوزی
<b>Amaranthaceae</b>		
<i>Amaranthus rethrolflexus</i> L.	Th	Cosm
<b>Apiaceae</b>		
<i>Bunium paucifolium</i> DC.	Ge	IT
<i>Bunium persicum</i> Boiss.	Ge	IT*
<i>Echinophora platyloba</i> DC.	He	IT*
<i>Glachidiotheca foeniculacea</i> Fenzl.	He	IT
<i>Johreniopsis seesloides</i> ( C.A.Mey.)M. Pimen.	He	M
<i>Scandix aucheri</i> Boiss.	Th	IT.M
<b>Asteraceae</b>		
<i>Achillea wilhelmsii</i> C.Koch	He	IT
<i>Anthemis haussknechtii</i> Bioss.	He	IT.ES
<i>Boiss. Anthemis odontostephana</i>	He	IT.ES
<i>Carthamus oxyacantha</i> M. B.	Th	IT
<i>Chardinia orientalis</i> Desf.	Th	IT.ES
<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	He	IT
<i>Centaurea behen</i> L.	Th	IT.ES
<i>Centaurea depressa</i> L.	Th	IT
<i>Centaurea gaubae</i> (Bornm.)Wagenitz	Th	IT*
<i>Centaurea ispananicea</i> Boiss.	He	IT*
<i>Centaurea virgata</i> Lam.	He	IT
<i>Cirsium arvens</i> (L.) Scop.	He	IT
<i>Cousinia bachtiarica</i> Boiss. & Hausskn.	He	IT*
<i>Cousinia calocephala</i> Jaub. & Spach	He	IT*
<i>Cousinia cylindracea</i> Boiss.	He	IT*
<i>Crepis sancta</i> (L.) Babcock.	Th	IT
<i>Echinops leiopolyceras</i> Bornm.Beihs.Bot.	He	IT
<i>Gundelia tournefortii</i> L.	He	IT

نام تاکسون	فرم زیستی	فیتوکرولوژی
<i>Helichrysum artemisioides</i> Boiss. Hausskn.	He	IT*
<i>Helichrysum oligocephalum</i> DC.	He	IT*
<i>Hiria angustifalia</i> (OC)O.Kuntze.	Th	Cosm
<i>Koelpinia linearis</i> Pall.	Th	ES,IT
<i>Lactuca serriola</i> L.	Th	ES,IT,SS,M
<i>Onopordon leptolepis</i> DC.	He	Cosm
<i>Postia bombycina</i> Boiss. & Hausskn.	Th	ES,IT
<i>Picnomon acarna</i> (L.) Cass.	Th	IT
<i>Picris longirostris</i> Schultz-Bip.	Th	IT
<i>Scariola orientalis</i> (Boiss.) Sojak	Ch	IT
<i>Scorzonera seidlitzii</i> Boiss.	Ch	IT,ES
<i>Siebera nana</i> (DC.) Bothm	He	ES,IT
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	He	ES
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	He	IT
<i>Tanacetum polycephalum</i> Schultz	Cr	IT*
<i>Thevenotia persica</i> DC.	Th	IT
<i>Tragopogon graminifolius</i> DC.	He	IT
<i>Tragopogon longirostris</i> Bisch.	He	PI
<i>Tragopogon marginatus</i> Boiss. & Buhse	He	IT,ES
<i>Xeranthemum annum</i> L.	Th	IT
Boraginaceae		
<i>Anchusa strigosa</i> Labill.	He	IT
<i>Asperugo procumbens</i> L.	Th	IT,ES,SI
<i>Lappula microcarpa</i> (Ledeb.)Gurke	Th	IT
<i>Lithospermum arvense</i> L.	Ge	Es
<i>Onosma microcarpum</i> DC.	He	IT
<i>Onosma sericeum</i> Willd.	Cr	IT
<i>Trichodesma aucheri</i> DC.	He	IT*
Brassicaceae		
<i>Alyssum linifolium</i> Steph. ex Willd.	Th	IT,M
<i>Alyssum marginatum</i> Steud ex Biosk.	Th	IT,SS
<i>Alyssum staphii</i> Vierh.	Th	IT,M
<i>Arabis nova</i> will.	He	IT
<i>Aubertia parviflora</i> Boiss.	Cr	IT,M,ES
<i>Barbarea plantaginea</i> DC.	Th	IT
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medicus	Th	Cosm
<i>Cardaria draba</i> (L.) Desv	Th	IT
<i>Clypeola aspera</i> (Grauer) Turrill	Th	IT,SS
<i>Conringia perfoliata</i> (C.A. Mey.)Busch.	Th	IT
<i>Conringia orientalis</i> (L) Andlz.	He	IT
<i>Descurainia Sophia</i> (L.) Schur	Th	IT,ES,M
<i>Eruca sativa</i> Lam.	Th	Cosm
<i>Erysimum repandum</i> L.	Th	IT,ES,M,SS
<i>Euchidium syracum</i> (L).R.Br.	He	IT
<i>Fibiga macrocarpa</i> Boiss.	He	IT
<i>Isatis raphanifolia</i> Biosk.	He	IT,SS
<i>Isatis tinctoria</i> L.	Th	IT
<i>Lepidium persicum</i> Boiss.	Th	IT
<i>Malcolmia africana</i> (L.) R. Br.	Th	IT
<i>Matthiola ovatifolia</i> Boiss.	Th	IT,M,ES
<i>Neslia apiculata</i> Fischet Mey.	Th	IT
<i>Robeschia schimper</i> (Boiss) O.E.Schulz.	Th	IT

نام تاکسون	فرم زیستی	فیتوکولوزی
<i>Sisymbrium irio</i> L.	Th	IT
<i>Sisymbrium septulatum</i> DC.	Th	IT
<i>Thlaspi perfoliatum</i> L.	Th	IT
Capparidaceae		
<i>Cleome ibricum</i> DC.	Ge	IT
Caryophyllaceae		
<i>Acanthophyllum glandulosum</i> Bunge ex Boiss.	Ch	IT
<i>Acanthophyllum microcephalum</i> Boiss.	Ch	IT
<i>Buffonia oliveriana</i> . Ser.	Th	IT,M
<i>Cerastium inflatum</i> Link ex Desf.	Th	IT
<i>Dianthus orientalis</i> Adams subsp. <i>scoparius</i>	He	IT
<i>Gypsophila bicolor</i> (Freyn&Sint.) Grossh.	Ch	IT
<i>Holosteum umbellatum</i> L.	Th	Cosm
<i>Mesostemma kotschyanum</i> (Fenzl) Vved.	Th	IT,SS
<i>Silene chlorifolia</i> Sm.	He	IT
<i>Silene conoidea</i> L.	Th	IT,M
<i>Silene spergulifolia</i> (Willd.) M.B	Th	IT
<i>Vaccaria pyramidata</i> Medicas.	Th	IT
Chenopodiaceae		
<i>Atriplex leucoclada</i> (Boiss.) Aellen	Th	IT,SS
<i>Chenopodium album</i> L.	Th	IT,ES
<i>Kochia scoparia</i> (L.) Schrad.	Th	Cosm
<i>Salsola kali</i> L.	Th	IT,ES
Convolvulaceae		
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	He	Cosm
<i>Convolvulus commotatus</i> Boiss.	He	IT,M
Crassulaceae		
<i>Rosalaria elymaitica</i> (Boiss.& Hausskn.) Berger	Th	IT*
<i>Sedum hispanicum</i> L.	He	IT
Dipsacaceae		
<i>Cephalaria dichaetophora</i> Boiss.	He	IT,ES
<i>Pterocephalus canus</i> Coulter ex DC.	Ge	IT
<i>Pterocephalus kurdicus</i> Vatke	Ge	IT
Euphorbiaceae		
<i>Chrozophora tinctoria</i> (L.) Juss.	Th	IT
Fabaceae.		
<i>Astragalus aegobromus</i> Boiss. & Hohen.	He	IT
<i>Astragalus albispinus</i> Sirj & Bornm.	He	IT
<i>Astragalus oxylattis</i> Bge.	Th	IT
<i>Astragalus andalnicus</i> Boiss. & Hausskn. ex	Th	IT*
<i>Astragalus brachydontus</i> Boiss.	He	IT*
<i>Astragalus effusus</i> Bunge	He	IT*
<i>Astragalus campylorrhynchus</i> F. & M.	Th	IT
<i>Astragalus gossypinus</i> Fisch.	He	IT
<i>Astragalus gramocalyx</i> Boiss. et Hoh.	Th	IT
<i>Astragalus pinetorum</i> Boiss.	He	IT*
<i>Astragalus podolobus</i> Boiss.	He	IT
<i>Astragalus rhodosemius</i> Boiss & Hausskn.	He	IT
<i>Astragalus sasianus</i> Emend.	He	IT,ES
<i>Lotus corniculatus</i> L.	Th	IT,M,ES
<i>Medicago sativa</i> L.	Ge	IT
<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Desr.	He	IT,ES

نام تاکسون	فرم زیستی	فیتوکرولوژی
<i>Onobrychis gaebea</i> Bornm.	He	IT*
<i>Sophora alopecuroides</i> L.	He	IT
<i>Trigonella elliptica</i> Boiss.	Th	IT*
<i>Trigonella monantha</i> C. A. Mey.	Th	IT
<i>Vicia variabilis</i> Reym & Sint.	Th	IT,ES
Geraniaceae		
<i>Biebersteinia multifida</i> DC.	Ge	IT
<i>Geranium lucidum</i> L.	Th	ES,IT,SS
<i>Geranium tuberosum</i> L.	Ge	ES,IT,M
Hypericaceae		
<i>Hypericum helianthoides</i> (Spack) Boiss.	He	IT
Lamiaceae		
<i>Eremostachys macrophylla</i> Montbr & Auch	He	IT
<i>Hymenocarater bituminosus</i> Fisch&C. A .Mey.	Ch	IT
<i>Lagochilus aucheri</i> Boiss.	Ch	IT*
<i>Lamium amplexicaule</i> L.	Th	IT,ES,SI
<i>Nepeta fissa</i> C. A. Mey.	He	IT*
<i>Nepeta glomerulosa</i> Boiss.	He	IT
<i>Nepeta kotschi</i> Boiss.	He	IT,M
<i>Nepeta persica</i> Boiss.	He	IT,ES
<i>Phlomis olivieri</i> Benth.	He	IT
<i>Phlomis persica</i> Boiss.	He	IT*
<i>Phlomis aucheri</i> Boiss.	He	IT*
<i>Salvia multicaulis</i> Vahl.	He	IT,ES
<i>Salvia reutelana</i> Boiss.	Ge	IT,M
<i>Lallemantia iberica</i> (Stev.) Fish. et C.A.Mey.	Th	IT
<i>Saturja bachtiarica</i> Bunge	Th	IT*
<i>Scutellaria pinnatifida</i> Arth. et Hamilt.	He	IT,ES
<i>Stachys pilifera</i> Benth.	He	IT*
<i>Stachys inflata</i> Benth.	He	IT
<i>Stachys lavandulifolia</i> Vahl.	Ge	IT
<i>Teucrium polium</i> L.	He	IT,M
<i>Teucrium orientale</i> L.	He	IT,M
<i>Thymus kotschyanus</i> Boiss. & Hohen	Th	IT
<i>Thymus daenensis</i> Celak.	Th	IT*
<i>Ziziphora tenuir</i> L.	Th	IT
Linaceae		
<i>Linum album</i> Ky. ex .Boiss.	Th	IT*
Malvaceae		
<i>Alcea aucheri</i> (Boiss.) Alef.	He	IT
<i>Malva neglecta</i> Wallr.	He	ES,IT,M
<i>Malva sylvestris</i> L.	Th	IT
Moraceae		
<i>Ficus carica</i> L.	Ph	IT,ES
Morinaceae		
<i>Morina persica</i> L.	Th	IT
Orobanchaceae		
<i>Orobanche camptolepis</i> Boiss. &Reut.	Th	IT
<i>Orobanche muteli</i> Schultz.	Th	IT
Papaveraceae		
<i>Glaucium corniculatum</i> (L.) Rudlph.	Th	IT
<i>Glaucium oxylobum</i> Boiss. & Bahse.	Th	IT,ES

نام تاکسون	فرم زیستی	فیتوکولوزی
<i>Hypecoum pendulum</i> L.	Th	IT
<i>L. Papaver argemone</i>	Th	IT,ES
<i>Papaver dubium</i> L.	Th	IT
<i>Papaver fugax</i> Poir	Th	IT
Plantaginaceae		
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Th	IT
Podophyllaceae		
<i>Bongardia chrysogonum</i> (L.) Boiss.	Ge	IT,M
<i>Leontice armeniaca</i> Boivin .	Ge	IT
Polygonaceae		
<i>Polygonum aridum</i> Boiss..	Th	IT
<i>Polygonum aviculaRe</i> L .	Th	IT,ES
Ranunculaceae		
<i>Adonis aestivalis</i> L.	Th	IT,ES,M
<i>Anemon biflora</i> DC.	He	IT,ES,M
<i>Certocephallus falcatus</i> (L .) Pers	Th	IT,SS
<i>Consolida orientalis</i> (Gay)Schrod	Th	IT
<i>Delphinium tuberosum</i> Auch. ex Boiss.	He	IT*
<i>Ranunculus arvensis</i> L.	Th	IT
<i>Thalictrum isopyroides</i> C.A mey.	Th	IT,ES
Resedaceae		
<i>Reseda alba</i> L.	He	IT
<i>Reseda luteoa</i> L .	He	IT,SS,M
Rhamnaceae		
<i>Rhamnus persica</i> Boiss.	Ph	IT*
Rosaceae		
<i>Cerasus pseudoprostrate</i> Bot.	Ph	IT
<i>Sanguisorba minor</i> Scop .	He	IT
Rubiaceae		
<i>Crucianella gilanica</i> Trin.	Th	IT
<i>Galium aparine</i> L	Th	IT,ES
<i>Rubia tinctorum</i> L .	Th	IT
Santalaceae		
<i>Thesium katschyanum</i> Boiss.	He	IT
<i>Thesium ratshganum</i>	He	IT,M,SS
Scrophulariaceae		
<i>Linaria michauxii</i> (Car .) Hoffm. & Link.	He	IT,ES,M
<i>Scrophularia variegate</i> M.B.	He	IT
<i>Veronica orientalis</i> Miller.	He	IT
Solanaceae		
<i>Datura stramonium</i> L.	Th	IT
Urticaceae		
<i>Parietaria alsinfolai</i> Delile	Ge	IT
<i>Parietaria juduica</i> L.	Ge	IT,ES
Valerianaceae		
<i>Valerianella sisymbrijolia</i> Vahl.	Th	IT,ES
Zygophyllaceae		
<i>Peganum harmala</i> L.	He	Cosm
Colchicaceae		
<i>Colchicum speciosum</i> Steven.	Ge	IT
<i>Colchicum wendelbi</i> K. Persson	Ge	IT*
Iridaceae		

نام تاکسون	فرم زیستی	فیتوکرولوژی
<i>Iris songarica</i> Fisch & sch. Ixoliiriaceae	Ge	IT,SS
<i>Ixiolirion tataricum</i> (Pall.)Herb. Liliaceae	Ge	IT
<i>Allium amperoprasum</i> L. <i>Allium atroviolaceum</i> Boiss.	Ge	IT.M IT
<i>Allium scabriuscum</i> Boiss & Ky.	Ge	IT
<i>Bellevalia longistyla</i> (Miscz) Grossheim.	Ge	IT.M
<i>Gagea goegooides</i> (Zuce)Vred.	Ge	IT
<i>Muscaria neglectum</i> Guss .	Ge	Cosm
<i>Tulipa biflora</i> Pall. Poaceae	Ge	IT,M
<i>Aegilops cylindrica</i> Host.	Th	IT
<i>Archenatherum kotschy</i> Boiss.	He	IT.M
<i>Avena sativa</i> L.	Th	IT
<i>Bromus danthoniae</i> trin	Th	IT
<i>Bromus tectorum</i> L.	Th	IT,SS
<i>Bromus tomentellus</i> Boiss.	Th	Cosm
<i>Colpodium violaceum</i> (Boiss.) Griseb.	Th	IT
<i>Heteranthelium piliferum</i> (Bank & Soland)	He	IT,M
<i>Hordeum glaucum</i> Steud.	Th	IT,SS.M.ES
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	He	IT.M
<i>Oryzopsis holciformis</i> (M.B.) Hack.	Th	IT
<i>Poa bulbosa</i> L.	Ge	ES,SI,SS
<i>Psathyrostachys fragilis</i> (Boiss). Nevski	He	Cosm
<i>Setaria viridis</i> ( L.)P. Beauv .	He	Cosm
<i>Stipa hahenackeriana</i> Trin & Rupr	Th	IT.M

اشکال زیستی فانروفیت (Ph)، تروفیت (Th)، همی کرپتوفیت (He)، کرپتوفیت (Cr)، ژئوفیت (Ge) کامفیت (Ch)، هیدروفیت (Hy). نواحی رویشی: ایرانی - تورانی (ES,SI)، اروپا- سندی (SS)، صحرایی - سندی (IT)، چند ناحیه‌ای (PI) مدیترانه‌ای (M) و همه جایی یا جهان وطن (Cosm).

\* گونه‌های اندریک با ستاره مشخص شده‌اند.

می‌کنند (۲۲). همچنین حضور برخی جنس‌ها که عناصر آن‌ها بیشتر در ناحیه ایران - تورانی رویش دارد، دور بودن این منطقه از سایر مناطق رویشی را نشان می‌دهد. اقلیم منطقه، سرد و کوهستانی است، درصد بالای همی کرپتوفیت‌ها، دلیل بر سازگاری بیشتر این گیاهان در منطقه است.

**تقدیر و تشکر**  
از جناب آقای دکتر مظفریان که ما را در شناسایی برخی نمونه‌ها یاری نمودند تشکر و سپاسگزاری می‌نماییم.

**نتیجه‌گیری نهایی**  
از میان گیاهان منطقه، به ترتیب، تیره-های Brassicaceae ، Asteraceae و Poaceae .Fabaceae و Lamiaceae Caryophyllaceae Asteraceae در هستند. فراوانی گیاهان تیره در منطقه، به دلیل تخریب و چرای بی‌رویه دام و غالباً شدن گونه‌های خاردار است. تجربه نشان داده است هنگامی که درصد تخریب پوشش گیاهی در ناحیه‌ای بالا رود، اعضای بعضی از تیره‌های گیاهی نظریر حضور بیشتری در فلور منطقه پیدا

## منابع مورد استفاده

- ۱۰- ابراهیم پور، ح، ۱۳۸۷. معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه رودخانه سلمان قم، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.
- ۱۱- پای رنج، ج، ابراهیمی، ع، تربیان، ف، حسن زاده، م، ۱۳۹۰. مطالعه فلوریستیکی و جغرافیایی گیاهی منطقه نیمه آبی کرسنک شهرکرد، مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک، سال سوم شماره ۷، ص ۱-۱۰.
- ۱۲- اسدی، م، ۱۳۸۰. فلور ایران، تیره اسفناج، شماره ۳۸ موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مرانع.
- ۱۳- اسدی، م، ۱۳۸۷. راهنمای طرح فلور ایران. موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مرانع.
- ۱۴- قهرمان، ا، ۱۳۵۸-۱۳۸۵. فلور رنگی ایران جلد های ۱-۵، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مرانع.
- ۱۵- مظفریان، و، ۱۳۷۳. رده‌بندی گیاهی، جلد اول مرفوولوژی تاکزونومی و جلد دوم دولپه ای‌ها، تهران: امیر کبیر.
- ۱۶- معصومی، ع، ا، ۱۳۸۴-۱۳۶۵. گونه‌های ایران جلد اول تا پنجم، وزارت جهاد سازندگی، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مرانع.
- ۱۷- قهرمان، ا، ۱۳۶۹-۱۳۷۳. کروموفیت‌های ایران، جلد های ۱-۴. انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
- ۱۸- وکیلی شهر باکی، س، م، ع، عطیری، م، اسدی، م، ۱۳۸۰. معرفی فلور شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان، منطقه میمند شهر باک (استان کرمان) مجله پژوهش و سازندگی شماره ۵۲، ص ۷۵-۸۱.
- ۱۹- قربانی، م، ۱۳۸۱. جغرافیای گیاهی، تهران- سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
- 20- Rechinger, K. H., 1963-2005. Flora Iranica, vols: 1-175. Akademischw Druk-u Verlagasanstalt, graz Austria.
- 21- Zohary, M., 1973. Geobotanical a 1, etude de la flore et de la vegetation des deserts d'Iran, etude la vegetation analyse psychologique et phytochorologique groupements vegataux, Fasc. 10, 2vols, Meise, p 454.
- ۱- حمزه، ب، ۱۳۷۳. بررسی و تشخیص جوامع گیاهی و عناصر تشکیل دهنده جنگل‌های لاكتوئی، انتشارات موسسه جنگل‌ها و مرانع.
- ۲- بوبک، ه، ۱۳۷۳. جنگل‌های طبیعی و گیاهان چوبی ایران، ترجمه شاهسواری، ع. انتشارات موسسه جنگل‌ها و مرانع.
- ۳- سرداری، م، ۱۳۷۹. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی "جمع-آوری و شناسایی گیاهان استان چهار محال و بختیاری و تشکیل هرباریوم (فازهای ۱ و ۲)"، مرکز تحقیقات استان.
- ۴- عصری، ی، ۱۳۷۴. جامعه‌شناسی گیاهی، انتشارات موسسه جنگل‌ها و مرانع.
- ۵- عصری، ی، ۱۳۸۴. اکولوژی پوشش‌های گیاهی، انتشارات پیام نور.
- ۶- کاشی‌پزها، ا، ح، ۱۳۸۱. بررسی خصوصیات اکولوژیک جوامع گیاهی باغ شاد و تهیه جوامع گیاهی آن به کمک GIS، پایان نامه کارشناسی ارشد منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس.
- ۷- پریشانی، م. ر، (۱۳۸۴). رستنی‌های منطقه ونک سمیرم (استان اصفهان)، مجله پژوهش و سازندگی، شماره ۶۸، ص ۸۴-۱۰۳.
- ۸- توکلی، ز، مظفریان، و، ۱۳۸۴. بررسی فلور آجیز سد کبار قم، فصلنامه پژوهشی و سازندگی، شماره ۱۷، ص ۵۷-۶۷.
- ۹- ابوطالبی، ع، ۱۳۸۵. جوامع گیاهی کوه آشتیان و آهو. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد.
- 22- Leonard, J., 1988. Contribution a l etude de la flore et de la vegetation des deserts d'Iran. Fasc.Jardin Botanique de Belgique Meise.
- 23- Raunkiaer, C., 1934. Life forms of plants. Oxford university press.
- 24- Archibald, O.W., 1995. Ecology of World Vegetation. Chapman & Hall, London.