

K-قاب از ضربگرها در فضاهای $C^* \text{-pro}$ -مدول هیلبرتی

مونا نارویی ایرانی^۱، اکبر نظری^{۲*}

(^۱) گروه ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران.

(^۲) گروه ریاضی، دانشکده ریاضی و کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

تاریخ ارسال مقاله: ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۹/۱۲/۰۵

چکیده

گوارتا برای مطالعه‌ی سیستم‌های اتمی که اولین بار توسط فیشتینگر و همکارانش معرفی شده بود، K -قاب‌ها روی فضاهای هیلبرت را ارائه کرد. K -قاب‌ها نوعی از قاب‌ها هستند، که کران پایین آنها فقط برای عناصر برد عملگر خطی کراندار K در فضای هیلبرت برقرار است. C^* جبری که توپولوژی آن به جای یک C^* -نرم توسط خانواده‌ای از C^* -نیم‌نرم‌های پیوسته القا شود $C^* \text{-pro}$ -جبر می‌نامند. فضاهای $C^* \text{-pro}$ -مدول هیلبرتی تعمیمی از فضاهای هیلبرت است، هرگاه ضرب داخلی مقادیر بیشتری را از اعداد مختلط، یعنی مقادیری از $C^* \text{-pro}$ -جبر اختیار کند. در این مقاله دنباله‌ای که عناصر آن عملگرهای الحاق‌پذیر از $C^* \text{-pro}$ -جبر به فضای $C^* \text{-pro}$ -مدول هیلبرتی است، را دنباله ضربگرها می‌نامیم. مفهوم سیستم‌های اتمی و K -قاب از ضربگرها در فضاهای $C^* \text{-pro}$ -مدول هیلبرتی را معرفی می‌کنیم و برای تفهیم بیشتر مثالی از K -قاب‌ها را ارائه می‌دهیم. شرطی که دنباله‌ای از ضربگرها قاب باشد، را به‌دست می‌آوریم و ارتباط سیستم‌های اتمی و K -قاب‌ها با یکدیگر و قاب از ضربگرها را بررسی می‌کنیم. اگر K عملگری کراندار با شرایطی خاص باشد هر K -قاب یک قاب از ضربگرها در فضای $C^* \text{-pro}$ -مدول هیلبرتی است. همچنین برخی خواص این مفاهیم مانند ترکیب عملگرها با K -قاب‌ها در فضای $C^* \text{-pro}$ -مدول هیلبرتی را تحقیق می‌کنیم.

واژه‌های کلیدی: $C^* \text{-pro}$ -مدول هیلبرتی، سیستم‌های اتمی، قاب از ضربگرها، K -قاب از ضربگرها.

۱. مقدمه

قاب‌ها تعمیمی از پایه‌های متعامد در فضاهای هیلبرت هستند. مفهوم قاب برای فضای هیلبرت در سال ۱۹۵۲ توسط دافین و شیفر [۱]، برای مطالعه‌ی مسائل مربوط به سری‌های فوریه‌ی ناهمساز مطرح شد. این مفهوم تا سال ۱۹۸۶ چندان مورد توجه ریاضیدانان نبود در این سال مقاله‌ی تاثیرگذاری توسط دایچی و همکارانش [۲] به چاپ رسید. مفهوم g -قاب‌ها توسط سان [۳] و مفهوم قاب‌های زیر فضایی توسط کاسازا و کاتینوک در [۴] ارائه گردیده است. در سال ۲۰۱۹ رشیدی بر روی g -قاب‌های کنترل شده و قاب‌های زیرفضایی کنترل شده در فضاهای C^* -مدول هیلبرتی مطالعاتی انجام داد و نتایج مفیدی در این زمینه مطرح کرد [۵].

در سال ۲۰۰۲ با در نظر گرفتن حاصل ضرب‌های داخلی با مقادیر در C^* -جبرها مفهوم قاب‌ها در فضای هیلبرت مدول توسط فرانک و لارسن [۶] معرفی شد. در سال‌های اخیر دهقان و همکارانش g -قاب‌ها، دوگان آنها و برخی خواص این قاب‌های خاص را در فضای C^* -مدول هیلبرتی بررسی کردند. در نهایت آنها g -قاب‌های پیوسته را پیشنهاد دادند [۷ و ۸ و ۹].

در سال ۲۰۰۳ رابرن و تامسون [۱۰] نکات بیشتری از فضاهای C^* -مدول هیلبرتی شمارا تولید شده را در نظر گرفتند که منجر به تولید مدول ضربگر شد. در نتیجه قاب‌های استاندارد از ضربگرها^۱ را در فضاهای C^* -مدول معرفی و خواص اساسی آنها را اثبات کردند. در سال ۲۰۱۹ نارویی و نظری [۱۱]، C^* -قاب‌های استاندارد از ضربگرها را در فضاهای هیلبرت مدولی روی C^* - pro -جبرها پیشنهاد دادند. و اخیراً در [۱۲] قاب‌های یافته^۲ شده از ضربگرها در فضاهای C^* -مدول هیلبرتی توسط نارویی معرفی شده‌اند.

سیستم‌های اتمی برای اولین بار توسط فیشترینگر و وردر [۱۳] بررسی شدند. در سال ۲۰۱۱ گوارتا [۱۴] تعمیمی از قاب‌ها را برای مطالعه تجزیه سیستم‌های اتمی و بحث بر روی برخی خواص آنها معرفی کرد که در آنها کران‌های پایین قاب فقط برای عناصر برد عملگرهای

کراندار برقرار بود و این مفهوم را K -قاب نامید.

در این مقاله ما K -قاب از ضربگرها در فضاهای C^* - pro -مدول هیلبرتی را معرفی و برخی خواص آنها را بررسی می‌کنیم.

۲. مقدمات و پیش‌نیازها

در این بخش تعاریف و خواصی از C^* - pro -جبرها و فضای هیلبرت مدول روی C^* - pro -جبرها را یادآوری می‌کنیم. برای مطالعه بیشتر خواننده را به منبع [۱۵] ارجاع می‌دهیم.

تعریف ۱.۱.۲. C^* - pro -جبر A یک توپولوژیکیال $*$ -جبر هاسدورف کامل مختلط است، که توپولوژی آن القا شده به وسیله C^* - pro نیم‌نرم‌های پیوسته به طوری که در آن خانواده $\{a_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ همگرا به صفر است اگر و تنها اگر $\rho(a_\lambda)$ همگرا به صفر باشد. همچنین برای هر C^* - pro نیم‌نرم ρ روی A و برای هر $a, b \in A$ داشته باشیم:

1. $\rho(ab) \leq \rho(a)\rho(b)$,
2. $\rho(aa^*) = \rho(a)^2$

نکته ۲.۲. مجموعه همه نیم‌نرم‌های پیوسته ρ روی A را با نماد $S(A)$ نشان می‌دهیم.

تعریف ۳.۲. هرگاه A یک C^* - pro - جبر و E یک A -مدول (راست) و ساختار خطی داده شده روی A و E با هم سازگار باشد، یعنی به‌ازای هر $a \in A$ ، $\lambda \in \mathbb{C}$ و $x \in E$ داشته باشیم $(xa)\lambda = (x\lambda)a$. همچنین فرض کنید نگاشت $\langle \cdot, \cdot \rangle: \mathbb{E} \times \mathbb{E} \rightarrow A$ با ویژگی زیر موجود باشد:

- (۱) به‌ازای هر $x \in \mathbb{E}$ ، $\langle x, x \rangle \geq 0$
- (۲) به‌ازای هر $x, y \in \mathbb{E}$ ، $\langle x, y \rangle^* = \langle y, x \rangle$
- (۳) $\langle x, x \rangle = 0$ اگر و تنها اگر $x = 0$.

در این صورت فضای برداری E را A -مدول هیلبرتی

گزاره ۶.۲ [۱۶] فرض کنید T عملگری از پایین یکنواخت کراندار در $b(E, F)$ باشد، سپس T بسته و یک‌به‌یک است.

گزاره ۷.۲ [۱۷] فرض کنید E فضای C*-pro-مدول هیلبرتی روی جبر A باشد و T عملگر وارون‌پذیر یکنواخت کراندار در $L(E)$ سپس برای هر $x \in E$

$$\|T^{-1}\|_{\infty}^{-2} \langle x, x \rangle_E \leq \langle Tx, Tx \rangle_E \leq \|T\|_{\infty}^2 \langle x, x \rangle_E.$$

نکته ۸.۲ عملگر الحاق‌پذیر h از A به E را یک ضربگر می‌گوییم و $L(A, E)$ یک فضای $M(A)$ -مدول هیلبرتی است که مدول ضربگر از E نامیده می‌شود و با نماد $M(E)$ نشان داده‌ایم. برای هر $x \in E$ و $h \in M(E)$ تعریف می‌کنیم

$$\langle h, x \rangle_{M(E)} = h^*(x).$$

نکته ۹.۲ مجموعه دنباله‌های همگرا از عناصر جبر A را با نماد H_A نشان می‌دهیم. فضای H_A مدول هیلبرتی است.

تعریف ۱۰.۲ [۱۸] دنباله‌ی $\{h_n\}_{n=1}^{\infty}$ در $M(E)$ را یک قاب استاندارد از ضربگرها در E می‌نامیم، هرگاه برای هر $x \in E$ سری

$$\sum_n \langle x, h_n \rangle_{M(E)} \langle h_n, x \rangle_{M(E)}$$

همگرا در A باشد و وجود داشته باشد اعداد $0 < C \leq D$ به‌طوری که به‌زای هر $x \in E$ داشته باشیم:

$$C \langle x, x \rangle_E \leq \sum_n \langle x, h_n \rangle_{M(E)} \langle h_n, x \rangle_{M(E)} \leq D \langle x, x \rangle_E.$$

اعداد C, D کران‌های قاب نامیده می‌شوند و یکتا نیستند. اگر $C = D$ ، $\{h_n\}_{n=1}^{\infty}$ را قاب کیپ و اگر $C = D = 1$ ، $\{h_n\}_{n=1}^{\infty}$ قاب نرمال نامیده می‌شود.

در حالت خاص اگر

$$\sum_n \langle x, h_n \rangle_{M(E)} \langle h_n, x \rangle_{M(E)} \leq D \langle x, x \rangle_E$$

یا (C*-pro - مدول هیلبرتی روی جبر A) می‌نامیم، اگر E نسبت به توپولوژی القا شده از خانواده نیم‌نرم‌های $\bar{\rho}_E(x) = \sqrt{\rho(\langle x, x \rangle)}$ $x \in E, \rho \in S(A)$ کامل باشد.

فرض کنید E و F دو فضای A -مدول هیلبرتی باشند. یک نگاشت $T: E \rightarrow F$ پیوسته است، اگر به‌زای هر $\rho \in S(A)$ وجود داشته باشد $C_{\rho} > 0$ به‌طوری که به‌زای هر $x \in E$

$$\bar{\rho}_F(Tx) \leq C_{\rho} \bar{\rho}_E(x).$$

به‌زای هر $x, y \in E$ نامساوی کشی-شوارتز از منبع [۱۵] یادآوری می‌شود.

$$\rho(\langle x, y \rangle)^2 \leq \rho(\langle x, x \rangle) \rho(\langle y, y \rangle).$$

عملگر T از E به F الحاق‌پذیر است اگر یک نگاشت $T^*: F \rightarrow E$ موجود باشد، به‌طوری که برای هر $x \in E$ و $y \in F$ داشته باشیم

$$\langle Tx, y \rangle = \langle x, T^*y \rangle.$$

مجموعه همه عملگرهای الحاق‌پذیر از E به F را با نماد $L(E, F)$ نشان می‌دهیم اگر $E = F$ در این صورت از نماد $L(E)$ استفاده می‌شود.

تعریف ۱۶.۲ [۱۶] عملگر T از E به F را یکنواخت کراندار (پایین) می‌نامیم هرگاه وجود داشته باشد $C < \infty$ به‌طوری که برای هر $\rho \in S(A)$ ، داشته باشیم:

$$\bar{\rho}_F(Tx) \leq C \bar{\rho}_E(x), \quad \forall x \in E, \quad (1.2)$$

$$(\bar{\rho}_F(Tx) \geq C \bar{\rho}_E(x), \quad \forall x \in E.) \quad (2.2)$$

و همچنین

$$\hat{\rho}_F(T) := \sup\{\bar{\rho}_F(T(x)) : x \in E, \bar{\rho}_E(x) \leq 1\}.$$

تعریف ۵.۲ عملگر T یک عضو کراندار در $L(E, F)$ است هرگاه $\sup\{\hat{\rho}_{L(E, F)}(T) : \rho \in S(A)\} < \infty$. مجموعه همه عناصر کراندار در $L(E, F)$ را با نماد $b(L(E, F))$ نشان می‌دهیم.

اثبات: اگر دنباله $\{h_i\}_{i \in I}$ قاب استاندارد از ضربگرها باشد، آنگاه رابطه (1.3) به‌دست می‌آید. به‌عکس عملگر $U : E \rightarrow H_A$ را به صورت $U(x) = \{\langle h_i, x \rangle_{M(E)}\}_{i \in I}$ تعریف می‌کنیم. داریم:

$$\begin{aligned} \langle U(x), U(x) \rangle_{H_A} &= \langle \{\langle h_i, x \rangle_{M(E)}\}_{i \in I}, \{\langle h_i, x \rangle_{M(E)}\}_{i \in I} \rangle \\ &= \sum_{i \in I} \langle x, h_i \rangle_{M(E)} \langle h_i, x \rangle_{M(E)}, \end{aligned}$$

و $\bar{\rho}_{H_A}(Ux) \leq B \bar{\rho}_E(x)$ در نتیجه عملگر U خوش‌تعریف است. فرض کنید $\{a_i\}_{i \in I}$ دنباله‌ای دلخواه در H_A باشد. در این صورت

$$\begin{aligned} \langle \{a_i\}_{i \in I}, U(x) \rangle_{H_A} &= \langle \{a_i\}_{i \in I}, \{\langle h_i, x \rangle_{M(E)}\}_{i \in I} \rangle_{H_A} \\ &= \sum_{i \in I} \bar{a}_i \langle h_i, x \rangle_{M(E)} = \langle U^*(\{a_i\}_{i \in I}), x \rangle_E. \end{aligned}$$

بنابراین عملگر U الحاق‌پذیر است و الحاق آن برابر است با $U^*(\{a_i\}_{i \in I}) = \sum_{i \in I} h_i a_i$. قرار می‌دهیم

$U^*U = K$ از آنجا که عملگر K مثبت و خود

الحاق است عملگر $K^{\frac{1}{2}}$ نیز مثبت و خود الحاق می‌باشد. از طرفی

$$\begin{aligned} \left\langle K^{\frac{1}{2}}x, K^{\frac{1}{2}}x \right\rangle_E &= \langle Kx, x \rangle_E \\ &= \sum_{i \in I} \langle x, h_i \rangle_{M(E)} \langle h_i, x \rangle_{M(E)}, \end{aligned}$$

و با توجه به رابطه (1.3)، $K^{\frac{1}{2}}$ یک عملگر یکنواخت از پایین کراندار است، که در گزاره ۶.۲ صدق می‌کند از $K^{\frac{1}{2}}$ عملگری وارون‌پذیر و یکنواخت کراندار است با استفاده از گزاره ۷.۲ رابطه زیر برقرار است.

به‌ازای هر $x \in E$ برقرار باشد، آنگاه $\{h_n\}_{n=1}^\infty$ یک دنباله بسط نامیده می‌شود.

فرض کنید $\{h_n\}_{n=1}^\infty$ یک دنباله بسط باشد، سپس عملگر $T : E \rightarrow H_A$ که به صورت

$$T(x) = \{\langle h_n, x \rangle_{M(E)}\}_n$$

تعریف می‌شود، کراندار است.

T را عملگر پیش‌قاب یا ترکیب می‌نامند و عملگری الحاق‌پذیر است. از ترکیب T با T^* عملگر قاب به‌صورت زیر به‌دست می‌آید:

$$S : E \rightarrow E, \quad Sx = \sum_{n \in N} h_n \langle h_n, x \rangle_{M(E)}.$$

عملگر قاب یکتا و یک عضو مثبت وارون‌پذیر در $b(L(E))$ است. همچنین T یک عضو مثبت وارون‌پذیر از $b(L(E, H_A))$ است.

در این مقاله A را یک C^* -pro-جبر یک‌دگر نسبت به خانواده‌ای از C^* نیم‌نرم‌های پیوسته $\{\rho_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ و E, F فضاهای A -مدول هیلبرتی متناهی یا شمارا تولید شده در نظر می‌گیریم. اندیس‌های متناهی یا شمارا را با I, J نشان می‌دهیم.

۳. سیستم‌های اتمی^۳

در این بخش سیستم‌های اتمی و اتم‌های موضعی^۴ را معرفی می‌کنیم و برخی خواص آنها و قاب از ضربگرها را بررسی می‌کنیم.

قضیه ۱.۳. دنباله $\{h_i\}_{i \in I}$ در $M(E)$ یک قاب استاندارد از ضربگرها است اگر و تنها اگر دو مقدار مثبت A و B موجود باشند به‌طوری که برای هر $x \in E$ داشته باشیم:

$$\begin{aligned} A(\bar{\rho}_E(x))^2 &\leq \rho\left(\sum_{i \in I} \langle x, h_i \rangle_{M(E)} \langle h_i, x \rangle_{M(E)}\right) \\ &\leq B(\bar{\rho}_E(x))^2. \end{aligned} \quad (1.3)$$

3. Atomic systems

4. Local atoms

$$\begin{aligned} &\leq \rho\left(\sum_{i \in I} \overline{c_i(x)c_i(x)}\right) \rho\left(\sum_{i \in I} \langle x, h_i \rangle_{M(E)} \langle h_i, x \rangle_{M(E)}\right) \\ &\leq C(\bar{\rho}_{E_0}(x))^2 \rho\left(\sum_{i \in I} \langle x, h_i \rangle_{M(E)} \langle h_i, x \rangle_{M(E)}\right). \end{aligned}$$

بنابراین

$$C^{-1}(\bar{\rho}_{E_0}(x))^2 \leq \rho\left(\sum_{i \in I} \langle x, h_i \rangle_{M(E)} \langle h_i, x \rangle_{M(E)}\right)$$

با در نظر گرفتن $A = C^{-1}$ اثبات کامل می‌شود.

نتیجه ۴.۳. فرض کنید E_0 یک زیر مدول بسته از E باشد. اگر $\{h_i\}_{i \in I}$ خانواده‌ی اتم‌های موضعی از ضربگرها باشد، آنگاه $\{h_i|_{E_0}\}_{i \in I}$ یک قاب استاندارد از ضربگرها برای E_0 است.

اثبات: از آنجاکه $\{h_i\}_{i \in I}$ یک دنباله بسل از ضربگرها برای E است برای هر x در E_0 داریم:

$$\rho\left(\sum_{i \in I} \langle x, h_i \rangle_{M(E_0)} \langle h_i, x \rangle_{M(E_0)}\right) \leq D(\bar{\rho}_{E_0}(x))^2,$$

با استفاده از گزاره ۳.۳ و قضیه ۱.۳ نتیجه حاصل می‌شود.

گزاره ۵.۳. فرض کنید E_0 یک زیر مدول متمم متعامد از E باشد. اگر $\{h_i\}_{i \in I}$ در $M(E)$ خانواده‌ی اتم‌های موضعی از ضربگرها باشد، آنگاه $\{\pi_{E_0} h_i\}_{i \in I}$ یک قاب استاندارد از ضربگرها برای E_0 است. که تصویر متعامد از E بروی E_0 می‌باشد.

اثبات: دنباله $\{c_i\}_{i \in I}$ در $L(E_0, \mathcal{A})$ وجود دارد به‌طوری که $x = \sum_{i \in I} h_i c_i(x)$ با استفاده از گزاره ۳.۳ به‌ازای هر $x \in E$ داریم:

$$A(\bar{\rho}_{E_0}(x))^2 \leq \rho\left(\sum_{i \in I} \langle x, h_i \rangle_{M(E)} \langle h_i, x \rangle_{M(E)}\right),$$

بنابراین

$$A \rho(\langle x, x \rangle_{E_0}) = A \rho(\langle \pi_{E_0} x, \pi_{E_0} x \rangle_{E_0})$$

$$\begin{aligned} &\left\| K^{-\frac{1}{2}} \right\|_{\infty}^{-2} \langle x, x \rangle_E \leq \left\langle K^{\frac{1}{2}} x, K^{\frac{1}{2}} x \right\rangle_E \\ &\leq \left\| K^{\frac{1}{2}} \right\|_{\infty}^2 \langle x, x \rangle_E. \end{aligned}$$

تعریف ۲.۳. فرض کنید دنباله $\{h_i\}_{i \in I}$ در $M(E)$ یک دنباله بسل از ضربگرها برای E_0 و E یک زیر مدول بسته از E باشد. دنباله $\{h_i\}_{i \in I}$ را یک خانواده اتم‌های موضعی از ضربگرها برای E_0 می‌نامیم، هرگاه یک دنباله $\{c_i\}_{i \in I}$ از عملگرهای الحاق‌پذیر $E_0 \rightarrow \mathcal{A}$ وجود داشته باشد به‌طوری که برای هر $x \in E_0$

$$\begin{aligned} &۱. وجود داشته باشد $C > 0$ به‌طوری که
$$\sum_{i \in I} \langle c_i(x), c_i(x) \rangle_{M(E_0)} \leq C \langle x, x \rangle_{E_0}$$

$$۲. x = \sum_{i \in I} h_i c_i(x)$$
 \end{aligned}$$

زوج $\{h_i, c_i\}_{i \in I}$ را به عنوان تجزیه اتمی از ضربگرها می‌نامیم.

گزاره ۳.۳. فرض کنید E_0 یک زیر مدول بسته از E باشد. اگر $\{h_i\}_{i \in I}$ خانواده‌ی اتم‌های موضعی از ضربگرها باشد، آنگاه وجود دارد $A > 0$ که به‌ازای هر $x \in E_0$

$$A(\bar{\rho}_{E_0}(x))^2 \leq \rho\left(\sum_{i \in I} \langle x, h_i \rangle_{M(E)} \langle h_i, x \rangle_{M(E)}\right).$$

اثبات: با توجه به تعریف می‌دانیم که $\{c_i(x)\}_{i \in I}$ و $\{\langle h_i, x \rangle_{M(E)}\}_{i \in I}$ دنباله‌های در $H_{\mathcal{A}}$ هستند. با استفاده از نامساوی کشی-شوارتز به‌ازای هر $x \in E_0$ داریم:

$$\begin{aligned} &(\bar{\rho}_{E_0}(x))^4 = (\rho(\langle x, x \rangle_{E_0}))^2 \\ &= (\rho(\langle \sum_{i \in I} h_i c_i(x), x \rangle))^2 \\ &= (\rho(\sum_{i \in I} c_i(x) \langle h_i, x \rangle))^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{آنجا که } Ky = \sum_{i \in I} h_i a_i, \text{ آنگاه} \\ (\bar{\rho}_E(K^*x))^2 &= (\sup\{\rho(\langle x, \sum_{i \in I} h_i a_i \rangle) : \bar{\rho}_E(y) \leq 1\})^2 \\ &= (\sup\{\rho(\sum_{i \in I} a_i^* \langle h_i, x \rangle_{M(E)}) : \bar{\rho}_E(y) \leq 1\})^2 \\ &\leq \sup_{\bar{\rho}_E(y) \leq 1} \{\rho(\sum_{i \in I} a_i^* a_i) \rho(\sum_{i \in I} \langle x, h_i \rangle_{M(E)} \langle h_i, x \rangle_{M(E)})\} \\ &\leq C \rho(\sum_{i \in I} \langle x, h_i \rangle_{M(E)} \langle h_i, x \rangle_{M(E)}). \end{aligned}$$

بنابراین

$$C^{-1}(\bar{\rho}_E(K^*x))^2 \leq \rho(\sum_{i \in I} \langle x, h_i \rangle_{M(E)} \langle h_i, x \rangle_{M(E)})$$

از طرفی $\{h_i\}_{i \in I}$ یک دنباله بسل از ضربگرها برای E است در نتیجه وجود دارد $D > 0$ به طوری که

$$\sum_{i \in I} \langle x, h_i \rangle_{M(E)} \langle h_i, x \rangle_{M(E)} \leq D \langle x, x \rangle_E$$

در این صورت داریم:

$$\begin{aligned} C^{-1}(\bar{\rho}_E(K^*x))^2 &\leq \rho(\sum_{i \in I} \langle x, h_i \rangle_{M(E)} \langle h_i, x \rangle_{M(E)}) \\ &\leq D(\bar{\rho}_E(x))^2. \end{aligned}$$

نکته ۸.۳. اگر $K = I_E$ ، آنگاه دنباله سیستم اتمی از ضربگرها برای K در E یک قاب استاندارد از ضربگرها در E است.

۴. قاب‌ها K

در این بخش K -قاب استاندارد از ضربگرها در فضای A -مدول هیلبرتی E را معرفی و روابط بین K -قاب‌ها، سیستم‌های اتمی و خانواده اتم‌های موضعی را بررسی می‌کنیم.

تعریف ۱.۴. فرض کنید E فضای A -مدول هیلبرتی متناهی یا شمارا تولید شده روی C^* - pro -جبر A و $K \in L(E)$ باشد. دنباله $\{h_i\}_{i \in I}$ در $M(E)$ را K -قاب استاندارد از ضربگرها برای E می‌نامیم، هرگاه سری

$$\leq \rho(\sum_{i \in I} \langle x, \pi_{E_0} h_i \rangle_{M(E_0)} \langle \pi_{E_0} h_i, x \rangle_{M(E_0)}).$$

از آنجا که $\{h_i\}_{i \in I}$ یک دنباله بسل از ضربگرها برای E است برای هر x در E_0 داریم:

$$\begin{aligned} & \rho(\sum_{i \in I} \langle x, \pi_{E_0} h_i \rangle_{M(E_0)} \langle \pi_{E_0} h_i, x \rangle_{M(E_0)}) \\ & \leq D \rho(\langle \pi_{E_0} x, \pi_{E_0} x \rangle_{E_0}) \\ & = D \rho(\langle x, x \rangle_{E_0}). \end{aligned}$$

سپس با استفاده از قضیه ۱.۳ اثبات کامل می‌شود.

تعریف ۶.۳.

فرض کنید E فضای A -مدول هیلبرتی متناهی یا شمارا تولید شده روی C^* - pro -جبر A و $K \in L(E)$ باشد. دنباله $\{h_i\}_{i \in I}$ در $M(E)$ سیستم اتمی از ضربگرها برای K نامیده می‌شود، هرگاه $\{h_i\}_{i \in I}$ یک دنباله بسل از ضربگرها برای E و شرایط زیر برقرار باشد:

۱. به‌ازای هر $a_x = \{a_i\}_{i \in I} \in H_A$ سری $\sum_{i \in I} h_i a_i$ همگرا باشد؛

۲. برای هر $x \in E$ وجود داشته باشد $C > 0$ و $a_x = \{a_i\}_{i \in I} \in H_A$ به طوری که $\langle a_x, a_x \rangle_{H_A} \leq C \langle x, x \rangle_E$ و به‌ازای هر $Kx = \sum_{i \in I} h_i a_i$ ، $x \in E$

قضیه ۷.۳. اگر دنباله $\{h_i\}_{i \in I}$ در $M(E)$ سیستم اتمی از ضربگرها برای K در E باشد، آنگاه دو مقدار مثبت C و D وجود دارند به طوری که به‌ازای هر $x \in E$ داشته باشیم:

$$\begin{aligned} C^{-1}(\bar{\rho}_E(K^*x))^2 &\leq \rho(\sum_{i \in I} \langle x, h_i \rangle_{M(E)} \langle h_i, x \rangle_{M(E)}) \\ &\leq D(\bar{\rho}_E(x))^2. \end{aligned}$$

اثبات: برای هر $x \in E$

$$(\bar{\rho}_E(K^*x))^2 = (\sup\{\rho(\langle x, Ky \rangle) : \bar{\rho}_E(y) \leq 1\})^2$$

$$h_j^* (\{x_i\}) h_j^* (\{x_i\}) = C \bar{x}_j C x_j.$$

سپس

$$\begin{aligned} \sum_{j \in J} \langle x, h_j \rangle_{M(H_A)} \langle h_j, x \rangle_{M(H_A)} &= \\ \sum_{j \in J} \langle \{x_i\}_{i \in N}, h_j \rangle_{M(H_A)} \langle h_j, \{x_i\}_{i \in N} \rangle_{M(H_A)} &= \\ \sum_{j \in J} C \bar{x}_j x_j C &= C \sum_{j \in J} \bar{x}_j x_j C \\ &= C^2 \langle x, x \rangle_{H_A}. \end{aligned}$$

برای هر عدد $L \in N$ و مقدار ثابت $0 < D < C$

عملگر $K: H_A \rightarrow H_A$ را به صورت زیر تعریف می کنیم

$$K(\{x_j\}_j) = \begin{cases} D^{-1}x_j & \text{if } j \leq L, \\ 0 & \text{if } j > L. \end{cases}$$

که الحاق آن برابر است با

$$K^*(\{x_j\}_j) = \begin{cases} D^{-1}x_j & \text{if } j \leq L, \\ 0 & \text{if } j > L. \end{cases}$$

برای هر $x \in H_A$ داریم:

$$\begin{aligned} \langle K^*(x), K^*(x) \rangle_{H_A} &= \langle K^*(\{x_j\}_{j=1}^\infty), K^*(\{x_j\}_{j=1}^\infty) \rangle_{H_A} \\ &= \langle \{D^{-1}x_j\}_{j=1}^L, \{D^{-1}x_j\}_{j=1}^L \rangle_{H_A} \\ &= D^{-1} \langle \{x_j\}_{j=1}^L, \{x_j\}_{j=1}^L \rangle_{H_A} D^{-1} \\ &= D^{-2} \sum_{j=1}^L x_j \bar{x}_j \\ &\leq D^{-2} \sum_{j=1}^\infty x_j \bar{x}_j \\ &= D^{-2} \sum_{j=1}^\infty \langle x, h_j \rangle_{M(H_A)} \langle h_j, x \rangle_{M(H_A)}, \end{aligned}$$

بنابراین برای هر $x \in H_A$ داریم:

$$\begin{aligned} C^2 \langle x, x \rangle_{H_A} &= \sum_{j=1}^\infty \langle x, h_j \rangle_{M(H_A)} \langle h_j, x \rangle_{M(H_A)} \\ &\geq D^2 \langle K^*(x), K^*(x) \rangle_{H_A}. \end{aligned}$$

$$A \text{ در جبر } \sum_{i \in I} \langle x, h_i \rangle_{M(E)} \langle x, h_i \rangle_{M(E)}$$

همگرا و برای هر $x \in E$ وجود داشته باشد

$0 < A \leq B < \infty$ به طوری که:

$$\begin{aligned} A \langle K^*x, K^*x \rangle_E &\leq \sum_{i \in I} \langle x, h_i \rangle_{M(E)} \langle x, h_i \rangle_{M(E)} \\ &\leq B \langle x, x \rangle_E. \end{aligned}$$

نکته ۲.۴. اگر $K = I_E$ ، آنگاه هر $K -$ قاب

استاندارد از ضربگرها در E یک قاب استاندارد از

ضربگرها در E است.

مثال ۳.۴. فضای A -مدول هیلبرتی H_A که به ازای

هر $x = \{x_i\}_{i \in N}$ و $y = \{y_i\}_{i \in N}$ در H_A

دارای خواص زیر است.

$$xy := \{x_i y_i\}_{i \in N}, \quad x^* := \{\bar{x}_i\}_{i \in N},$$

$$\langle \{x_i\}, \{y_i\} \rangle := \sum_{i \in N} x_i y_i^*,$$

و نیم نرم $\bar{\rho}_{H_A}(x) = (\rho(\langle x, x \rangle_{H_A}))^{\frac{1}{2}}$ برای

$h_j = \{h_i^j\}_{i \in N}$ و هر ثابت C دنباله $J = N$

به صورت زیر تعریف می کنیم.

$$h_i^j(a) = \begin{cases} \langle a, C \rangle & i = j \\ 0 & i \neq j. \end{cases}$$

با توجه به اینکه

$$\begin{aligned} \rho(\sum_j h_i^j(a) \overline{h_i^j(a)}) &= \rho(h_i^i(a) \overline{h_i^i(a)}) \\ &= \rho(\langle a, C \rangle \overline{\langle a, C \rangle}) = \rho(\langle a, C \rangle)^2 < \infty, \end{aligned}$$

بنابراین برای هر j عملگر h_j خوش تعریف است و

الحاق آن را با نماد $h_j^* = \{h_i^{j*}\}_{i \in N}$ نشان می دهیم

که برابر است با $h_j^* (\{x_i\}_{i \in N}) = C x_j$ در نتیجه

برای هر $h_j \in L(A, H_A)$

داریم:

$$\langle \{x_i\}, h_j \rangle_{M(H_A)} \langle h_j, \{x_i\} \rangle_{M(H_A)} =$$

$$(2.4) \quad \leq D \langle x, x \rangle_E.$$

از طرفی چون K^* یک عضو وارون‌پذیر در $b(L(E))$ است لذا داریم:

$$\|K^{*-1}\|_\infty^{-2} \langle x, x \rangle_E \leq \langle K^*x, K^*x \rangle_E \\ \leq \|K^*\|_\infty^2 \langle x, x \rangle_E.$$

بنابراین

$$\|K^*\|_\infty^{-2} C \langle K^*x, K^*x \rangle_E \leq C \langle x, x \rangle_E, (3.4)$$

حال با توجه به (2.4) و (3.4) اثبات کامل می‌شود.

نتیجه ۶.۴. هرگاه دنباله $\{h_i\}_{i \in I}$ در $M(E)$ سیستم اتمی از ضربگرها برای K در E باشد. اگر K یک عضو وارون‌پذیر در $b(L(E))$ باشد، آنگاه $\{h_i\}_{i \in I}$ یک قاب استاندارد از ضربگرها در E است.

اثبات: با توجه به قضیه‌های ۷.۳ و ۵.۴ نتیجه به‌دست می‌آید.

نتیجه ۷.۴. فرض کنید K یک عضو وارون‌پذیر در $b(L(E_0))$ باشد. اگر $\{h_i\}_{i \in I}$ خانواده‌ی اتم‌های موضعی از ضربگرها باشد، آنگاه $\{h_i|E_0\}_{i \in I}$ یک K -قاب استاندارد از ضربگرها برای E_0 است.

اثبات: با توجه به قضیه ۵.۴ و نتیجه ۴.۳ حکم برقرار است.

گزاره ۸.۴. فرض کنید دنباله $\{h_i\}_{i \in I}$ در $M(E)$ یک قاب استاندارد از ضربگرها در E باشد. اگر $T: E \rightarrow F$ عملگر هم‌طولیا و K یک عضو وارون‌پذیر در $b(L(F))$ باشد، آنگاه $\{Th_i\}_{i \in I}$ یک K -قاب استاندارد از ضربگرها در F است.

در نتیجه برای هر $L, \{h_i\}_{i \in I}$ خانواده‌ی از $-K$ قاب‌های استاندارد از ضربگرها با کران‌های C^2 و D^2 است.

نکته ۴.۴. اگر $\{h_i\}_{i \in I}$ یک قاب استاندارد از ضربگرها برای E و $K \in b(L(E))$ ، آنگاه $\{Kh_i\}_{i \in I}$ یک K -قاب استاندارد از ضربگرها برای E است.

قضیه ۵.۴. فرض کنید K یک عضو وارون‌پذیر $b(L(E))$ باشد. آنگاه جملات زیر معادلند:

۱. دنباله $\{h_i\}_{i \in I}$ در $M(E)$ یک K -قاب استاندارد از ضربگرها برای E است؛

۲. برای هر $x \in E$ وجود دارد $0 < C \leq D < \infty$ به‌طوری

$$C(\bar{\rho}_E(K^*x))^2 \leq \rho\left(\sum_{i \in I} \langle x, h_i \rangle_{M(E)} \langle h_i, x \rangle_{M(E)}\right) \\ \leq D(\bar{\rho}_E(x))^2, (1.4)$$

۳. دنباله $\{h_i\}_{i \in I}$ در $M(E)$ یک قاب استاندارد از ضربگرها برای E است.

اثبات: $1 \Leftrightarrow 2$ اثبات واضح است.

$2 \Leftrightarrow 3$ از آنجاکه K^* یک عضو وارون‌پذیر در $b(L(E))$ است لذا با توجه به [18] داریم:

$$\|K^{*-1}\|_\infty^{-2} \rho(\langle x, x \rangle_E) \leq \rho(\langle K^*x, K^*x \rangle_E).$$

بنابراین به کمک (1.4)،

$$C\|K^{*-1}\|_\infty^{-2} \rho(\langle x, x \rangle_E) \leq \rho\left(\sum_{i \in I} \langle x, h_i \rangle_{M(E)} \langle h_i, x \rangle_{M(E)}\right) \\ \leq D\rho(\langle x, x \rangle_E).$$

قضیه ۱.۳ نشان می‌دهد دنباله $\{h_i\}_{i \in I}$ در $M(E)$ یک قاب استاندارد از ضربگرها برای E است.

$1 \Leftrightarrow 3$ دو مقدار مثبت A و B وجود دارند به‌طوری که به‌ازای هر $x \in E$ ، رابطه زیر برقرار است

$$C \langle x, x \rangle_E \leq \sum_{i \in I} \langle x, h_i \rangle_{M(E)} \langle h_i, x \rangle_{M(E)}$$

اثبات: برای هر $x \in E$ و هر $y \in F$ داریم:

$$\begin{aligned} \sum_{i \in I} \langle y, Th_i \rangle_{M(F)} \langle Th_i, y \rangle_{M(F)} &= \\ \sum_{i \in I} \langle T^* y, h_i \rangle_{M(E)} \langle h_i, T^* y \rangle_{M(E)}. \end{aligned}$$

فرض کنید که C و D کران‌های قاب استاندارد از ضربگرها باشند. در این صورت

$$\begin{aligned} C \langle y, y \rangle_F &= C \langle T^* y, T^* y \rangle_E \\ &\leq \sum_{i \in I} \langle y, Th_i \rangle_{M(F)} \langle Th_i, y \rangle_{M(F)} \\ &\leq D \langle T^* y, T^* y \rangle_E \\ &= D \langle y, y \rangle_F. \end{aligned}$$

رابطه فوق نشان می‌دهد $\{h_i\}_{i \in I}$ قاب استاندارد از ضربگرها در فضای F است. حال با استفاده از قضیه ۵.۴ اثبات کامل می‌شود.

Modelirovanie, 14 (5), 31-34, (2002).

فهرست منابع

- [10] I. Raeburn and S.J. Thompson, countably generated Hilbert modules, the Kasparov stabilisation theorem, and frames with Hilbert modules, Proceedings of the American Mathematical Society, 131 (5), 1557-1564, (2003).
- [11] M. Naroei Irani and A. Nazari, Some properties of $*$ -frames in Hilbert modules over pro- C^* -algebras, 16 (1), 105-117, (2019).
- [12] M. Naroei Irani and A. Nazari, The woven frame of multipliers in Hilbert C^* -modules, Communications of the Korean Mathematical Society, accepted.
- [13] H. G. Feichtinger and T. Werther, Atomic systems for subspaces, Proceedings of the International Conference on Sampling Theory and Applications, Orlando, 163-165, (2001).
- [14] L. Gavruta, Frames for operators, Applied and Computational Harmonic Analysis, 32, 139-144, (2012).
- [15] M. Joita, Hilbert Modules Over Locally C^* -Algebras, University of Bucharest Press, (2006).
- [16] N. Haddadzadeh, G-frames in Hilbert pro- C^* -modules, International Journal of Pure and Applied Mathematics, 105, 273-314, (2015).
- [17] M. Azhini and N. Haddadzadeh, Fusion frames in Hilbert modules over pro- C^* -algebras, International Journal of Industrial Mathematics, 5, 109-118, (2013).
- [18] M. Joita, On frames in Hilbert modules over pro- C^* -algebras, Topology and its Applications, 156 (1), 83-92, (2008).
- [1] R. J. Duffin and A. C. Schaeffer, A class of nonharmonic Fourier series, Transactions of the American Mathematical Society, 72, 341-366, (1952).
- [2] I. Daubechies, A. Grossmann and Y. Meyer, Painless nonorthogonal expansions, Journal of Mathematical Physics, 27, 1271-1283, (1986).
- [3] W. Sun, G-frames and g-Riesz bases, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 322, 437-452, (2006).
- [4] P. G. Casazza and G. Kutyniok, Frames of subspaces, Wavelets, Contemporary Mathematics American Mathematical Society, 345, 87-113, (2004).
- [5] M. Rashidi-kouchi, The study on controlled g-frames and controlled fusion frames in Hilbert C^* -modules, Journal of New Researches in Mathematics, 5, 105-114, (2019).
- [6] M. Frank and D. R. Larson, Frame in Hilbert C^* -modules and C^* -algebras, Journal of Operator Theory, 48, 273-314, (2002).
- [7] A. Alijani and M.A. Dehghan, G-frames and their duals for Hilbert C^* -modules, Bulletin of the Iranian Mathematical Society, 38, 3, 567-580, (2012).
- [8] M. A. Dehghan and M. A. Hasankhani Fard, G-continuous frames and coorbit spaces, Acta Mathematica Academiae Paedagogicae Nyiregyhaziensis, 24, 373-383, (2008).
- [9] M. A. Dehghan and M. Radjabalipour, Relation between generalized frames, Matematicheskoe