

مقاله کوتاه

## بررسی فونستیک خانواده‌های Tachinidae و Tephritidae (Diptera) در شهرستان اراک، ایران

تورج ارکانی<sup>۱</sup>، محمود علی‌خانی<sup>۱</sup>، محمد مهدی ریبعه<sup>۲</sup>، عارفه اصغری کرهرودی<sup>۱</sup> و راضیه مهدوی<sup>۳</sup>

- ۱- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک ، باشگاه پژوهشگران جوان، اراک، ایران  
۲- گروه حشره‌شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران، اهواز  
۳- دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه حشره‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

### چکیده

در بررسی فون دوبالان خانواده‌های Tachinidae و Tephritidae در شهرستان اراک و حومه که طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸ در مزارع و باغات این شهرستان انجام گرفت. تعداد ۱۰ گونه و ۱۰ جنس شناسایی شدند که از بین آنها یک جنس و یک گونه از خانواده تاکینیده برای اولین بار از ایران گزارش می‌شود. در زیر جنس‌های هر خانواده به ترتیب حروف الفبا مرتب شده‌اند و رکورد جدید با علامت ستاره (\*) مشخص شده است.

#### Tephritidae

*Acanthiophilus helianthi* (Rossi, 1790); *Ensina sonchi* (Linnaeus, 1767); *Euarestella iphionae* (Efflatoun, 1924); *Hypenidium roborowskii* (Becker 1907); *Tephritis hurvitzi* Freidberg, 1980; *Tephritis lauta* (Loew, 1869); *Trupanea amoena* (Frauenfeld, 1857); *Trupanea stellata* (Fuessly, 1775)

#### Tachinidae

*Cistogaster mesnili\** (Zimin, 1966); *Besseria* sp. ; *Tachina magnicornis* (Zetterstedt, 1844)

واژه‌های کلیدی: فون، گزارش گونه جدید، شهرستان اراک، ایران

\* نویسنده رابط، پست الکترونیکی: [touraj.arkani@yahoo.com](mailto:touraj.arkani@yahoo.com)

تاریخ دریافت مقاله (۹۱/۴/۲۸) - تاریخ پذیرش مقاله (۹۱/۱۱/۲)



## مقدمه

مگس‌های خانواده تاکینیده با تقریباً ۱۰۰۰۰ گونه شناسایی شده، دومین خانواده دوبالان از نظر تعداد گونه می‌باشد. لارو گونه‌های مختلف آن پارازیتوئید داخلی بندپایان به ویژه حشرات آفات می‌باشند (O'Hara, 1985). اگرچه اکثر گونه‌های این خانواده دارای تخصص میزانی هستند ولی تعدادی از گونه‌ها طیف وسیعی از حشرات را مورد حمله قرار می‌دهند (O'Hara, 2003; Stireman *et al.*, 2006). لاروهای تاکینیده پارازیت داخلی، اجتماعی و یا انفرادی میزان خود می‌باشند و در نهایت منجر به مرگ میزانشان می‌شوند. اکثر میزانهای این مگس‌ها حشرات گیاهخوار بوده و عده‌ای در زمرة مهمترین آفات می‌باشند که توجه به این ترجیح مگس‌های تاکینیده می‌تواند تاثیر معنی‌داری بر روی ساختار جمعیتی حشرات گیاهخوار در اکوسیستم‌های طبیعی و مصنوعی داشته باشد.

خانواده تفریتیده با حدود ۴۵۰۰ گونه یکی از بزرگترین خانواده‌های گروه acalyptera دوبالان است. حدود ۷۰ جنس از مگس‌های میوه‌داری اهمیت اقتصادی در کشاورزی هستند. (Norrblom, 2004). به علت کاهش تعداد بذر بسیاری از گونه‌های گیاهی، به خصوص گونه‌های خانواده Asteraceae، برخی از آن‌ها به‌طور موثری در برنامه‌های کترل بیولوژیکی علیه علف‌های هرز مورد استفاده قرار می‌گیرند (Mohamadzade Namin *et al.*, 2010).

این تحقیق با هدف بررسی فون مگس‌های خانواده Tephritidae و Tachinidae در مزارع و باغات شهرستان اراک و حومه انجام گرفت.

## مواد و روش‌ها

به منظور بررسی فون دوبالان خانواده‌های Tephritidae و Tachinidae در شهرستان اراک و حومه، نمونه‌برداری‌های متعددی طی سال‌های ۱۳۸۷ (اردیبهشت تا مهر) تا ۱۳۸۸ (اردیبهشت تا تیر) در مجموع از ۵۳ روستا و ۱۴۲ نقطه از مزارع و باغات انجام شد. جهت نمونه‌برداری، روستاهایی انتخاب شدند که دارای حداکثر پراکندگی، بیشترین تنوع آب و هوایی و از لحاظ ارتفاع دارای اختلاف باشند. نمونه‌برداری به صورت تصادفی انجام و از تور حشره‌گیری استاندارد با پارچه توری سفید ضخیم با حلقه‌ای به محیط پیرامونی ۹۲ سانتی‌متر به عنوان یکی از پرکاربردترین وسائل جهت نمونه‌برداری از حشرات پراکنده و دارای قدرت پرواز بالا، استفاده شد (Ewuim, 2007).

نمونه‌های شناسائی شده به صورت الكلی در کلکسیون بخش حشره شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک نگهداری می‌شوند.

## نتایج

در بررسی فون دوبالان خانواده‌های Tephritidae و Tachinidae در شهرستان اراک و حومه که طی سال‌های تا ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸ در مزارع و باغات این شهرستان انجام شد، تاکنون تعداد ۸ گونه متعلق به ۷ جنس از خانواده Tephritidae و ۲ گونه ۳ جنس از خانواده Tachinidae شناسایی شدند که از بین آنها یک جنس و یک گونه برای اولین بار از ایران گزارش می‌شود. تمام نمونه‌های شناسائی شده از خانواده تاکینیده برای استان مرکزی جدید می‌باشند. مشخصات مرفولوژیک گونه جدید، داده‌های نمونه‌برداری و پراکنش هر گونه به شرح زیر است. محل‌های پراکنش هر گونه در شکل ۱ مشخص شده است.

### لیست گونه‌های خانواده Tachinidae و داده‌های نمونه‌برداری

#### *Cistogaster Latreille, 1829*

مشخصات جنس: آریستا برهنه، سینه و شکم غیر متالیک، موهای چشمی به سمت جلو خمیده، اولین موی Supralar pss شیاری بلندتر از موهای Notopleoral، ترژیت‌های شکمی بدون درز مابینشان به هم پیوند خورده‌اند، خمیدگی syntergite ۲+۱ روی Middorsal به حاشیه عقبی بند نمی‌رسد.

این جنس شباهت زیادی با جنس *Gymnosoma Meigen* دارد. با استفاده از طول شاخک می‌توان آنها را از هم متمایز کرد. طول ناخن‌های نرو ماده در جنس *Gymnosoma* نسبتاً برابر است، در حالی‌که طول ناخن‌های ماده در جنس *Cistogaster* خیلی طویل‌تر است (Townsend, 1891).

در جنس *Gymnosoma* ترژیت‌های شکم با یکدیگر ادغام شده‌اند و سلول R<sub>4+5</sub> بال دارای ساق است (Gheibi and Ostovan, 2009).

#### *Cistogaster mesnili (Zimin, 1966)*

مشخصات گونه: طول بدن ۴-۵ میلی‌متر، موهای پس چشمی کوتاه، شکم نیمه کروی، در بعضی جمعیت‌ها نیمه میانی بند سوم و تمام بند چهارم و پنجم ترژیت شکمی سیاه. میزان این گونه سن‌های خانواده Pentatomidae می‌باشد. نمونه‌های مطالعه شده: خیرآباد، ۱ خرداد ۸۷ گندم (♀)، طول و عرض جغرافیائی ۳۴° ۸' N ۵۶° ۰' E (کد ۸ در شکل ۲). پراکنش: از تاجیکستان گزارش شده است (Vanhara et al., 2004).

#### *Tachina magnicornis* (Zetterstedt, 1844)

نمونه‌های مطالعه شده: سوارآباد، ۲۳ اردیبهشت ۸۷ گندم (♂)، طول و عرض جغرافیائی ۳۳° ۵۱' N ۵۵° ۱۰' E (کد ۱۲ در شکل ۲). پراکنش: اسپانیا، پرتغال، ایتالیا، آلمان، لهستان، فرانسه، یونان، اسپانیا، و آندورا، لیتوانی، جمهوری چک، فلسطین، جنوب سیبری، پریمور، ژاپن، مغولستان و ترکیه (Vanhara et al., 2004; Gheibi et al., 2008).

#### *Besseria* sp.

نمونه‌های مطالعه شده: البرز، ۸ شهریور ۸۷، یونجه (♀)، طول و عرض جغرافیائی ۳۳° ۳۸' N ۵۵° ۱۷' E (کد ۲ در شکل ۲).

پراکنش: گونه‌های مختلف این جنس در مناطق نتارکتیک، پالارکتیک و آفروتروپیکال مشاهده می‌شوند و از منطقه پالارکتیک ۸ گونه گزارش شده است. گونه‌های این جنس عمده‌تا در کشورهای آلمان، فرانسه، سویس، ایتالیا، اسپانیا، سیبری، استرالیا و مناطق شمالی اروپا گسترده شده‌اند (Gheibi et al., 2008).

### لیست گونه‌های خانواده Tephritidae و داده‌های نمونه‌برداری

#### *Acanthiophilus helianthi* (Rossi, 1790)

نمونه‌های مطالعه شده: آزاد مرز آباد، ۱۲ خرداد ۸۷ جو، طول و عرض جغرافیائی ۳۴° ۱۱' N ۵۵° ۴۲' E (آهنگران، ۹ مرداد ۸۷ لوبیا، طول و عرض جغرافیائی ۳۴° ۲۳' N ۵۵° ۴۶' E).

پراکنش: از ترکیه و اسرائیل تا ایران، آسیای مرکزی، شرق پالارکتیک، شمال آفریقا و ناحیه اوریتال (Merz & Korneyev, 2004).

***Ensina sonchi* (Linnaeus, 1767)**

نمونه‌های مطالعه شده: نمککوه، ۷ مرداد ۸۷ علف‌های هرز(♂ ۱♀)، طول و عرض جغرافیائی N<sup>3°30' E</sup> ۵۵° ۳۰' E ۳۴° ۳' N؛ مهدی‌آباد، ۲۹ مرداد ۸۷ پیاز، طول و عرض جغرافیائی N<sup>34°2' E</sup> ۵۵°۲۰' E ۳۴° ۲' N (به ترتیب کد ۱۱ و ۹ در شکل ۲). پراکنش: بریتانیا، اسکاندیناوی، ایران، عربستان سعودی، تایوان، فیلیپین و ژاپن (Mohamadzade Namin et al., 2010).

***Euarestella iphionae* (Efflatoun, 1924)**

نمونه‌های مطالعه شده: نمککوه، ۷ مرداد ۸۷ یونجه(♂ ۱)، طول و عرض جغرافیائی N<sup>3°30' E</sup> ۵۵° ۳۰' E ۳۴° ۳' N (کد ۱۱ در شکل ۲). پراکنش: اسرائیل، عربستان، مصر و سوان (Freidberg & Kugler, 1989).

***Hypenidium roborowskii* (Becker 1907)**

نمونه‌های مطالعه شده: مهدی‌آباد، ۲۹ مرداد ۸۷ پیاز (♂ ۱)، طول و عرض جغرافیائی N<sup>34°2' E</sup> ۵۵°۲۰' E ۳۴° ۲' N (کد ۹ در شکل ۲).

پراکنش: سوریه، اردن، ایران، عراق، افغانستان، آذربایجان، آسیای میانه و غرب چین (Mohamadzade Namin et al., 2010).

***Tephritis hurvitzi* Freidberg, 1980**

نمونه‌های مطالعه شده: مجداًباد کنه، ۷ خرداد ۸۷، کلزا(♂ ۲♀)، طول و عرض جغرافیائی N<sup>33° ۵۵' E</sup> ۵۶° ۳۵' E ۳۴° ۲' N؛ مهدی‌آباد، ۲۹ مرداد ۸۷ پیاز (♀ ۱)، طول و عرض جغرافیائی N<sup>34°2' E</sup> ۵۵°۲۰' E ۳۴° ۲' N (به ترتیب کد ۱۰ و ۹ در شکل ۲).

پراکنش: یونان، ترکیه، ایران، روسیه، سیبری و اسرائیل، اکراین، ارمنستان، آذربایجان، قرقیزستان، ازبکستان، سوریه، عراق، لبنان، کویت (Freidberg & Kugler, 1989).

***Tephritis lauta* (Loew, 1869)**

نمونه‌های مطالعه شده: نمککوه، ۷ مرداد ۸۷، علف‌های هرز(♂ ۷♀ ۴♂)، طول و عرض جغرافیائی N<sup>34° ۳' E</sup> ۵۵° ۳۰' E ۳۴° ۳' N؛ مهدی‌آباد، ۲۹ مرداد ۸۷ پیاز (♂ ۲)، طول و عرض جغرافیائی N<sup>34°2' E</sup> ۵۵°۲۰' E ۳۴° ۲' N؛ مجداًباد کنه، ۷ خرداد ۸۷، کلزا، طول و عرض جغرافیائی N<sup>33° ۴۸' E</sup> ۵۵° ۳۵' E ۳۳° ۵۵' N؛ قایناroc بالا، ۷ مرداد ۸۷ یونجه، طول و عرض جغرافیائی N<sup>33° ۱۰' E</sup> ۵۶° ۳۵' E ۳۴° ۵۵' N؛ حسن‌آباد، ۷ مرداد ۸۷، جارو، طول و عرض جغرافیائی N<sup>33° ۳' E</sup> ۵۵° ۲۰' E ۳۴° ۳' N؛ حسین‌آباد بغدادی، ۶ مرداد ۸۷، یونجه، طول و عرض جغرافیائی N<sup>34° ۰' E</sup> ۵۵° ۵۴' E ۳۴° ۰' N؛ گاوخانه، ۲۵ مرداد ۸۷ سیب‌زمینی، طول و عرض جغرافیائی N<sup>34° ۸' E</sup> ۵۵° ۴۳' E ۳۴° ۸' N (به ترتیب کدهای ۱۱، ۹، ۱۰، ۵، ۶، ۷ و ۴ در شکل ۲).

پراکنش: یونان، آسیای صغیر، ایران، اسرائیل، مصر و مراکش (Freidberg and Kugler, 1989).


***Trupanea amoena* (Frauenfeld, 1857)**

نمونه‌های مطالعه شده: مهدی‌آباد، ۲۹ مرداد ۸۷ پیاز (♀ ۱)، طول و عرض جغرافیائی N<sup>34°2' E</sup> ۵۵°۲۰' E ۳۴° ۲' N (کد ۹ در شکل ۲).

پراکنش: اروپا، اسرائیل، سوریه، عراق، ایران و عربستان سعودی (Mohamadzade Namin et al., 2010).

***Trupanea stellata* (Fuessly, 1775)**

نمونه‌های مطالعه شده: حسین‌آباد بغدادی، ۶ مرداد ۸۷، یونجه، طولو عرض جغرافیائی N $0^{\circ} 34' E$  E $55^{\circ} 54' E$ ; ۲۹ مرداد ۸۷، پیاز (♀)، طول و عرض جغرافیائی N $34^{\circ} 2' E$  E $55^{\circ} 20' E$  (به ترتیب کد ۷ و ۹ در شکل ۲).  
مهدی‌آباد، ۲۹ مرداد ۸۷، پیاز (♂)، طول و عرض جغرافیائی N $34^{\circ} 2' E$  E $55^{\circ} 20' E$  (به ترتیب کد ۱۰ و ۱).  
پراکنش: بریتانیا و شرق اسکاندیناوی تا مونگولیا، جنوب تا شمال آفریقا، آسیای میانه، ایران و هند (Thompson, 1999).



شکل ۲- محل‌های نمونه‌برداری روی نقشه شهرستان اراک

Fig. 2- The sampling sites on Arak region and suburb map

**بحث**

طبق داده‌های نمونه‌برداری گونه *Tephritisomyia lauta* روی بیشترین گونه گیاهی جمع‌آوری شده است و بیشترین پراکنش را در منطقه نمونه‌برداری دارد. از نظر وسعت پراکنش گونه‌های *Hypenidium*, *Euarestella iphionae*, *robورowskii* *Trupanea amoena* تنها از یک محل در منطقه مورد مطالعه یافت شدند. گونه‌های خانواده تفریتیده در ارتفاعی بین ۱۵۰۰-۱۹۷۶ متر بالاتر از سطح دریا جمع‌آوری شدند.

**سپاسگزاری**

نگارندگان از باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک به جهت حمایت مالی در اجرای این پژوهش قدردانی می‌نمایند. همچنین از آقای دکتر Valery A. Korneyev از بخش حشره‌شناسی عمومی و کاربردی انجمن علمی و جانورشناسی کیف به‌خاطر تایید نمونه‌های تفریتیده و از آقای دکتر Pierphilippo Cerretti از ایتالیا به‌خاطر تایید نمونه‌های تاکینیده سپاسگزاری می‌گردد.

## References

- Ewuim, Sylvanus Chima.** 2007. Dipteran fauna of an Abattoir and its contiguous fallow plot in a Guinea Savanna ecosystem. *Animal Research International*, 4(1): 626 – 629.
- Freidberg, A. and J. Kugler.** 1989. Fauna Palaestina. Insecta IV. Diptera: Tephritidae. Israel Academy of Sciences & Humanities, Jerusalem, 212 p.
- Gheibi, M., Ostovan, H., Kamali, K., Zeegler, J. and Gilasian, E.** 2008. Report of *Ectophasia leucoptera* (Dip.: Tachinidae) from Iran. *Journal of Entomological Society of Iran* 27 (2), Supplement: 3–6. [In Persian.]
- Gheibi, M and Ostovan, H.** 2009. Preliminary Investigation on the Fauna of Tachinid Flies (Diptera: Tachinidae) in Fars Province, Iran. *Plant Protection Journal*, 1 (2) : 140- 166. [In Persian.]
- Merz, B. and Korneyev, V.A.** 2004. Fauna Europea: Tephritidae In Pape, T. (ed.) (2004) Fauna Europea: Diptera, Brachycera. Fauna Europea version 1.1, <http://www.faunaeur.org>.
- Mohamadzadeh Namin, S. Nozari, J. and Rasoulian, Gh.** 2010. The fruit flies(Diptera, Tephritidae)in Tehran province, with new records for Iranian fauna, *Vestink Zoologii*, 44(1): 20-31.
- Norrbom, A. 2004. **Fruit Fly (Diptera: Tephritidae) Biology.** Available in: <http://www.sel.barc.usda.gov/diptera/tephriti/tephriti.htm>
- O'Hara, J.E. 1985. Oviposition satrategies of the Tachinidae, a family of benefical parasitic flies. *Agriculture and forestry bulletin, University of Alberta*, 8, 31-34.
- O'Hara, J.E. 2003. Advances in the phylogenetics of the Tachininae (Tachinidae). *The tachinid Times, Issue 16;2*
- Stireman, J. O., O'Hara, J. O. and Wood. D. M. 2006. **Tachinidae: evolution, behavior, and ecology.** *Annu. Rev. Entomol.*, 51: 525-55
- Thompson, C. F.** 1999. Introduction in Fruit Fly Expert System and Systematic Information Database, Thompson, F. C. (ed.), pp 9-47.
- Townsend, C. H. T.** 1891. Notes on North American Tachinidae sens. lat., with descriptions of new species. *Proc. Ent. Soc. Wash*, 2: 134-146, Available in: <http://biostor.org/reference/73329.txt>
- Vanhara J., Tschorsnig H. P. and Bartak M.** 2004. New records of Tachinidae (Diptera) from the Czech Republic and Slovakia, with revised check-list. *Studia dipterologica*, 10 (2003): 679-701.

**Review Article**

## **Faunistic study of families Tephritidae and Tachinidae (Diptera) in Arak region and suburb, Iran**

**T. Arkani<sup>\*1</sup>, M. Alikhani<sup>1</sup>, M. M. Rabieh<sup>2</sup>, A. Asghari Karahroodi<sup>1</sup>, R. Mahdavi<sup>3</sup>**

1- Young Researchers Club, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran

2- Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran

3-Department of Entomology, College of Agriculture, Islamic Azad University, Arak Branch, Iran

### **Abstract**

During 2009, a faunistic study of Diptera of Arak and suburb was done. Samples were taken by using sweep net (standard size and method). According to research 10 genera and 10 species were identified. One genera and one species belonging to Tachinidae family is new record from Iran. The genera of each family alphabetically are listed below and new record marked by an asterisk.

### **Tephritidae**

*Acanthiophilus helianthi* (Rossi, 1790); *Ensina sonchi* (Linnaeus, 1767); *Euarestella iphionae* (Efflatoun, 1924); *Hypenidium roborowskii* (Becker 1907); *Tephritis hurvitzi* Freidberg, 1980; *Tephritomyia lauta* (Loew, 1869); *Trupanea amoena* (Frauenfeld, 1857); *Trupanea stellata* (Fuessly, 1775)

### **Tachinidae**

*Cistogaster\* mesnili\** (Zimin, 1966); *Besseria* sp. ; *Tachina magnicornis* (Zetterstedt, 1844)

**key words:** Fauna, Tephritidae, Tachinidae, new record, Arak region, Iran

\* Corresponding author, E-mail: [touraj.arkani@yahoo.com](mailto:touraj.arkani@yahoo.com)  
Received: 18 july. 2012 - Accepted: 21 jan. 2013

