

فراوانی جمعیت کنه *Pronematus ubiquitus* (McGregor, 1932)

روی ارقام مختلف انجیر در منطقه ساوه (Acari: Tydeidae)

*پراوانه برادران^۱، مسعود اربابی^۱

۱-بخش تحقیقات جانورشناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، تهران

چکیده

کنه (*Pronematus ubiquitus* (McGregor)) از دشمنان طبیعی کنه‌های آفت درختان انجیر در ایران و جهان است. فراوانی جمعیت این کنه روی ۱۱ رقم انجیر طی سال‌های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ در منطقه ساوه برسی شد. در اجرای این تحقیق از طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی با ۴ تکرار و هر تکرار شامل یک درخت برای نمونه‌برداری استفاده شد. شمارش جمعیت مراحل فعال کنه، با قرار دادن کادر چهار سانتی‌متر مربعی در طرفین رگبرگ اصلی در سطح زیرین برگ درختان انجیر و با استفاده از میکروسکوپ تشریحی انجام شد. نمونه‌برداری در هر دو سال از اردیبهشت تا آخر آبان‌ماه در فواصل ۱۵ روز ادامه یافت. نتایج تجزیه واریانس میانگین داده‌های جمعیت کنه روی ارقام در سطح پنچ درصد از نظر آماری تفاوت معنی‌داری نشان داد، به‌طوری‌که بیشترین تراکم جمعیت کنه روی رقم آمریکایی شماره ۲ به تعداد ۹/۸۲ و ۱۱/۳۲ کنه به ترتیب در سال اول و دوم و کمترین برای رقم سیاه ورامین به تعداد ۰/۱۹ کنه در هر دو سال به ثبت رسید. افزایش تدریجی کنه شکارگر با کاهش دما در نوبت‌های نمونه‌برداری رابطه معنی‌داری داشت و بالاترین میانگین مرکب جمعیت کنه در دو سال در اوایل آبان‌ماه در گروه a آزمون دانکن بدست آمد و کاهش دما، طول روز و کاهش تحرک طعمه، شرایط مناسب‌تری برای تعذیه و فعالیت کنه شکارگر فراهم نمود.

واژه‌های کلیدی: فراوانی جمعیت، *Pronematus ubiquitus*، ارقام انجیر، ساوه

مقدمه

خانواده Tydeidae اولین بار در سال ۱۷۶۴ میلادی توسط لینه شناسایی شد و Kramer در سال ۱۸۷۷ آن را توصیف مجدد نمود (Krantz, 1978; Sabelis, 1985; Kazmierski, 1998). تعداد گونه‌های گزارش شده از این خانواده در جهان بالغ بر ۴۱۱ گونه متعلق به ۵۱ جنس می‌باشد (Sepasgosarian, 1997; Kazmierski, 1998).

*نویسنده رابط، پست الکترونیکی: marbabi18@yahoo.com

تاریخ دریافت مقاله (۲۰/۹/۸۷) - تاریخ پذیرش مقاله (۳/۶/۸۸)



گونه‌های این خانواده دارای رژیم‌های غذایی متنوعی شامل تغذیه از شیره گیاهان، قارچ‌ها و رژیم شکارگری هستند.
(Mainul-Haque & Kawai, 2003)

فعالیت این کنه‌ها در زیستگاه‌های مختلف مانند خاک، کودهای گیاهی و حیوانی، خزه‌ها، جلبک‌ها، قارچ‌ها، علف‌های هرز، برگ، میوه و تنه درختان، باقی‌مانده محصولات کشاورزی، کاه و کلش و غیره گزارش شده است (Krantz, 1978). برخی از گونه‌ها نظیر *Orthotydeus lambi* Baker عامل کنترل بیماری‌های قارچی مانند سفیدک پودری انگور *Tydeus Uncinula necator* Schw. (English-Loeb et al., 1998) در تاکستان‌های آمریکا اعلام شده است. گونه *Tydeus caudatus* Duges به عنوان عامل کنترل توام کنه گال نمدی مو *Columerus vitis* Pgst. و بیماری سفیدک داخلی انگور *Plasmopara viticola* Berk & Curtis گزارش شده است (Duso et al., 2005). از میان کنه‌های تیدییده برخی *Tomkins et caudatus* و *Orthotydeus californicus* Banks (Abou-awad et al., 1997) و گونه *Tydeus californicus* Banks (Abou-awad et al., 1999) تاثیر شکارگری *P. ubiquitus* McGregor روی کنه آفات درختان انجیر در کشور مصر مشخص نمود علاوه بر شرایط اقلیمی که عامل بازدارنده جمعیت که آفت درختان انجیر محسوب می‌شود، جمعیت این دشمن طبیعی نیز عامل کنترلی بر جمعیت دو گونه کنه اریوفید *Aceria ficus* Cotte و *Rhyncaphytoptus ficifoliae* Keifer درختان انجیر در این کشور و دیگر مناطق جهان می‌باشد (Arbab et al., 1994; Abou-awad et al., 1999; Abou-awad et al., 2000). مطالعه درباره کنه‌های این خانواده در ایران سابقه‌ای در حدود سه دهه دارد و گونه *Pronematus sp. nr. anconai* Baker در دهه ۱۳۵۰ به ترتیب از روی کنجد و انگور از منطقه مرند و از روی گل رز از شهر آذربایجان گزارش شده است (Daneshvar, 1978). در ایران برای اولین بار *P. ubiquitus* از روی درختان انجیر در منطقه جنوب و جنوب غرب خوزستان گزارش شد (Kamali & Shishehbor, 1989). هدف این بررسی، مطالعه درباره فراوانی و تغییرات جمعیت *P. ubiquitus* روی ۱۱ رقم مختلف درختان انجیر برای اولین بار در منطقه ساوه بود و مطالعه منابع تحقیقی، بررسی مشابه دیگری را نشان نداد.

مواد و روش‌ها

فراوانی جمعیت کنه شکارگر *Pronematus ubiquitus* طی سه فصل بهار، تابستان و پاییز روی یازده رقم انجیر شامل آمریکایی اول، زرد محلی، آمریکایی دوم، زرد محلی ساوه، سیاه ورامین، زرد پیازی، انجیر وحشی، آمریکایی سوم، سیاه محلی ساوه، مریایی گرم‌سار و زرد سیلجرد طی سال‌های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ در منطقه ساوه مطالعه شد. تغییرات جمعیت کنه در فواصل منظم ۱۵ روز در قالب طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی با ۴ تکرار و هر تکرار شامل یک درخت انجام گرفت. نمونه‌های برگ برای هر رقم درختان انجیر به صورت تصادفی و با ۴ تکرار و هر تکرار شامل یک درخت انجام گرفت. تعداد ۱۶ برگ از هر رقم از قسمت‌های میانی و اطراف درختان انجیر به طور تصادفی جمع‌آوری شدند. شمارش جمعیت مراحل فعال با توجه به جثه بسیار کوچک کنه با استفاده از یک کادر ۴ سانتی متر مربعی، به عنوان واحد نمونه‌برداری، برای شمارش جمعیت مراحل فعال و با قرار دادن در طرفین قسمت میانی رگبرگ اصلی در پشت برگ و توسط استریو میکروسکوپ صورت گرفت.

برای تجزیه میانگین داده‌های آماری جمع‌آوری شده از آنالیز ساده (One way ANOVA) و مرکب توسط نرم‌افزار SAS استفاده شد و گروه‌بندی و برای مقایسه فراوانی و تغییرات میانگین جمعیت کنه آزمون چند دامنه‌ای دانکن برای هر رقم مورد استفاده قرار گرفت (Khosrowshahi & Banihashemian, 1987).

نتایج و بحث

نتایج آماری حاصل از تجزیه داده‌های میانگین جمعیت کنه شکارگر *P. ubiquitus* روی یازده رقم انجیر در منطقه ساوه اختلاف معنی‌داری را در سطح پنج درصد نشان داد (جدول ۱)، به طوری که بالاترین فراوانی جمعیت به تعداد ۹/۸۲ کنه در سطح چهار سانتی‌مترمربع روی رقم آمریکایی دوم در سال نخست ملاحظه گردید. همین رقم به همراه رقم آمریکایی اول به ترتیب با داشتن تعداد ۱۱/۳۲ و ۱۱/۵۸، بیشترین میانگین تراکم جمعیت کنه شکارگر را در گروه a آزمون دانکن در سال دوم داشتند. تجزیه آماری دوساله جمعیت کنه شکارگر روی برگ ارقام انجیر تاکید نمود ارقام غیربومی مانند آمریکایی اول و دوم در مقایسه با اغلب ارقام بومی مانند سیاه و رامین (۰/۱۹ و ۰/۳۳ کنه) و سیاه محلی ساوه (۰/۰ کنه) بیشترین جمعیت را داشتند. همچنین نتایج نشان داد که رقم زرد محلی در بین ارقام بومی از بیشترین فراوانی جمعیت در دو سال برخوردار بود. از نظر مقایسه و گروه‌بندی ارقام انجیر نسبت به تراکم جمعیت کنه شکارگر، رقم سیاه و رامین دارای کمترین جمعیت و دیگر ارقام بومی به همراه رقم آمریکایی سوم در سال اول و دوم به ترتیب در گروههای c و b آزمون دانکن قرار گرفتند. مقایسه میانگین جمعیت شکارگر بین دو سال بررسی معلوم نمود که در سال دوم شرایط مناسب‌تری برای فعالیت کنه شکارگر وجود داشته است. مشاهدات میکروسکوپی از رابطه بین تغذیه کنه شکارگر و تغییر رنگ بدن (idiosoma) نشان داد که این فاکتور به نوع کنه طعمه وابسته است، به طوری که تغذیه از کنه‌های اریوفید *Eotetranychus hirsti* و *R. ficifoliae* و *Eriophys. Ficus Cotte* و *Bemisia sp.* به قهوه‌ای تیره متمایل شد. مطالعه داده‌های آمار هواشناسی ایستگاه مریوطه در منطقه ساوه این نکته را بیان می‌نماید که افزایش دما در سال نخست که مصادف با آخرین سال دوره خشک‌سالی بود اثر منفی بیشتری بر تراکم جمعیت کنه‌های تیلیده به وجود آورد (جدول ۱).

جدول ۱- میانگین جمعیت مراحل فعال کنه *Pronematus ubiquitus* جمع‌آوری شده از ۴ سانتی‌متر مربع سطح زیرین برگ ارقام مختلف انجیر


Table 1- Mean active stages of *P. ubiquitus* collected from 4 squares centimeters under side of Leaf of different fig varieties

Var.	Siljerd yellow	Garmsar morabai	Saveh black indigenous	American No, 3	Wild fig	Onion yellow	Varamine black	Saveh yellow indigenous	American No, 2	Yellow indigenous	American No, 1
2000	0.28±0.11c	0.28±0.08c	0.31±0.11c	0.22±0.05c	0.26±0.2c	0.22±0.12c	0.19±0.12c	0.66±0.19c	9.82±1.9a	6.72±1.34b	8.69±1.47ab
2001	2.61±0.44b	2.52±0.49b	0.33±0.22b	3.39±0.64b	1.41±0.29b	2±0.29b	0.19±0.12c	0.35±0.25b	11.3±1.44a	8.29±1.29a	11.58±1.92a

* Means with same letters in the columns are not significantly different at P>0.05

اگرچه کنه‌های خسارت‌زا در دمای بالاتر نیاز بیشتری به تغذیه از برگ برای تامین آب بدن خود دارند شکل‌گیری جمعیت در مدت ششم‌ماه نمونه‌برداری که در فواصل ۱۵ روز از جمعیت کنه شکارگر صورت گرفت از اوایل اردیبهشت تا اواخر خرداد ماه با افزایش تراکم کمی مواجه بود ولی با افزایش جمعیت کنه‌های طعمه در ماه‌های تیر و مرداد جمعیت کنه شکارگر نیز روی ارقام مختلف انجیر با افزایش مواجه گردید. این افزایش جمعیت کنه شکارگر با کاهش دما در ماه‌های شهریور و مهر با حضور مستمر کنه‌های خسارت‌زا توان شد و حداقل جمعیت کنه به ترتیب در سال‌های ۱۳۷۹ و

۱۳۸۰ در ماه آبان ماه به ترتیب به تعداد ۸/۹۳ و ۷/۲۰ کنه در سطح چهار سانتی متر مربع روی برگ ارقام انجیر به ثبت رسید (شکل ۱).



نوبت‌های ۱۵ روزه نمونه‌برداری از اوایل اردیبهشت ماه لغایت آبان‌ماه
Fortnight sampling interval from

شکل ۱- میانگین جمعیت مراحل فعال *Pronematus ubiquitus* در سطح چهار سانتی متر مربع برگ ارقام مختلف انجیر در سال‌های ۱۳۷۹-۱۳۸۰ در منطقه ساوه

Fig. 1- Mean of active stages of *P. ubiquitus* collected from 4 square centimeters under side of different fig var in 2000-2001

در این رابطه بیشترین فراوانی جمعیت دشمنان طبیعی روی کنه جوانه‌خوار تمشك *Acalitus vaccinii* Keifer در ایالت میشیگان آمریکا درباره گونه‌ای از کنه‌های tydeid در فصل بهار گزارش شد (Isaacs *et al.*, 2003) و در بررسی حاضر بیشترین جمعیت *P. ubiquitus* از اوایل تا اواسط پاییز به ثبت رسید. مطالعه تاثیر دما روی تراکم و پراکنش همزمان دو گونه کنه شکارگر *P. ubiquitus* و *Phytoseius finitimus* Ribaga روی درختان انجیر در کشور مصر معلوم نمود با افزایش جمعیت و خسارت کنه تارتان انجیر روی برگ‌های آلوده، جمعیت کنه‌های شکارگر اشاره شده نیز روند افزایشی داشته است (El-Halawany *et al.*, 1990) و مشابه چنین تاثیری در بررسی حاضر ملاحظه گردید. در مطالعه دیگری اثر دما در تغییرات فصلی جمعیت کنه *Tydeus caudatus* مرتبط با آلودگی بیماری سفیدک داخلی برگ مو *Plasmopara viticola* (Berk & Curtis) در تاکستان‌های ایتالیا اشاره دارد که افزایش میانگین دما، کاهش رطوبت و میزان بارندگی شرایط مناسب‌تری را برای کنترل بیولوژیک سفیدک داخلی برگ مو به وجود آورد، در صورتی که فقدان آن نتیجه‌ای معکوس برای جمعیت این کنه شکارگر داشته است (Gyorffy-Molnar, 2003; Duso *et al.*, 2005).

مطالعه تاثیر ارقام اصلاح شده انگور بر جمعیت کنه *Orthotydeus lambi* در تاکستان‌های شمال امریکا نشان داد که رقم وحشی انگور حاوی بیشترین جمعیت کنه شکارگر می‌باشد (English-Loeb *et al.*, 1998) و در بررسی حاضر ارقام غیربومی (آمریکایی شماره اول و دوم) حاوی بیشترین جمعیت کنه شکارگر شناخته بودند (جدول ۱). وجود میزان عناصر مختلف و ترکیبات شمیایی متفاوت برگ ارقام یک گونه گیاهی می‌تواند بر طول دوره زندگی و تغییرات جمعیت کنه‌ها (مضر و مفید) اثرگذار باشد و نتایج یک تحقیق درباره وفور و تغییرات جمعیت کنه تارتان انجیر در مقایسه با سایر ارقام

این میزان گیاهی، رقم انجیر وحشی را حاوی بیشترین جمعیت تعیین نمود (Baradaran *et al.*, 2002). در بررسی دیگری درباره تاثیر روش هرس درختان انجیر روی جمعیت کنه اریوفید انجیر *E. ficus* نشان داد هرس یک تنه در مقایسه با هرس‌های دو، سه، چهار تنه و محلی حاوی بیشترین جمعیت این کنه اریوفید بود (Arbab *et al.*, 2006). تراکم پر زبرگ وجود عناصر معدنی مانند ماکرو و میکرولمنت‌ها (N, P, K, Mn, Fe, Zn) از دیگر عوامل موثر بر جمعیت کنه‌ها هستند. وجود پر زهای بلندتر روی رقم سلطانی و کمیت بیشتر عناصر ذکر شده، حساسیت و جذب بیشتر کنه‌های تارتن انجیر را در مقایسه با رقم آدسی (Adsi) انجیر در مصر بهمراه داشته است (El-Halawany *et al.*, 1990). بنابراین مقدار متفاوت و تنوع عناصر در سبزیجات برگ ارقام گونه‌های گیاهی تاثیر مستقیم بر جمعیت کنه طعمه و کنه شکارگر خواهد داشت که در بررسی حاضر نیز بدان اشاره گردیده است (نمودار ۱). کنه‌های شکارگر نسبت به تغذیه از طعمه واکنش‌های متفاوتی نشان داده‌اند. مطالعه پارامترهای زیستی کنه شکارگر *P. ubiquitus* در ارتباط با تغذیه از دو گونه کنه اریوفید انجیر *E. ficus* و *R. ficifoliae* در کشور مصر تفاوت‌هایی را نشان داد به‌طوری‌که طول دوره زندگی کنه شکارگر با تغذیه از *E. ficus* نسبت به گونه دیگر *R. ficifoliae* بیشتر می‌باشد (Abou-awad *et al.*, 2000).

نتایج بررسی تراکم جمعیت و توانایی کنه شکارگر روی ارقام مختلف انجیر روشن نمود برای استفاده بهینه از روش‌های کترل آفت کنه به خصوص مصرف کنه‌کش‌ها می‌بایست دقت نظر کافی داشت تا بر مبنای تغییرات جمعیت کنه‌های آفت و شکارگرهای آن‌ها با پایین آوردن میزان استفاده از سموم شیمیایی و کاهش اثرات سوء زیست‌محیطی آن‌ها باعث محدودیت فعالیت دشمنان طبیعی کنه آفت نگردد.

References .

- Abou-awad, B. A., El-Sawaf, B. M., Reda, A. and Abdel-Khalek, A. A. 1999.** Life history and life table of *Pronematus ubiquitus* (McGregor) as a predator of eriophyid mites in Egypt (Acari: Tydeidae). *Acarology*, 11(1): 29-32.
- Abou-awad, B. A., El-Sawaf, B. M., Reda, A. and Abdel-Khalek, A. A. 2000.** Environmental management and biological aspects of the two eriophyid fig mites, *Aceria ficus* (Cotte) and *Rhyncaphytoptus ficifoliae* Keifer in Egypt. *Anzeiger-für-Schadlingskunde*, 73 (1): 5-12.
- Arbabi, M., Baradaran, P. and Ranjbar, V. A. 2006.** Effect of different fig pruning methods on population of *Eriophyes ficus* Cotte in Saveh region. *Applied Entomology and Phytopathology*, 69(1): 184-185. [In Persian]
- Arbabi, M., Singh, R. K. and J. Singh. 1994.** Effects of injurious mites on their host plants in Varanasi. *Pestology*, 18: 4-14.
- Baradaran, P., Arbabi, M. and Ranjbar, V. 2002.** Comparative population fluctuation of fig spider mite (*Eotetranychus hirsti*) on fig varieties in Saveh region. *Journal of Entomological society of Iran*, 22(1): 49-61. [In Persian with an English summary]
- Daneshvar, H. 1978.** A study on the fauna of plant mites in Azerbaijan. *Applied Entomology and Phytopathology*, 46(1-2): 117-128. [In Persian with an English summary]
- Duso, C., Pozzebon, A., Capuzzo, C., Malagnini, V., Otto, S. and Borgo, M. 2005.** Grape downy mildew spread and mite seasonal abundance in vineyards: effects on *Tydeus caudatus* and its predators. *Biological control*, 32: 143-154.
- El-Halawany, M. E., Ibrahim, G. A., Abdel-Samad, M. A. A. and Samad, M. A. A. 1990.** Susceptibility of sultani and adsyi fig varieties to infestation with *Eriophyes ficus* Cotte and *Tetranychus arabicus* Attiah. *Agricultural Research Review*, 68 (1): 31-37.
- English-Loeb, G., Norton, A. P., Gadoury, D. M., Seem, R. C. and Wilcox, W. F. 1998.** Control of powdery mildew in wild and cultivated grapes by a tydeid mite. *Biological Control*, 14: 97-103.
- Gyorffy-Molnar, J. 2003.** Mite population studies conducted in the vineyards of county Veszprem during the past 20 years. *Venyedelem*, 39 (11): 521-530.
- Isaacs, R., Gajek, D., Gordon, S. C. and Cross, J. V. 2003.** Abundance of blueberry bud mite (*Acalitus vaccinii*) in Michigan blueberry varieties and variation in infestation among common high bush

- blueberry varieties. Proc. IOBC-WPRS Working group, International Plant Protection in Orchards, Dundee, Scotland, 18-21 Sept. 2001, Bulletin OILB-SROP, 26(2): 127-132.
- Kazmierski, A. 1998.** Tydeinae of the world. Generic relationships, new and red scribed taxa and keys to all species. A revision of the subfamilies Pretydeinae and Tydelinae (Acari: Actinedida: Tydeidae) part IV. *Acta Zoologica Cracoviensia*, 41 (2): 283-455.
- Khosrowshahi, M. and Banihashemian, E. 1987.** Statistical Method in Agricultural Research, An Introduction. Plant and Diseases Research Institute Publication, 80 pp. [In Persian]
- Kamali, K. and Shishehbor, P. 1989.** Fauna of mites (Acari) associated with fig in south-western provinces of Iran. Proceedings of 9th Plant Protection Congress Iran. Ferdowsi University. Mashhad, p. 72.
- Krantz, G. W., 1978.** A Manual of Acarology, second edition, Oregon State University Book Stores, Inc., Corvallis, 509 pp.
- Mainul-Haque, M. and Kawai, A., 2003.** Predatory efficiency of *Homeopronematus anconai* (Baker) (Acari: Tydeidae) on *Aculops lycopersici* (Tyron) (Acari: Eriophyidae). International Pest Control, 45(5): 258-259.
- Sabelis, M. W. 1985.** Sampling techniques. In: World crop pests, Spider mite, Their Biology, Natural enemies and Control, (Helle, W. H. and Sabelis, M. W.) (eds.), Elsevier Publisher, Amsterdam, 1: 337-350.
- SAS institute. 1997.** SAS/STAT User Guide for personal computers, Cary, NC: SAS institute.
- Sepasgosarian, H. 1997.** The world genera and species of the family Tydeidae (Actinedida: Acarina). Journal of Entomological Society of Iran, 7: 1-52.
- Tomkins, A. R., Lupton, T. Brown, N., Wilson, D. J. and Thomson C. 1997.** Tydeid mite control on persimmons, 50th Conference Proceedings of The New Zealand Plant Protection Society Incorporated, Horticulture Pest Management, 1: 414-419.

Population abundance of *Pronematus ubiquitus* (McGregor, 1932) (Acari: Tydeidae) on different fig varieties

P. Baradaran¹, M. Arbabi^{1*}

1- Department of Agricultural Research Zoology, Iranian Research Institute of Plant Protection, Tehran, Iran

Abstract

Pronematus ubiquitus (McGregor) is a common predatory of fig pest mites in Iran and other part of the world. Investigation on population abundance of predatory mite was carried out on 11 commercial fig varieties in Saveh, a city of Iran during two years (2000-2001) in Saveh region. Complete randomize block designed with four replications and each replicate consisted of a fig tree selected for the experiment. Fortnight sampling was followed from May up to middle of November. Abundance of *P. ubiquitus* on leaves were counted under stereo microscope by help of 4 squares centimeters plastic hallow frame which placed randomly bilateral of midrib under side of the leaf. Analysis of variance on collected mite data showed statistically significant at level of five percent. Maximum mean population density of mite recorded 9.82 and 11.32 mites for American No. 2 and minimum for Black Varamin 0.19 mites respectively during two years studies. Increasing predatory mite statistically was found significant with decreasing mean of temperature during Sept. -Nov. Maximum abundance of predatory mite was recorded during Oct.-Nov. with reduction of prey mobility, temperature and photoperiodic according to Duncan multiple range test (DMRT) method.

Key words: Population abundance, *Pronematus ubiquitus*, Fig varieties, Saveh

