

اولین گزارش دو گونه شب پره از خانواده (Lep., Pyralidae) از استان فارس

فهیمه کوهنورد^{۱*}، هلن عالی پناه^۲، شاهرخ پاشایی راد^۳، اردشیر کهن سال^۴

- ۱- مریبی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
۲- استادیار، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، بخش تحقیقات رده بندی حشرات، تهران
۳- دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زیستی، تهران
۴- مریبی، دانشگاه پیام نور، بندرعباس

چکیده

به منظور شناسایی فون شب پره‌های بالاخانواده Pyraloidea در مزارع و باغات شهرستان‌های فسا و جهرم از استان فارس بررسی‌هایی طی سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ انجام شد. نمونه‌ها با استفاده از تله نوری جمع‌آوری گردیدند. در این تحقیق تعداد تقریبی ۲۹۶ نمونه (۱۶۳ نر، ۱۳۳ ماده) مورد بررسی قرار گرفت و در مجموع ۵۳ گونه از ۴۱ جنس، ۱۰ زیرخانواده و ۲ خانواده جمع‌آوری و شناسایی شدند که از این میان ۴ گونه آن (*Lamoria anella* (Denis & Schiffermüller, 1775) و *Iraniodes bilinealis* (Amsel, 1961) و *Arenipses sabella* (Hampson, 1901) و *Dattinia iranalis* (Amsel, 1949) خانواده Pyralidae است، که از بین این چهار گونه، دو گونه *Arenipses sabella* و *Iraniodes bilinealis* برای اولین بار از استان فارس گزارش می‌شوند.

واژه‌های کلیدی: *Iraniodes bilinealis*, *Arenipses sabella*, Pyralidae, فارس، فسا، جهرم

مقدمه

راسته بال‌پولکداران شامل ۴۷ بالاخانواده، ۱۲۶ خانواده و ۲۵۰ زیرخانواده است (Kristensen, 1998). بالاخانواده Pyraloidea یکی از بزرگ‌ترین بالاخانواده‌های این راسته است که دو خانواده Pyralidae و Crambidae با حدود ۱۷۰۰۰ گونه شناخته شده در جهان را در بر می‌گیرد (Heppner, 1991). از این میان حدود ۱۱۰۰۰ گونه به خانواده Crambidae و ۶۰۰۰ گونه به خانواده Pyralidae تعلق دارند (Munroe & Solis, 1998). برخی از اعضای این بالاخانواده به‌ویژه در ایران از مهم‌ترین آفات کشاورزی محسوب می‌شوند که از این میان بیشتر آن‌ها در خانواده Pyralidae جای می‌گیرند.

*نویسنده رابط، پست الکترونیکی: Fahimehkoohnavard@gmail.com

تاریخ دریافت مقاله (۱۱/۶/۸۹) - تاریخ پذیرش مقاله (۱۱/۶/۸۹)



بارزترین مشخصه اعضای خانواده Pyralidae با ۵ زیرخانواده وجود یک جفت اندام شنوایی در اولین استرنوم شکمی است. اندام شنوایی دارای محفظه‌ای است که تقریباً به طور کامل بسته است. فاقد پراسینکتوریوم^۱ (قسمتی از اندام شنوایی است که وجه تمایز دو خانواده پیرالیده و کرامبیده است) می‌باشد. در بال جلو رگبال R5 دارای ساقه مشترک با رگبال R3+R4 یا در حالت اتصال به آن است. هشتمنی مفصل شکمی لارو تقریباً همیشه دارای یک حلقه اسکلریتی در اطراف قاعده موی SD1 است. اونکوس^۲ در اندام تناسلی نر دارای یک جفت زایده یا بازو است که از قاعده آن منشا می‌گیرند (Munroe & Solis, 1998).

از میان ۱۷۰۰۰ گونه شناخته شده از این بالاخانواده تاکنون حدود ۹۰۰ گونه از ایران گزارش یا لیست شده است. (Amsel, Mirzayans, 1967; Mirzayans & Kalaki, 1969; Moddares-Aval, 1949, 1950, 1951, 1959, 1961; Abiverdi, 2001) ۱۹۹۷; Abaei, 1983; 1967; Alipanah, 2003; Rezaei & Dargahi, 2004). این بالاخانواده و فراوانی آنها در ایستگاه‌های مختلف شهرستان‌های فسا و جهرم از استان فارس، با توجه به پوشش‌های گیاهی متفاوت داشته و امید است نتایج این تحقیق به تواند با در اختیار قرار دادن اطلاعات کافی در مورد تنوع اعضای این بالاخانواده در دو منطقه فوق زمینه‌ساز انجام مطالعات تکمیلی در جهت کنترل بیولوژیک آفات مهم این بالاخانواده در منطقه باشد.

مواد و روش‌ها

۱- مناطق نمونه‌برداری

شهرستان فسا با طول جغرافیایی ۵۳ درجه و ۳۹ دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی ۲۸ درجه و ۵۶ دقیقه شمالی و ارتفاع ۱۳۷۰ متری از سطح دریا و شهرستان جهرم در ۵۳ درجه و ۳۳ دقیقه طول جغرافیایی و ۲۸ درجه و ۳۰ دقیقه عرض جغرافیایی و ارتفاع ۱۰۵۰ متری از سطح دریا در جنوب شرقی استان فارس واقع شده‌اند.

۲- جمع‌آوری و آماده‌سازی نمونه‌ها

یکی از روش‌های رایج جمع‌آوری بالپولکداران شبپرواز استفاده از تله نوری است. در این تحقیق از یک لامپ گازی در مقابل پرده‌ای سفید^۳ برای جمع‌آوری شبپره‌ها استفاده شده است (شکل ۱). نمونه‌های جمع‌آوری شده، به آزمایشگاه منتقل شدند. نمونه‌ها در آزمایشگاه پس از اتاله و نصب برچسب‌های لازم به کمک منابع موجود، مکاتبه با متخصصین مربوطه و مقایسه با نمونه‌های شناسایی شده در موزه حشره‌شناسی موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و موزه آمستردام هلند بررسی و تعیین نام شدند.

1- Praecinctorum

2- Uncus

3- white sheet



شکل ۱- تله نوری (پرده سفید نور) برای جمع آوری شب پره‌ها

Fig. 1- The light trap for collecting of moths

۳- روش آماده‌سازی بال نمونه‌ها جهت مطالعه

در بسیاری از کلیدهای شناسایی بال پولکداران برای شناسایی آن‌ها در سطح خانواده و جنس، نوع رگبندی بال مورد توجه قرار می‌گیرد بدین منظور لازم است اسلايد بال نمونه آماده شود. ابتدا با استفاده از یک پنس ظریف بال‌ها از بدن پروانه جدا و سپس به صورت متوازی و به مدت چند ثانیه در ظروف محتوی آب ژاول و سپس اسید کلریدریک رقیق (۱۰ درصد) قرارداده شد. این کار تا زمان پاک شدن فلس‌ها و شفاف شدن بال ادامه داشت. برای تهیه اسلايد دائمی بال، مراحل آب‌گیری در درجات صعودی الكل انجام شد و در انتهای استفاده از چسب کانادا بال‌زام بال نمونه روی لام، تثیت گردید (Holloway *et al.*, 1987).


یکی از راههای شناسایی گونه‌های بال پولکداران، استفاده از ویژگی ژنتیالیای آن‌ها می‌باشد. برای این منظور با جدا کردن شکم از سینه آن را به مدت ۵ تا ۱۵ دقیقه (بسته به اندازه نمونه) در داخل محلول پتاں ۱۰ درصد جوشانده یا به مدت ۲۶ ساعت در پتاں سرد قرار داده شد (Holloway *et al.*, 1987). پس از شستشوی نمونه با آب مقطر اندام تناسلی به آهستگی بیرون آورده شد و زواید و غشاهاي اضافي از آن جدا گردید. برای آب‌گيری به ترتيب نمونه در الكل‌هاي با درجه ۵۰، ۷۵ و ۹۶ هريک به مدت تقربيا ۱۰ دقيقه قرار داده شد. در مرحله آخر ژنتیالیا به مدت ۴ تا ۵ دقيقه در محلول گزيلول گذاشته شد تا شفاف شود (Calmbach, 1921). در مورد ژنتیالیای ماده، با رنگ E Chlorazol Black رنگ‌آمیزی شد (Dugdale, 1974). سپس چند قطره کانادا بال‌زام روی لام قرار داده شده و نمونه مستقیماً از گزيلول روی آن منتقل و مرتب گردید. در مورد ژنتیالیای نر سعی شد که والوها به حالت باز شده بر روی لام قرار گيرند و در اين حالت ادياگوس در زير آن قرار خواهد گرفت. اسلايدهایی که به اين صورت تهیه شدند، پس از برچسب زدن و نوشتن کد و مشخصات نمونه روی آن به مدت چند هفته در انکوباتور در دمای ۳۵ تا ۴۰ درجه سلسیوس نگهداری شدند (Nazari, 2003).

نتایج و بحث

در تحقیق حاضر در مجموع دو زیرخانواده Pyralinae و Galleriinae جمع آوری شده که از زیرخانواده Galleriinae دو گونه از جنس‌های *Lamoria* و *Arenipses* جمع آوری و شناسایی شد.

جنس *Lamoria* (Walker, 1863)

در گونه‌های متعلق به این جنس در بال جلو رگبال R3 با R5 و نیز گاهی رگبال M2 با M3 واجد ساقه مشترک، در بال عقب معمولاً رگبال‌های M2 و M3 و گاهی اوقات رگبال‌های Sc و R واجد ساقه مشترک هستند، رگبال‌های عرضی ضعیف و یا وجود ندارند (شکل ۲) (Medvedev, 1997). این جنس حدود ۳۲ گونه و زیرگونه را شامل می‌شود (ZipcodeZoo, 2008). در این تحقیق از این جنس یک گونه جمع‌آوری و شناسایی شد.

شکل ۲- رگبندی بال در گونه *Lamoria anella* (R:Radial, M:Medial, Sc:Subcosta and Cu:Cubita)Fig. 2- wing venation in *Lamoria anella* (R:Radial, M:Medial, Sc:Subcosta and Cu:Cubita)گونه (Fig. 8-a) *Lamoria anella* (Denis & Schiffermüller, 1775) (شکل ۸-الف)


نمونه‌های مورد مطالعه: ۲۰ نر، ۱۰ ماده، فسا: باغ مرکبات، ۱۳۸۶/۷/۱۶؛ مزرعه گندم زاهدشهر، ۱۳۸۵/۲/۲۳؛ مزرعه ذرت زاهدشهر، ۱۳۸۵/۸/۱۰؛ باغ مرکبات یاسریه، ۱۳۸۶/۴/۲۴، ۱۳۸۵/۵/۲۰؛ باغ زیتون میانده، ۱۳۸۶/۵/۲۴؛ باغ پسته قاسم‌آباد ۱۳۸۵/۵/۱۰؛ باغ مرکبات ششده ۱۳۸۵/۵/۱۰؛ جهرم: باغ مرکبات (باغ نمونه)، ۱۳۸۵/۲/۲۴، خفر، روستای تادوان، ۱۳۸۵/۷/۱۱.

مشخصات: گستره بال در نمونه‌های جمع‌آوری شده ۲۵ تا ۳۵ میلی‌متر اما طبق توصیف (Medvedev, 1997) ۴۱-۴۱ میلی‌متر می‌باشد؛ در اندام تناسلی نر اونکوس کلاهکی شکل و دارای یک ردیف مو بوده و گناتوس وجود ندارد (Medvedev, 1997؛ وینکولوم در مقایسه با توصیف نمونه تیپ (Denis & Shiffermüller, 1775) کشیده‌تر بوده و در بعضی از نمونه‌ها عرض ادیاگوس در قسمت میانی بیشتر است که ممکن است نوعی تغییر درون گونه‌ای باشد. ادیاگوس در بعضی از گونه‌ها همراه با یک خار کیتینی کوچک است (تصویر ۹-ت). در اندام تناسلی ماده آپوفیزها بسیار بلند و کشیده، آپوفیز خلفی دو برابر آپوفیز قدامی، مجرای بورسا باریک و کشیده و کیسه بورسا گلابی شکل و بدون سیگنوم است (تصویر ۹-الف). (Hanneman, 1964) در نمونه‌های مورد بررسی از این لحاظ تفاوت قابل ملاحظه‌ای دیده نشد.

انتشار: جنوب جمهوری‌های شوروی سابق، آسیای مرکزی، جنوب اروپا، شمال آفریقا، بغداد (Medvedev, 1997) و در ایران از تهران، کرج، همدان، بوشهر، کازرون (سینه سفید و پیروز) (Amsel, 1961) و بلوچستان (ایرانشهر) (Amsel, 1959) گزارش شده است.

جنس Arenipses (Hampson, 1901)

در این جنس، در بال جلو رگبال R3 دارای ساقه مشترک با رگبال‌های R4+5 می‌باشد (شکل ۳) (ZipcodeZoo, 2008). این جنس فقط دارای یک گونه است (1901).



شکل ۳- رگبندی بال در جنس *Arenipses*

Fig. 3- wing venation in *Arenipses sabella* (R:Radial, M:Medial, Sc:Subcosta and Cu:Cubital)

گونه *Arenipses sabella* (Hampson, 1901) (تصویر ۸-ب)

نمونه‌های مورد مطالعه: ۲ ماده، جهرم: خفر، تادوان ۱۳۸۵/۷/۱۰

مشخصات ویژه: گستره بال ۳۷ میلی‌متر، بال‌های جلو قهوه‌ای شفاف، سینه هم‌رنگ بال جلویی و شکم سفید است (Hampson & Ragonot, 1901). در اندام تناسلی ماده آپوفیزها کشیده و باریک، آپوفیز قدامی تقریباً دو برابر آپوفیز خلفی، مجرای بورسا کشیده، کيسه بورسا گلابی‌شکل و دارای یک سیگنوم است (Amsel, 1959) (تصویر ۲، ب).


انتشار: این گونه به عنوان آفت کشاورزی تاکتون از الجزایر، هند، اسپانیا، مصر، امارات متحده عربی، کویت، عراق (Abiverdi, 2001) و در ایران از ایرانشهر، سراوان (Amsel, 1959)، بوشهر، تحت ملک (بلوچستان) (Amsel, 1961) و خلیج فارس (Whalley, 1964) گزارش شده است. این گونه برای اولین‌بار از استان فارس گزارش می‌شود.

زیرخانواده Pyralinae (Latreille, 1809)

از این زیرخانواده ۲ گونه از دو جنس *Dattinia* و *Iraniodes* جمع‌آوری و شناسایی شد.

۱-۲- جنس *Dattinia* (Ragonot, 1887)

در این جنس خطوط مایل موجود در سطح بال جلو دندانه‌دار هستند. در بال جلو رگبال‌های R4 و R5 با رگبال R3 دارای ساقه مشترک و کوتاه، در بال عقب رگبال‌های M2، M3 و Cu1 خیلی بهم نزدیکند (شکل ۴) (Amsel, 1949). از این جنس حدود ۱۰۰ گونه و زیرگونه شناسایی شده است (ZipcodeZoo, 2008). در این تحقیق یک گونه جمع‌آوری و شناسایی شد.



شکل ۴- رگبندی بال در جنس *Dattinia*

Fig. 4- wing venation in *Dattinia iranalis* (R:Radial, M:Medial, Sc:Subcosta and Cu:Cubital)

گونه (تصویر ۸-ت: Fig. 8-d) *Dattinia iranalis* (Amsel, 1949)


نمونه‌های مورد مطالعه: ۳ نر، فسما: ششده، باغ مرکبات ۱۳۸۶/۵/۱۰؛ زاهدانشهر، مزرعه ذرت ۱۳۸۵/۸/۱۰

مشخصات: نمونه‌های مورد مطالعه از لحاظ صفات ظاهری و ویژگی اندام تناسلی نر و ماده با توصیف نمونه تیپ (Amsel, 1949) مطابقت دارند. گستره بال در گونه‌های جمع‌آوری شده ۲۵ تا ۳۱ میلی‌متر است، در اندام تناسلی نر اونکوس گرد شده، گناتوس کشیده و نوک تیز، والوها عریض و در سطح داخلی پوشیده از مو، ساکولوس مشخص، ادیاگوس باریک و کشیده و دارای یک خار کیتینی کشیده می‌باشد (تصویر ۲-پ: Fig. 8-c) (Amsel, 1949).

انتشار: این گونه در ایران از فارس (سینه سفید، سلطان‌آباد، شیراز)، کرج، لرستان (سردزی)، تهران، (Amsel, 1961) و آذربایجان‌شرقی (Moddares Aval, 1997) گزارش شده است.


جنس *Iraniodes* (Amsel, 1961)

در این جنس شاخک، زمینه بال جلویی مایل به قهوه‌ای و بهرنگ چوب و سلول بسته انتهایی بسیار نامشخص است. اولین خط عرضی کمی به طرف خارج از یک سوم کوستال و خط عرضی دوم از پنج ششم کوستال تا چین جلویی کمی موج دار است، کناره بال دارای یک خط عرضی کاملاً ظریف بوده، در بال جلو رگبال R5 دارای ساقه مشترک با رگبال‌های R3+R4 و در بال عقب رگبال R و M1 دارای ساقه مشترک (شکل ۵). پالپ‌ها به رنگ چوب و بدون طرح مشخص، پاها کوچک نیستند (Amsel, 1961). از این جنس فقط یک گونه شناسایی شده است (ZipcodeZoo, 2008). در این تحقیق این گونه جمع‌آوری و شناسایی شد.

شکل ۵- رگبندی بال در *Iraniodes bilinealis*Fig. 5- wing venation in *Iraniodes bilinealis* (R:Radial, M:Medial, Sc:Subcosta and Cu:Cubital)(گونه (Fig. 8-c تصویر ۸-پ: *Iraniodes bilinealis* (Amsel, 1961)

نمونه‌های مورد مطالعه: ۱ نر، فسا، باغ مرکبات، ۱۳۸۵/۲/۲۲


مشخصات ویژه: گستره بال ۲۰ میلی‌متر، در اندام تناسلی نر اونکوس کشیده و در انتهای گرد است، والوها دارای قاعده ضخیم و به‌سمت راس باریک می‌شوند، گناتوس تا انتهای اونکوس کشیده شده، ادیاگوس در قسمت میانی خمیده و بدون کورنوتوس است (Amsel, 1961). در نمونه مورد مطالعه در مقایسه با توصیف نمونه تیپ (Amsel, 1961) گناتوس کشیده‌تر از اونکوس و انتهای آن نوک‌تیز و دارای حالت قلاب‌مانند است؛ ادیاگوس عریض‌تر و دارای یک کورنوتی است (شکل ۹-ث).



شکل ۶- مناطق نمونه‌برداری در شهرستان جهرم


Fig. 6- Sampling regions in Jahrom

انتشار: این گونه فقط در ایران و از بوشهر و بندر چابهار گزارش شده است (Amsel, 1961). این گونه برای اولین بار از استان فارس گزارش می‌شود.



شکل ۷- مناطق نمونه برداری در شهرستان فسا

Fig. 7- Sampling regions in Fasa



شکل ۸- چهار گونه از خانواده Pyralidae جمع آوری شده از شهرستان های فسا و جهرم در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶- (الف)


L. anella (الف) *Areni. sabella* (ب) *Iran. bilinealis* (ت) *D. iranalis* (د)

Fig. 1- Four species from Family: Pyralidae collected from Fasa & Jahrom regions during 2006-2007 a) *L.anella* b) *Areni., sabella* c) *Iran.,bilinealis* d) *D.iranalis*

جدول ۱ - علایم اختصاری مربوط به اندام تناسلی

Table1- Abbreviated names for genital organs

Abbrev.	Full name
a.a	anterior apophysis
a.p	posterior apophysis
ad	aedeagus
an	antrum
c	cornutus
c.b	corpus bursa
co	costae
cu	culcita
d.b	ductus bursa
d.s	ductus seminalis
fi	fibula
gn	gnathos
ju	juxta
p.a	papillae anales
sa	saccus
scl	sclorite
si	signum
te	tegumen
tr	transtilla
va	valve
vi	vinculum
un	uncus



شکل ۹-الف) دستگاه تناسلی ماده *L. anella* (ث) *I. bilinealis* نر *A. sabella* (ب) دستگاه تناسلی نر *L. anella* (ت) *D. iranalis* (ث)

Fig. 2- a)Female genital organs of *L. anella*, b) *A. sabella*, c)Male genital organs of *I. bilinealis*, d)*L. anella*, e)*D. iranalis*

References

- Abaei, M. 1983.** Check list of pests of trees in Iran, Plant Pests And diseases Research Institute. 147pp. [In Persian]
- Abiverdi, C. 2001.** Iranian entomology, Faunal studies, vol. 2, Springer, 1033 pp.
- Alipanah, H. 2003.** Faunistic survey species of genous *Euchromius* Guenée (Lep:Pyraloidea: Crambidae) in iran, Iranian entomology, 115-134. [In Persian]
- Amsel, H. G. 1949.** Die Microlepidopteren der Brandt'schen Iran-Ausbeute. 1. Teil. – Bull.Soc.ent, 33: 227-269.
- Amsel, H. G. 1950.** Die Microlepidopteren der Brandt'schen Iran-Ausbeute. 2. Teil Arkive für Zoologi, 1 (17): 223-257.

- Amsel, H. G. 1951.** Die Microlepidopteren der Brandt'schen Iran-Ausbeute. 3. Teil Arkive für Zoologi, 1 (36) :525-563.
- Amsel, H. G. 1959.** Microlepidoptera aus Iran. Stuttg Beitr Naturk., (28): 1-47.
- Amsel, H. G. 1961.** Die Microlepidopteren der Brandt'schen Iran-Ausbeute. 5. Teil Arkive für Zoologi, ser.2, Bd. 13(17): 323-445.
- Calmbach, V. 1921.** Die Praparation der Mikrolepidopteren, unter besondere Berucksichtigung der kleinsten Arten unter den kleinen. Entomol Zeits. 35: 35-36.
- Denis, J. N. and I. Schiffermüller. 1775.** Systematisches Verzeichniß der Schmetterlingen der Wienergegend herausgegeben von einigen Lehrern am k. k. Theresianum. Augustin Bernardi, Wien, 323 pp.
- Dugdale, J. S. 1974.** Female genital configuration in the classification in Lepidoptera. New Zealand Journal of Zoology, 1(2): 46-127.
- Hanneman, H. J. 1964.** Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile. 50. Teil. Kleinschmetterlinge oder Microlepidoptera. II. Die Zünslerartigen (Pyraloidea): 401 pp.
- Heppner, J. 1991.** Faunal region and the diversity of Lepidoptera.-Trop. Lepidoptera, 2: 1-85.
- Holloway, J. D., Bradley, J. D. and Carter, D. J. 1987.** CIE Guides to Insects of Importance to Man. I. Lepidoptera. British Museum (Natural History), London. 262 pp
- Kristensen, N. P. 1998.** Lepidoptera, moths and butterflies. Volume1: Evolution, systematics, and biogeography. Handbook of zoology, Volume IV: Arthropoda: Insecta, Part 35. Berlin,Walter de Gruyter.
- Medvedev, G. S. 1997.** Keys to the Insect of the European Part of the USSR. Science Publishers, Inc., New Hampshire.
- Mirzayans, H. and kalaki, M. 1969.** 2nd list of Iranian Lepidoptera, Plant Pests And diseases Research Institute.
- Mirzayans, H. 1967.** First list of Iranian Lepidoptera, Plant Pests And diseases Research Institute. 26:15-16pp.
- Moddares Aval, M. 1994.** List of Pests of Iranian's Farmers and natural enemies. Ferdowsi university of Mashhad,Iran, 147. First edition. [In Persian]
- Moddares Aval, M. 1997.** List of Pests of Iranian's Farmers and natural enemies. Ferdowsi university of Mashhad, 147, Second edition, 233-235. [In Persian]
- Munroe, E. G. and Solis, M. A. 1998.** The Pyraloidea.– In: Kristensen, N. P., Lepidoptera, Moths and Butterflies. Volume 1: Evolution, systematics, and biogeography. - In: M. Fischer (ed.), Handbook of Zoology. Volume IV Arthropoda: Insecta, Part 35. – Walter de Gruyter, Berlin. pp. 233–256.
- Nazari, V. 2003.** Iranian Butterflies, First book, publisher: green circle, 374pp. [In Persian]
- Ragonot, E. L. 1901.** Monographie des Phycitinae et des Galleriinae. Pp. i-xli, 1–507, 560, pls. 24–57. – In: Mém. Lépid. ROM 8, St. Petersburg.
- Rezaei, V and Dargahi, M. 2004.** First report of *Leucinodes orbonalis* (Guenee, 1854) from Iran. congress of Plant Pathology of Iran, 421-422. [In Persian]
- Whalley, P. E. S. 1964.** A catalogue of the (Lepidoptera, Pyralidae) with descriptions of new genera and species. Acta Zoologica, 9: 1–370.
- ZipcodeZoo team. 2008.** ZipcodeZoo.com available on the <http://zipcodezoo.com/Animals/>.

The first report of two species of pyralid moths (Lep., Pyraloidea) from Fars provience

F. Koohnavard¹*, H. Alipanah², Sh. Pashaeiye-Rad³, A. Kohansal⁴

1- Lecturer, Shahid Beheshti University, Tehran

2- Assistant professor, Iranian research institute of plant protection (IRIP), Tehran

3- Associate Professor, Department of zoology, Faculty of Biological science, Shahid Beheshti University, Tehran

4- Lecturer, Payamnur University, Bandar Abbas

Abstract

A faunistic survey were carried out on Pyralid moths (Lep., Pyraloidea) in Fasa & Jahrom cities in Fars province of Iran during 2006-2007. Samples were captured by light traps. More than 290 specimens (163 males, 133 females) were studied during this research and as a total, of 53 species belonging to 41 genera, 10 subfamilies and 2 families were determined. Among them, Pyralid species were recorded as follows: *Lamoria anella* (Denis & Schiffermüller). *Dattinia iranalis* (Amsel) *Arenipses sabella* (Hampson) and *Iraniodes bilinealis* (Amsel). Two Species of *Arenipses sabella*, *Iraniodes bilinealis* are reported for the first time from the Fars province.

Key words: Pyralidae, *Arenipses sabella*, *Iraniodes bilinealis*, Fars, Fasa, Jahrom

*Corresponding Author, E-mail: Fahimehkoohnavard@gmail.com
Received: 7 Apr. 2010 - Accepted: 2 Sep. 2010