

دسترسی در سایت <http://jnrm.srbiau.ac.ir>

سال پنجم، شماره نوزدهم، مرداد و شهریور ۱۳۹۸

شماره شاپا: ۲۵۸۸-۵۸۸۸X



پژوهش‌های نوین در ریاضی



دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

حلقه‌های J -مک‌کوی α -اریب

محمد وحدانی مهرآبادی^۱، شروین صاحبی^{۲*}

^(۲۹) گروه ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

تاریخ ارسال مقاله: ۹۶/۰۶/۲۳ تاریخ پذیرش مقاله: ۹۸/۰۴/۰۲

چکیده

در این مقاله، برای درونریختی حلقه‌های α ، حلقه‌های J -مک‌کوی α -اریب را معرفی می‌کنیم که تعمیمی از حلقه‌های مک‌کوی α -اریب و حلقه‌های J -مک‌کوی می‌باشند. برای حلقه R ، نشان می‌دهیم برای هر خودتوان e اگر $\alpha(e) = e$ و R یک حلقه J -مک‌کوی α -اریب باشد در این صورت eRe یک حلقه J -مک‌کوی α -اریب است. عکس این مطلب زمانی برقرار است که R یک حلقه آبلی باشد. همچنین اگر عدد صحیح t موجود باشد که $\alpha^t = id_R$ و $R[x]$ ، J -مک‌کوی α -اریب باشد در این صورت حلقه R نیز J -مک‌کوی α -اریب است. عکس این مطلب وقتی برقرار است که $J(R)[x] \subseteq J(R[x])$. بعلاوه، مثالی ارائه می‌کنیم که نشان می‌دهد خاصیت J -مک‌کوی α -اریب بودن یک حلقه نمی‌تواند به $M_n(R)$ انتقال یابد. اما برای هر n ، اگر R یک حلقه J -مک‌کوی α -اریب باشد در این صورت حلقه ماتریس‌های بالامثلتی نیز یک حلقه J -مک‌کوی $\bar{\alpha}$ -اریب می‌باشد. همچنین نشان دادیم اگر R یک حلقه شبه دو راست (چپ) و α یک درونریختی از حلقه R باشد، در این صورت R ، J -مک‌کوی α -اریب است اما عکس این مطلب در حالت کلی برقرار نیست.

واژه‌های کلیدی: حلقه مک‌کوی، حلقه مک‌کوی ضعیف، حلقه چند جمله‌ای، حلقه J -مک‌کوی.

۱- مقدمه

در این مقاله همه حلقه‌ها یک‌دار و شرکت‌پذیرند و منظور از e_{ij} و $T_n(R)$ ، $N(R)$ ، $J(R)$ ، $M_n(R)$ ، $C(R)$ ، به ترتیب مرکز حلقه R ، ماتریس $n \times n$ بر حلقه R ، رادیکال جیکوبسن حلقه R ، اعضای پوچتوان حلقه R ، ماتریس بالامثلثی بر حلقه R و ماتریس با درایه (i, j) ام برابر یک و بقیه درایه‌ها برابر صفر می‌باشد.

حلقه $R = K[x; \alpha]$ حلقه چند جمله‌ای‌های اریب هیلبرت^۱ نامیده می‌شود که در آن $\alpha: K \rightarrow K$ یک همریختی است که $xb = \alpha(b)x$. از این رو در حلقه اریب هیلبرت داریم:

$$\sum_i a_i x^i \sum_j b_j x^j = \sum_{i,j} a_i \alpha^i(b_j) x^{i+j}.$$

اول بار رگ و چاوچاربا حلقه‌های مک‌کوی را معرفی کرده‌اند [۱]. حلقه ناجابجایی R یک حلقه مک‌کوی راست نامیده می‌شود اگر برای هر جفت چندجمله‌ای ناصفر $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ و $g(x) = \sum_{j=0}^m b_j x^j$ از حلقه $R[x]$ اگر $f(x)g(x) = 0$ آنگاه یک عضو ناصفر r از R وجود داشته باشد بطوریکه $a_i r = 0$. حلقه‌های مک‌کوی چپ نیز بطور مشابه تعریف می‌شوند. حلقه R مک‌کوی نامیده می‌شود اگر هم مک‌کوی راست و هم مک‌کوی چپ باشد.

تعداد زیادی از مقاله‌ها به بررسی ویژگی‌های حلقه‌های مک‌کوی پرداخته‌اند ([۲]، [۳]، [۴]، [۵]). علت نامگذاری "مک‌کوی" برای این حلقه‌ها این است که مک‌کوی نشان داده که حلقه‌های جابجایی در این شرط صدق می‌کنند. ویکتور کامیلو، تای کیون کوک و یانگ لی حلقه‌های ضرایب پوچ توان مک‌کوی راست (برای سادگی NC -مک‌کوی^۲ راست) را به عنوان تعمیمی از حلقه‌های مک‌کوی معرفی کرده‌اند [۶]. حلقه R یک حلقه NC -مک‌کوی راست نامیده می‌شود اگر برای چندجمله‌ای‌های ناصفر $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ و

$f(x)g(x) = 0$ ، $R[x]$ در $g(x) = \sum_{j=0}^m b_j x^j$ نتیجه دهد که $0 \neq c \in R$ موجود است بطوریکه $f(x)c \in N(R)[x]$ بطور معادل $0 \neq c \in R$ وجود داشته باشد بطوریکه $a_i c \in N(R)$. حلقه‌های NC -مک‌کوی چپ نیز بطور مشابه تعریف می‌شوند. حلقه R NC -مک‌کوی نامیده می‌شود اگر هم NC -مک‌کوی راست و هم NC -مک‌کوی چپ باشد.

وحدانی، صاحبی، سید جوادی حلقه‌های J -مک‌کوی را بعنوان تعمیمی از حلقه‌های NC -مک‌کوی معرفی کرده‌اند [۷]. حلقه R یک حلقه J -مک‌کوی راست^۳ (J -مک‌کوی چپ^۴) نامیده می‌شود اگر برای هر جفت چندجمله‌ای ناصفر $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ و $g(x) = \sum_{j=0}^m b_j x^j$ از حلقه $R[x]$ اگر $f(x)g(x) = 0$ باشد آنگاه یک عضو ناصفر r از R موجود باشد بطوریکه $a_i r \in J(R)$ (یک حلقه J -مک‌کوی نامیده می‌شود هرگاه هم J -مک‌کوی راست و هم J -مک‌کوی چپ باشد. بوضوح حلقه‌های NC -مک‌کوی، J -مک‌کوی می‌باشند. اما عکس این مطلب صحیح نیست.

یکی از تعمیم‌های مهم دیگر حلقه‌های مک‌کوی حلقه‌های مک‌کوی α -اریب^۵ می‌باشد که توسط باسر، کوک و لی معرفی شده‌اند [۸]. یک حلقه R با یک درونریختی α یک حلقه مک‌کوی α -اریب نامیده می‌شود اگر برای هر جفت چندجمله‌ای ناصفر $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ و $g(x) = \sum_{j=0}^m b_j x^j$ از حلقه $R[x; \alpha]$ اگر $f(x)g(x) = 0$ آنگاه یک عضو ناصفر c از R وجود داشته باشد بطوریکه $f(x)c = 0$ (بطور معادل $(a_i \alpha^i(c) = 0)$). هر حلقه مک‌کوی α -اریب یک حلقه مک‌کوی است که در آن $\alpha = id_R$. اما مثال زیر نشان می‌دهد یک حلقه مک

3. Right J – McCoy4. Left J – McCoy5. α – Skew McCoy

1. Hilbert's Twist

2. NC – McCoy

بسادگی می‌توان بررسی کرد که اگر R یک حلقه J -مک‌کوی باشد در این صورت یک حلقه J -مک‌کوی id_R -اریب می‌باشد که id_R یک درونریختی همانی R می‌باشد.

تذکر ۲-۲. بوضوح هر حلقه مک‌کوی α -اریب ضعیف یک حلقه J -مک‌کوی α -اریب می‌باشد. فرض کنید I یک ایده‌آل حلقه R و $\alpha(I) \subseteq I$ در این صورت $\bar{\alpha}: \frac{R}{I} \rightarrow \frac{R}{I}$ که برای $a \in R$ بصورت $\bar{\alpha}(a+I) = \alpha(a) + I$ تعریف می‌شود یک خودریختی از حلقه خارج قسمتی $\frac{R}{I}$ است.

گزاره ۲-۳. فرض کنید R یک حلقه با یک درونریختی α و I یک ایده‌آل از R باشد بطوریکه $\frac{R}{I}$ یک حلقه J -مک‌کوی $\bar{\alpha}$ -اریب است. اگر $I \subseteq J(R)$ در این صورت R یک حلقه J -مک‌کوی α -اریب می‌باشد.

اثبات: فرض کنید $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ و $g(x) = \sum_{j=0}^m b_j x^j$ دو چندجمله‌ای ناصفر از حلقه $R[x; \alpha]$ باشند بطوریکه $f(x)g(x) = 0$. در این صورت در حلقه $\frac{R}{I}$ خواهیم داشت

$$\left(\sum_{i=0}^n \bar{a}_i x^i\right) \left(\sum_{j=0}^m \bar{b}_j x^j\right) = 0.$$

بنابراین $\bar{c} \in \frac{R}{I}$ وجود دارد بطوریکه $\bar{a}_i \bar{\alpha}^i(\bar{c}) \in J\left(\frac{R}{I}\right)$ و بنابراین $a_i \alpha^i(c) \in J(R)$. پس R یک حلقه J -مک‌کوی α -اریب می‌باشد. \square

نتیجه ۲-۴. فرض کنید R یک حلقه موضعی با یک درونریختی α باشد. در این صورت R یک حلقه J -مک‌کوی α -اریب است.

کوی R با یک درونریختی α وجود دارد که مک‌کوی α -اریب نیست.

مثال ۱-۱. فرض کنید $R = \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2$ و

$\sigma: R \rightarrow R$ به صورت $\sigma((a, b)) = (b, a)$ تعریف شود. در این صورت R مک‌کوی است اما مک‌کوی σ -اریب نیست.

نیک‌مهر، نجاتی و دلدار، حلقه‌های مک‌کوی α -اریب ضعیف^۱ را که تعمیمی از حلقه‌های مک‌کوی α -اریب و حلقه‌های NC -مک‌کوی می‌باشد را معرفی کرده‌اند [۹]. فرض کنید α یک درونریختی حلقه R باشد. حلقه R یک حلقه مک‌کوی α -اریب ضعیف نامیده می‌شود اگر برای هر جفت چندجمله‌ای ناصفر

$$g(x) = \sum_{j=0}^m b_j x^j \quad \text{و} \quad f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$$

از حلقه $R[x; \alpha]$ اگر $f(x)g(x) = 0$ آنگاه یک عضو ناصفر c از R وجود داشته باشد بطوریکه $a_i \alpha^i(c) \in N(R)$. بوضوح اگر حلقه R یک حلقه NC -مک‌کوی باشد در این صورت مک‌کوی id_R -اریب ضعیف است که id_R خودریختی همانی R است.

براساس مطالعات و نتایج فوق، اکنون برای درونریختی α از حلقه R ، تعمیمی از حلقه‌های مک‌کوی α -اریب و J -مک‌کوی را تحت عنوان J -مک‌کوی α -اریب معرفی می‌کنیم.

۲- حلقه‌های J -مک‌کوی α -اریب

تعریف ۲-۱. فرض کنید α یک درونریختی از حلقه R باشد. حلقه R یک حلقه J -مک‌کوی α -اریب نامیده می‌شود اگر برای هر جفت چندجمله‌ای ناصفر $g(x) = \sum_{j=0}^m b_j x^j$ و $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ از حلقه $R[x; \alpha]$ ، اگر $f(x)g(x) = 0$ آنگاه یک عضو ناصفر r از R موجود باشد بطوریکه $a_i \alpha^i(r) \in J(R)$.

اریب باشد. اگر $f(y) = \sum_{i=0}^n a_i y^i$ و $g(y) = \sum_{j=0}^m b_j y^j$ دو چندجمله‌ای ناصفر از حلقه $R[y; \alpha]$ باشند بطوریکه $f(y)g(y) = 0$ آنگاه چون $R[[x]]$ یک حلقه J -مک‌کوی α -اریب است و $R \subseteq R[[x]]$ پس $0 \neq c(x) = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \dots \in R[[x]]$

موجود است بطوریکه $a_i \alpha^i(c(x)) \in J(R[[x]])$ و بنابراین برای هر $i = 0, 1, \dots, n$ داریم:

$$a_i \alpha^i(c_i) \in J(R[[x]]) \cap R \subseteq J(R).$$

چون $c(x)$ ناصفر است لذا $c_l \neq 0$ موجود است بطوریکه برای هر $i = 0, 1, \dots, n$ $a_i \alpha^i(c_i) \in J(R)$ و بنابراین R ، یک حلقه J -مک‌کوی α -اریب است. \square

در قسمت بعد برای $\alpha^t = id_R$ نشان می‌دهیم که ویژگی J -مک‌کوی α -اریب بودن یک حلقه به چندجمله‌ای‌های روی آن حلقه انتقال می‌یابد و بالعکس.

قضیه ۲-۷. فرض کنید α یک درونریختی از حلقه R باشد و عدد صحیح t موجود باشد که $\alpha^t = id_R$. اگر $J, R[x]$ -مک‌کوی α -اریب باشد در این صورت R نیز J -مک‌کوی α -اریب است. عکس این مطلب وقتی برقرار است که $J(R)[x] \subseteq J(R[x])$ **اثبات:** فرض کنید حلقه $R[x]$ ، J -مک‌کوی

α -اریب باشد. اگر $f(y) = \sum_{i=0}^n a_i y^i$ و $g(y) = \sum_{j=0}^m b_j y^j$ دو چندجمله‌ای ناصفر از حلقه $R[y; \alpha]$ باشند بطوریکه $f(y)g(y) = 0$ آنگاه چون $R[x]$ یک حلقه J -مک‌کوی α -اریب است و $R \subseteq R[x]$ بنابراین

$$0 \neq c(x) = c_0 + c_1 x + \dots + c_k x^k \in R[x]$$

موجود است بطوریکه $a_i \alpha^i(c(x)) \in J(R[x])$

اکنون توجه خود را به مطالعه کلاس دیگری از حلقه‌های J -مک‌کوی α -اریب معطوف می‌کنیم. فرض کنید R_k یک حلقه و α_k یک درونریختی از R_k باشد که $k \in I$. در این صورت برای ضرب $R = \prod_{k \in I} R_k$ درونریختی $\alpha: R \rightarrow R$ بصورت $\alpha((a_k)) = (a_k(\alpha_k))$ تعریف می‌شود. بسادگی می‌توان نشان داد که برای هر $k \in I$ ، اگر R_k ، J -مک‌کوی α_k -اریب باشد آنگاه $R = \prod_{k \in I} R_k$ ، J -مک‌کوی α -اریب است.

حلقه R را برگشت‌پذیر گوییم هرگاه برای هر a و b در R ، از $ab = 0$ نتیجه شود $ba = 0$. همچنین اگر α یک درونریختی از حلقه R باشد، حلقه R برگشت‌پذیر راست نامیده می‌شود هرگاه برای هر a و b در R ، از $ab = 0$ نتیجه شود $b\alpha(a) = 0$. [۸]

نتیجه ۲-۵. فرض کنید α یک درونریختی از حلقه R و $\bar{\alpha}: \frac{R}{J(R)} \rightarrow \frac{R}{J(R)}$ که $\bar{\alpha}(r + J(R)) = \alpha(r)$ یک درونریختی یک به یک از حلقه برگشت‌پذیر $\frac{R}{J(R)}$ باشد. اگر $\frac{R}{J(R)}$ برگشت‌پذیر راست باشد آنگاه R ، J -مک‌کوی α -اریب است.

اثبات: با استفاده از [۸، قضیه ۹] نتیجه می‌گیریم که $\frac{R}{J(R)}$ یک حلقه $\bar{\alpha}$ -اریب مک‌کوی است. لذا طبق گزاره ۲-۳، حکم برقرار است. \square

قضیه ۲-۶. فرض کنید α یک درونریختی از حلقه R باشد. در این صورت $J, R[[x]]$ -مک‌کوی α -اریب است اگر و فقط اگر R ، J -مک‌کوی α -اریب باشد.

اثبات: فرض کنید R ، یک حلقه J -مک‌کوی α -اریب باشد. چون $R \cong \frac{R[[x]]}{\langle x \rangle}$ و $\langle x \rangle \subseteq J(R[[x]])$ بنابراین طبق گزاره ۲-۳، $R[[x]]$ یک حلقه J -مک‌کوی α -اریب است. برعکس فرض کنید $J, R[[x]]$ -مک‌کوی α -

$\alpha(e) = e$. در این صورت eRe یک حلقه J -مک‌کوی α -اریب است. عکس این مطلب زمانی برقرار است که R یک حلقه آبلی باشد.

اثبات: چندجمله‌ای‌های ناصفر $f(x) = \sum_{i=0}^n ea_i x^i$ و $g(x) = \sum_{j=0}^m eb_j x^j$ از $(eRe)[x; \alpha]$ را در نظر بگیرید بطوریکه $f(x)g(x) = 0$. چون R یک حلقه J -مک‌کوی α -اریب است پس $0 \neq s \in R$ موجود است بطوریکه $(ea_i e)\alpha^i(s) \in J(R)$. پس $(ea_i e)\alpha^i(ese) \in eJ(R)e = J(eRe)$

و بنابراین eRe ، J -مک‌کوی α -اریب است. اکنون فرض کنید eRe یک حلقه J -مک‌کوی α -اریب باشد. چندجمله‌ای‌های ناصفر $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ و $g(x) = \sum_{j=0}^m b_j x^j$ از $R[x; \alpha]$ را بطوریکه $f(x)g(x) = 0$ در نظر بگیرید. بوضوح $ef(x)e, eg(x)e \in (eRe)[x; \alpha]$ و $(ef(x)e)(eg(x)e) = 0$ (چون e یک عضو خودتوان مرکزی R است). پس $0 \neq s \in eRe$ موجود است بطوریکه

$$(ea_i e)\alpha^i(s) = a_i \alpha^i(s) \in J(eRe) = eJ(R) \subset J(R)$$

بنابراین R یک حلقه J -مک‌کوی α -اریب است. \square فرض کنید α یک درونریختی از حلقه R و $M_n(R)$ یک ماتریس $n \times n$ بر حلقه R باشد و $\bar{\alpha}((a_{ij})) = (\alpha(a_{ij}))$ بصورت $\bar{\alpha}: M_n(R) \rightarrow M_n(R)$ تعریف شود. در این صورت $\bar{\alpha}$ یک درونریختی از $M_n(R)$ است. روشن است که تحدید $\bar{\alpha}$ بر $T_n(R)$ یک درونریختی بر $T_n(R)$ است. $\bar{\alpha}|_{T_n(R)}$ را بصورت $\bar{\alpha}$ نشان می‌دهیم.

برای یک حلقه R و $\alpha = id_R$ و $n \geq 2$ ، $M_n(R)$ لزوماً J -مک‌کوی α -اریب نیست [۷، مثال ۳]. با این وجود در گزاره بعد نشان می‌دهیم حلقه ماتریس‌های بالامتلی روی یک حلقه J -مک‌کوی α -اریب، J -مک‌کوی $\bar{\alpha}$ -اریب می‌باشد.

پس برای هر $i = 0, 1, \dots, n$ داریم:

$$a_i \alpha^i(c_i) \in J(R[x]) \cap R \subseteq J(R).$$

چون $c_i \neq 0$ ناصفر است لذا $c_i \neq 0$ موجود است بطوریکه برای $i = 0, 1, \dots, n$ ، $a_i \alpha^i(c_i) \in J(R)$ و بنابراین R ، یک حلقه J -مک‌کوی α -اریب است. برعکس فرض کنید R ، یک حلقه J -مک‌کوی α -اریب باشد و برای چندجمله‌ای‌های ناصفر

$$f(y) = f_0 + f_1 y + \dots + f_m y^m$$

$$g(y) = g_0 + g_1 y + \dots + g_n y^n$$

در $R[x][y; \alpha]$ ، عدد صحیح مثبت $f(y)g(y) = 0$ را بصورت

$$k = \sum_{i=0}^m \deg f_i + \sum_{j=0}^n \deg g_j$$

بگیرید و درجه چندجمله‌ای صفر را برابر صفر قرار دهید.

در این صورت $f(x^k)$ و $g(x^k)$ چندجمله‌ای‌های ناصفری در $R[x; \alpha]$ می‌باشند و چون مجموعه ضرایب f_i ها و g_j ها با مجموعه ضرایب $f(x^k)$ و

$g(x^k)$ مساویند و $id_R = \alpha^k$ لذا $f(x^k)g(x^k) = 0$.

از آنجایی که R ، یک حلقه J -مک‌کوی α -اریب می‌باشد لذا یک عضو ناصفر $c \in R$ موجود است بطوریکه برای هر ضریب a_i از $f_i(x)$ ،

$$f_i \alpha^i(c) \in J(R)[x] \subseteq J(R[x])$$

پس $a_i \alpha^i(c) \in J(R)$ و لذا $R[x]$ ، J -مک‌کوی α -اریب است. \square

در ادامه گزاره‌ای مطرح می‌کنیم که نشان می‌دهد ویژگی J -مک‌کوی α -اریب بودن از حلقه R به حلقه eRe انتقال می‌یابد که e یک عضو خودتوان مرکزی حلقه R است و حالت عکس زمانی برقرار است که R یک حلقه آبلی^۲ باشد. یادآوری می‌کنیم حلقه R آبلی است اگر هر خودتوان آن مرکزی باشد.

گزاره ۲-۸. فرض کنید R یک حلقه J -مک‌کوی α -اریب و e یک عضو خودتوان R باشد بطوریکه

1. Central idempotent
2. Abelian

که * نشان‌دهنده عضوی از R است. لذا $T_n(R)$ یک حلقه J -مک‌کوی $\bar{\alpha}$ -اریب است. □

تذکره ۲-۱۰. هر همریختی σ از حلقه‌های R و S می‌تواند به همریختی حلقه‌های $R[x]$ و $S[x]$ که به صورت $\sum_{i=0}^m a_i x^i \rightarrow \sum_{i=0}^m \sigma(a_i) x^i$ تعریف می‌شود، توسعه داده شود که آن را با σ نشان می‌دهیم.

گزاره ۲-۱۱. فرض کنید $\sigma: R \rightarrow S$ یک یکرختی حلقه‌ای باشد. اگر حلقه R ، J -مک‌کوی α -اریب باشد در این صورت S ، J -مک‌کوی $\sigma\alpha\sigma^{-1}$ -اریب است.

اثبات: فرض کنید $f(x) = \sum_{i=0}^m a_i x^i$ و $g(x) = \sum_{j=0}^n b_j x^j$ دو چندجمله‌ای ناصفر از حلقه $S[x; \sigma\alpha\sigma^{-1}]$ باشند. چون σ یک یکرختی است لذا $f_1(x) = \sum_{i=0}^m a'_i x^i$ و $g_1(x) = \sum_{j=0}^n b'_j x^j$ در $R[x; \alpha]$ موجود است بطوریکه $f(x) = \sigma(f_1(x)) = \sum_{i=0}^m \sigma(a'_i) x^i$

لذا $g(x) = \sigma(g_1(x)) = \sum_{j=0}^n \sigma(b'_j) x^j$ ابتدا نشان می‌دهیم که $f(x)g(x) = 0$ نتیجه می‌دهد که $f_1(x)g_1(x) = 0$. برای هر $0 \leq k \leq m$ داریم:
 $a_0 b'_k + a_1 (\sigma\alpha\sigma^{-1})(b'_{k-1}) + \dots + a_k (\sigma\alpha\sigma^{-1})^k (b'_0) = 0$
 براساس تعریف $f_1(x)$ و $g_1(x)$ داریم:

$$\sigma(a'_0)\sigma(b'_k) + \sigma(a'_1)(\sigma\alpha\sigma^{-1})\sigma(b'_{k-1}) + \dots + \sigma(a'_k)(\sigma\alpha\sigma^{-1})^k \sigma(b'_0) = 0$$

چون $(\sigma\alpha\sigma^{-1})^t = \sigma\alpha^t\sigma^{-1}$ لذا داریم:
 $a'_0 b'_k + a'_1 \alpha(b'_{k-1}) + \dots + a'_k \alpha^k (b'_0) = 0$

گزاره ۲-۹. فرض کنید α یک درونریختی از حلقه J -مک‌کوی α -اریب R باشد. در این صورت برای هر n ، $T_n(R)$ یک حلقه J -مک‌کوی $\bar{\alpha}$ -اریب است

اثبات: فرض کنید $f(x) = \sum_{i=0}^p A_i x^i$ و $g(x) = \sum_{j=0}^q B_j x^j$ دو چندجمله‌ای ناصفر از حلقه $T_n(R)[x; \bar{\alpha}]$ باشند بطوریکه $f(x)g(x) = 0$

$$A_i = \begin{pmatrix} a_{11}^{(i)} & a_{12}^{(i)} & \dots & a_{1n}^{(i)} \\ 0 & a_{22}^{(i)} & \dots & a_{2n}^{(i)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn}^{(i)} \end{pmatrix} \quad \text{و}$$

$$B_j = \begin{pmatrix} b_{11}^{(j)} & b_{12}^{(j)} & \dots & b_{1n}^{(j)} \\ 0 & b_{22}^{(j)} & \dots & b_{2n}^{(j)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & b_{nn}^{(j)} \end{pmatrix}$$

در این صورت از رابطه $f(x)g(x) = 0$ برای هر $1 \leq s \leq n$ خواهیم داشت:

$$\left(\sum_{i=0}^p a_{ss}^i x^i\right) \left(\sum_{j=0}^q b_{ss}^j x^j\right) = 0.$$

چون حلقه R ، J -مک‌کوی α -اریب است لذا $s_k \neq 0$ موجود است بطوریکه برای $1 \leq k \leq n$

$a_{ss}^i \alpha^i (s_k) \in J(R)$ تعریف می‌کنیم

$$S = \begin{pmatrix} s_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & s_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & s_n \end{pmatrix}$$

در این صورت

$$A_i \bar{\alpha}^i (S) = \begin{pmatrix} a_{11}^{(i)} \alpha^i (s_1) & * & \dots & * \\ 0 & a_{22}^{(i)} \alpha^i (s_2) & \dots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn}^{(i)} \alpha^i (s_n) \end{pmatrix} \in J(T_n(R))$$

که نشان می‌دهد $V_n(R)$ ، یک حلقه J -مک‌کوی $\bar{\alpha}$ -اریب است. \square

فرض کنید R یک حلقه و α یک خودریختی از R و S یک زیرمجموعه بسته ضربی R شامل اعضای منظم مرکزی^۲ باشد. حلقه $S^{-1}R$ حلقه خارج قسمتی از R نسبت به S نامیده می‌شود. برای هر $b^{-1}a \in S^{-1}R$ ، $S^{-1}\alpha: S^{-1}R \rightarrow S^{-1}R$ را بصورت $S^{-1}\alpha(b^{-1}a) = (\alpha(b))^{-1}\alpha(a)$ تعریف می‌کنیم. در این صورت $S^{-1}\alpha$ یک خودریختی از $S^{-1}R$ است. در قسمت بعد نشان می‌دهیم حلقه خارج قسمتی $S^{-1}R$ از حلقه J -مک‌کوی α -اریب R ، خود J -مک‌کوی $S^{-1}\alpha$ -اریب می‌باشد.

قضیه ۲-۱۳. فرض کنید α یک درونریختی پوشا از حلقه R و حلقه R ، J -مک‌کوی α -اریب باشد. در این صورت $S^{-1}R$ ، J -مک‌کوی $S^{-1}\alpha$ -اریب می‌باشد.

اثبات: فرض کنید $f(x) = \sum_{i=0}^m c_i^{-1} a_i x^i$ و $g(x) = \sum_{j=0}^n d_j^{-1} b_j x^j$ دو چندجمله‌ای ناصفر از حلقه $S^{-1}R[x; S^{-1}\alpha]$ باشند بطوریکه برای هر i, j ، $f(x)g(x) = 0$ فرض کنید $c_i^{-1} a_i = a'_i c^{-1}$ و $d_j^{-1} b_j = b'_j d^{-1}$ که c, d اعضای منظم در R باشند. بنابراین $f'(x) = \sum_{i=0}^m a'_i x^i$ بطوریکه $f'(x)g'(x) = 0$ و $g'(x) = \sum_{j=0}^n b'_j x^j$ دو چندجمله‌ای ناصفر از حلقه $R[x; \alpha]$ می‌باشند. چون حلقه R ، J -مک‌کوی α -اریب است لذا وجود دارد $0 \neq r \in R$ بطوریکه برای هر i ، $a'_i \alpha^i(r) \in J(R)$ بنابراین $1 - ta'_i \alpha^i(r)$ در R معکوس‌پذیر است. لذا

که بدین معناست که در $R[x; \alpha]$ ، $f_1(x)g_1(x) = 0$ چون حلقه R ، J -مک‌کوی α -اریب می‌باشد لذا $0 \neq r \in R$ موجود است که $a'_i \alpha^i(r) \in J(R)$ چون $a'_i = \sigma^{-1}(a_i)$ و برای $r = \sigma^{-1}(s)$ ، $s \in R$ لذا $\sigma^{-1}(a_i) \alpha^i(\sigma^{-1}(s)) \in J(R)$ از این رو خواهیم داشت:

$$a_i (\sigma \alpha \sigma^{-1})^i(s) \in J(S), \quad 0 \leq i, j \leq m.$$

بنابراین S ، J -مک‌کوی $\sigma \alpha \sigma^{-1}$ -اریب است. \square

تذکره. فرض کنید $V = \sum_{i=1}^{n-1} e_{i,i+1}$ در این صورت $V_n(R) = RI_n + RV + \dots + RV^{n-1}$ زیرحلقه ماتریس‌های اریب بالامثلثی^۱ می‌باشد.

نتیجه ۲-۱۲. فرض کنید α یک درونریختی از حلقه R باشد. اگر حلقه خارج قسمتی $\frac{R[x]}{(x^n)}$ ، J -مک‌کوی $\bar{\alpha}$ -اریب باشد در این صورت $V_n(R)$ ، J -مک‌کوی $\bar{\alpha}$ -اریب است.

اثبات: فرض کنید $\frac{R[x]}{(x^n)}$ ، J -مک‌کوی $\bar{\alpha}$ -اریب باشد و یکریختی حلقه‌ای را بصورت

$$\theta: V_n(R) \rightarrow \frac{R[x]}{(x^n)}$$

$$\theta(r_0 I_n + r_1 V + \dots + r_{n-1} V^{n-1}) = r_0 + r_1 x + \dots + r_{n-1} x^{n-1} + (x^n)$$

تعریف می‌کنیم.

اکنون $V_n(R)$ ، J -مک‌کوی $\theta^{-1}\bar{\alpha}\theta$ -اریب است و

$$\theta^{-1}\bar{\alpha}\theta(r_0 I_n + r_1 V + \dots + r_{n-1} V^{n-1}) = \bar{\alpha}(r_0 I_n + r_1 V + \dots + r_{n-1} V^{n-1})$$

اثبات: چون R یک حلقه شبه دو راست است لذا $\frac{R}{J(R)}$ یک حلقه تقلیل یافته^۲ است و بنابراین برای یک درونریختی α ، طبق گزاره ۲-۳، J, R - مک کوی α - اریب است. اما یک حلقه J - مک کوی α - اریب R موجود است که شبه دو راست (چپ) نیست. اگر R یک دامنه ابتدایی^۳ راست باشد (یعنی حلقه تقسیم^۴ نباشد) (برای مثال جبر آزاد $\langle x, y \mid R=Q \rangle$)، در این صورت $\frac{R}{J(R)} = R$. بنابراین برای یک درونریختی α ، حلقه J, R - مک کوی α - اریب است اما شبه دو راست نیست [۱۰]. □

قضیه ۲-۱۶. خانواده حلقه‌های J - مک کوی α - اریب تحت حد مستقیم با نگاهت‌های یک به یک بسته است.

اثبات: فرض کنید $D = \{R_i, \alpha_{ij}\}$ یک سیستم مستقیم از حلقه‌های J - مک کوی α - اریب R_i برای هر $i \in I$ باشد و همریختی‌های حلقه‌ای $\alpha_{ij}: R_i \rightarrow R_j$ برای هر $i \leq j$ در رابطه $\alpha_{ij}(1) = 1$ صدق کنند که I یک مجموعه مرتب جزئی است. در نظر بگیرید حد مستقیم $R = \varinjlim R_i$ با $L_i: R_i \rightarrow R$ و $L_j \alpha_{ij} = L_i$ که هر L_i یک به یک است. نشان می‌دهیم R یک حلقه J - مک کوی α - اریب است. در نظر بگیرید $a, b \in R$. در این صورت $a = L_i(\alpha_i)$ و $b = L_j(\alpha_j)$ برای هر $i, j \in I$ و وجود دارد $k \in I$ بطوریکه $k \leq i$ و $k \leq j$. تعریف می‌کنیم $ab = L_k(\alpha_{ik}(\alpha_i)\alpha_{jk}(\alpha_j))$ و $a + b = L_k(\alpha_{ik}(\alpha_i) + \alpha_{jk}(\alpha_j))$ که $\alpha_{ik}(\alpha_i)$ و $\alpha_{jk}(\alpha_j)$ متعلق به R_k می‌باشند. در این صورت R به فرم یک حلقه با $0 = L_i(0)$ و $1 = L_j(1)$ می‌باشد. اکنون فرض کنید

$$\begin{aligned} & c^{-1}w^{-1}(1 - w^{-1}tc^{-1}a_i\alpha^i(r)cw) \\ &= c^{-1}w^{-1} - w^{-1}tc^{-1}a_i\alpha^i(r) \end{aligned}$$

برای هر $w^{-1}t \in S^{-1}R$ ، در $S^{-1}R$ معکوس‌پذیر چپ است. چون α پوشاست لذا وجود دارد $c', w' \in R$ بطوریکه

$$\begin{aligned} c_i^{-1}a_i\alpha^i(r)cw &= c_i^{-1}a_i\alpha^i(r)\alpha^i(c')\alpha^i(w') \\ &= c_i^{-1}a_i\alpha^i(rc'w') \in J(S^{-1}R) \end{aligned}$$

لذا $S^{-1}R, J$ - مک کوی α - اریب می‌باشد. □
برای یک خودریختی α از حلقه R ، $\bar{\alpha}: R[x, x^{-1}] \rightarrow R[x, x^{-1}]$ که بصورت

$$\bar{\alpha}\left(\sum_{i=k}^n a_i x^i\right) = \sum_{i=k}^n \alpha(a_i) x^i$$

تعریف شده یک خودریختی از $R[x, x^{-1}]$ است. $\bar{\alpha}|_{R[x]}$ (تحدید $\bar{\alpha}$ به $R[x]$) توسط $\bar{\alpha}$ نشان داده می‌شود.

نتیجه ۲-۱۴. اگر $R[x]$ یک حلقه J - مک کوی $\bar{\alpha}$ - اریب باشد در این صورت $R[x, x^{-1}]$ یک حلقه J - مک کوی $\bar{\alpha}$ - اریب می‌باشد.

تعریف. حلقه R یک حلقه شبه دو راست (چپ)^۱ نامیده می‌شود اگر هر ایده‌آل ماکسیمال راست (چپ) R دو طرفه باشد.

گزاره ۲-۱۵. اگر R یک حلقه شبه دو راست (چپ) و α یک درونریختی از حلقه R باشد، در این صورت R, J - مک کوی α - اریب است اما عکس این مطلب در حالت کلی برقرار نیست.

2. Reduce
3. Primitive Domain
4. Division Ring

1. Right (left) quasi-duo

$g_2(x) = \sum_{j=1}^n t_j x^j$ و $f_2(x) = \sum_{i=1}^m s_i x^i$ متعلق به $S[x; \alpha]$ می‌باشند. فرض کنید J, R -مک J -کوی α -اریب باشد. فرض کنید $F(x)G(x) = 0$. در این صورت $f_2(x)g_2(x) = 0$ و بنابراین داریم $f_2(x) = 0$ یا $g_2(x) = 0$ چون $S[x]$ دامنه است.

(i) اگر $f_2(x) = 0$ در این صورت $f_1(x)(g_1(x) + g_2(x)) = 0$

چون J, R -مک‌کوی α -اریب است $r \neq 0$ در R وجود دارد بطوریکه $a_i \alpha^i(r) \in J(R)$ در این

صورت $(a_i, 0) \bar{\alpha}^i(r, 0) \in J(D)$ که $0 \neq (r, 0) \in D$ و بنابراین J, D -مک‌کوی $\bar{\alpha}$ -اریب است.

(ii) فرض کنید $g_2(x) = 0$. براساس روند (i) داریم $(f_1(x) + f_2(x))g_1(x) = 0$ چون J, R -مک‌کوی α -اریب است $r \neq 0$ در R وجود دارد

بطوریکه $(a_i + s_i) \alpha^i(r) \in J(R)$. در این صورت

$(a_i, s_i) \bar{\alpha}^i(r, 0) \in J(D)$ که $0 \neq (r, 0) \in D$ و

بنابراین J, D -مک‌کوی $\bar{\alpha}$ -اریب است. براساس (i) و (ii) J, D -مک‌کوی $\bar{\alpha}$ -اریب است.

بالعکس، فرض کنیم D ، یک حلقه J -مک‌کوی

$\bar{\alpha}$ -اریب باشد و $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ و

$g(x) = \sum_{j=0}^m b_j x^j$ دو چندجمله‌ای ناصفر از

حلقه $R[x; \alpha]$ باشند بطوریکه $f(x)g(x) = 0$. در

$D[x; \bar{\alpha}]$ قرار دهید $F(x) = (f(x), 0)$ و

$G(x) = (g(x), 0)$ در این صورت

$F(x)G(x) = 0$. چون D ، یک حلقه J -مک‌کوی

$\bar{\alpha}$ -اریب است لذا یک عضو ناصفر $(r, 0) \in D$

وجود دارد بطوریکه $(a_i, 0) \bar{\alpha}^i(r, 0) \in J(D)$ در این

صورت $a_i \alpha^i(r) \in J(R)$ که $0 \neq r \in R$

بنابراین R یک حلقه J -مک‌کوی α -اریب است. \square

دو $g(x) = \sum_{j=0}^m b_j x^j$ و $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$

چندجمله‌ای ناصفر از حلقه $R[x; \alpha]$ باشند بطوریکه

$f(x)g(x) = 0$ باشد. وجود دارد $k \in I$ بطوریکه

$R_k[x; \alpha]$ در $f(x), g(x) \in R_k[x]$ بنابراین

$f(x)g(x) = 0$. چون R_k ، J -

مک‌کوی α -اریب است وجود دارد $c_k \neq 0$ در R_k

بطوریکه $a_i \alpha^i(c_k) \in J(R_k)$. قرار دهید

$c = L_k(c_k)$ در این صورت

$a_i \alpha^i(c) \in \varinjlim J(R_k) = J(R)$

برای یک عضو ناصفر c از R . بنابراین R یک حلقه

J -مک‌کوی α -اریب است. \square

تعریف. فرض کنید R یک جبر (با همانی یا بدون

همانی) بر یک حلقه تعویض‌پذیر S باشد. توسیع دوره‌ی

از R توسط S گروه ابلی $R \oplus S$ با ضرب تعریف

شده بصورت $(r_1, s_1)(r_2, s_2) = (r_1 r_2 + s_1 r_2 + s_2 r_1, s_1 s_2)$

برای $r_i \in R$ و $s_i \in S$ می‌باشد.

قضیه ۲-۱۷. فرض کنید R یک جبر بر دامنه

تعویض‌پذیر S با یک درونیختی α و D توسیع

دوره از R توسط S با درونیختی $\bar{\alpha}$ باشد. در این

صورت R یک حلقه J -مک‌کوی α -اریب است

اگر و فقط اگر D ، یک حلقه J -مک‌کوی $\bar{\alpha}$ -

اریب باشد.

اثبات: ملاحظه کنید که $s \in S$ بصورت $s1 \in R$ می-

باشد و بنابراین $R = \{r + s \mid (r, s) \in D\}$ و S

بعنوان زیرحلقه R مورد بررسی قرار می‌گیرد. فرض

کنید $F(x) = (f_1(x), f_2(x))$ و

$G(x) = (g_1(x), g_2(x))$ چندجمله‌ای‌های ناصفر

در $D[x; \bar{\alpha}]$ باشند که $f_1(x) = \sum_{i=1}^m a_i x^i$ و

$g_1(x) = \sum_{j=1}^n b_j x^j$ متعلق به $R[x; \alpha]$ و

فهرست منابع

- [1] Rege, M. B.; Chhawchharia, S. Armendariz rings, Proc. Japan Acad. Ser. A Math. Sci. 73 (1997), No. 1, pp. 14-17.
- [2] Kosan, M. T. Extention of rings having McCoy condition. Canad. Math. Bull. 52 (2) (2009), pp. 267-272.
- [3] McCoy, N. H. Remarks on divisors of zero, Amer. Math. Monthly 49 (1942), pp. 286-295.
- [4] Nielsen, P. P. Semi-Commutativity and the McCoy condition. J. Algebra 298 (2006), pp. 134-141.
- [5] Ying, Z. L.; Chen, J. L.; Lei, Z. Extensions of McCoy rings, Northeast. Math. J. 24 (2008), No. 1, pp. 85-94.
- [6] Camillo, V.; Kwak, T. K.; Lee, Y. On a generalization of McCoy rings. J. Korean Math. Soc. 50 (2013), No. 5, pp. 959-972.
- [7] Vahdani Mehrabadi M.; Sahebi, Sh.; Javadi, H. H. S. On a Generalization Of NC-McCoy Rings, J. Miskolc Mathematical Notes, Vol. 18 (2017), No. 1, pp. 337-345.
- [8] Baser, M.; Kwak, T. K.; Lee, Y. The McCoy condition on skew polynomial rings. Comm. Algebra 37(11) (2009), pp. 4026-4037.
- [9] Nikmehr, M. J.; Nejati, A.; Deldar, M. On Weak α -Skew McCoy Rings. de l'Institut Mathématique, 95(109) (2013), pp. 221-228.
- [10] Lam, T. Y.; Dugas, A. S. Quasi-duo rings and stable range descent, J. Algebra. 195, 3 (2005), pp. 243-259.