

انسداد مری یک راس تلیسه

اصغر وایانی حسنو^{۱*}، آرش باقری^۲

۱. دانشکده دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران، تهران، ایران

۲. دانشکده دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران، تهران، ایران

avh1372@gmail.com

دریافت مقاله: ۱۹ تیر ۱۴۰۰؛ پذیرش نهایی: ۲۵ شهریور ۱۴۰۰



JOURNAL OF VETERINARY CLINICAL RESEARCH

دوره سیزدهم، شماره یک، بهار و تابستان ۱۴۰۱

خلاصه: یک تلیسه چهارساله هولشتاین یک سیب را بلعیده بود و نشانه‌هایی از ریزش بزاق وجود داشت. سعی شد جسم خارجی به صورت دستی برداشته شود، اما موفق نشدیم، بنابراین تصمیم گرفتیم که حیوان را ازوفاگوتومی کنیم. محل جراحی به صورت آسپتیک آماده شد و بی حسی موضعی با استفاده از لیدوکائین دو درصد انجام شد. برش ۱۰ سانتی متر در سمت چپ توده ایجاد شد و سیب خارج گردید.

مقدمه: در گاوها انسداد حاد و کامل مری شدیداً خطرناک است زیرا مانع از خروج گازهای شکمبه می‌شود و نفخ ایجاد می‌کند. اشیایی که در مری گردنی قرار دارند ممکن است با لمس کردن جابجا شوند. آندوسکوپی و یا عدم عبور لوله بینی در اسب یا گاو نیز تشخیص را تأیید می‌کند. اقدام اصلی و اولیه ی جراحی مری در حیوانات بزرگ، رفع انسداد مری است که به درمان‌ها غیر تهاجمی و محافظه کارانه پاسخ نداده اند. در این مقاله انسداد مری گردنی به علت گیر کردن سیب و مدیریت جراحی آن را گزارش می‌کنیم.

واژگان کلیدی: مری، انسداد، جسم خارجی، آندوسکوپی، جراحی مری.