

تأثیر حذف پوسته بذر آفتابگردان در تحمل جوانه زنی به تنش شوری و خشکی

رامین عالیوند*^۱، امید انصاری^۱، فرزاد شریف زاده^۲، رحیم سروستانی^۳، محسن ممینی^۴

۱. دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران

۲. دانشیار دانشگاه تهران

۳. دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح باتات گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران

۴. دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۱/۰۹/۱۵

تاریخ دریافت: ۱۳۹۰/۰۲/۳۱

چکیده

شوری و خشکی از عوامل عمده محدود کننده تولیدات کشاورزی در بسیاری از کشورهای جهان به شمار می‌روند. به همین منظور دو آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در ۳ تکرار انجام گرفت. آزمایش اول شامل دو فاکتور پوسته (همراه با پوست و بدون پوست) و تنش شوری با نمک NaCl در شش سطح ۰، ۲، ۴، ۶، ۸، ۱۰- بار و آزمایش دوم نیز شامل دو فاکتور پوسته (همراه با پوست و بدون پوست) و تنش خشکی با پلی اتیلن گلیکول ۶۰۰۰ در شش سطح ۰، ۲، ۴، ۶، ۸، ۱۰- بار بود. آزمون به صورت تست جوانه‌زنی استاندارد در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد به مدت ۱۰ روز انجام شد. اثر تیمار حذف پوست بر شاخص‌های جوانه‌زنی (درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی، طول گیاهچه، درصد گیاهچه نرمال، وزن تر و خشک گیاهچه) در سطح ک درصد برای هر دو آزمایش معنی‌دار بود. اثر تنش شوری و خشکی بر شاخص‌های جوانه‌زنی نیز در سطح یک درصد معنی‌دار بود. اثر متقابل حذف پوسته در شوری برای همه صفات مورد اندازه‌گیری به غیر از متوسط زمان جوانه زنی در سطح یک درصد معنی‌دار بود. در تنش خشکی برای همه صفات در سطح یک درصد معنی‌دار بود. در تنش شوری بذور با پوست در تیمار شاهد ۷۰ درصد جوانه زنی داشتند، در حالی که حذف پوسته درصد جوانه زنی را به ۹۴ درصد افزایش داد. درصد جوانه زنی برای پتانسیل ۱۰- بار برای بذور بدون پوست ۷۰ درصد و برای بذور با پوست تنها ۱۸/۹۸ درصد بود. در شرایط تنش خشکی میانگین درصد جوانه‌زنی بذور با پوست ۳۹ درصد بود، در حالی که تیمار حذف پوست ۹۱ درصد بود. **واژگان کلیدی:** آفتابگردان، پوسته، جوانه‌زنی، خشکی، شوری و رشد گیاهچه.

مقدمه

آفتابگردان^۱ یکی از مهمترین محصولات روغنی در جهان می‌باشد (Flagella et al., 2002) و به عنوان یکی از گیاهان روغنی نقش قابل توجهی در تأمین روغن مورد نیاز کشور دارد (Danesheian et al., 2007). از سوی دیگر دستیابی به عملکردهای بالای محصولات در گرو فراهم نمودن نیازهای گیاه زراعی و ایجاد شرایطی مناسب برای گیاه در استفاده از نهاده‌ها می‌باشد (Monotti, 2004). خشکی و شوری از تنش‌های بسیار مهم در کاهش رشد و تولید محصولات زراعی می‌باشند (Kaya et al., 2001; Ashraf et al., 2006; Atak et al., 2006).

^۱ *Helianthus annuus*

شوری آب و خاک یکی از اساسی ترین مشکلات کشاورزی در مناطق خشک و نیمه خشک است و شور شدن تدریجی خاک از مسائل مهم در بسیاری از مناطق جهان به خصوص در کشور ما است. جوانه‌زنی بذور یک مرحله ضروری در توسعه گیاهچه‌های نرمال و در نهایت محصول بالا می‌باشد. جوانه‌زنی و رشد گیاهچه با فاکتورهای غیر زنده مثل شوری، خشکی و سرما کاهش می‌یابد (Kaya et al., 2001; Almansori et al., 1992; Ashraf et al., 2006; Atak et al., 2006). آب یکی از عوامل اصلی فعال کننده جوانه زنی است و قابلیت دسترسی بذر به آب، با کاهش پتانسیل اسمزی و ماتریک کاهش می‌یابد (Atak et al., 2006; Kaya et al., 2006). نتایج بدست آمده از آزمایشات مختلف نشان داده است که تنش شوری شاخص‌های را کاهش می‌دهد (Duman, 2006., Ashraf et al., 1992). کاهش جوانه‌زنی در اثر تنش خشکی می‌تواند با کاهش جذب آب توسط بذرها مرتبط باشد، اگر جذب آب توسط بذر مختل شود یا جذب آب به کندی صورت گیرد فعالیت‌های متابولیکی جوانه‌زنی به آرامی صورت می‌گیرد، در نتیجه مدت زمانی که ریشه‌چه از بذر خارج می‌شود طولانی تر شده و از این رو سرعت جوانه‌زنی نیز کاهش می‌یابد (Marchner, 1995). استفاده از سطوح نمک طعام درصد جوانه‌زنی را کاهش و متوسط زمان جوانه‌زنی را افزایش داد (Mohammed et al., 2002). نارسایی جوانه‌زنی تحت شرایط شور به دلیل کاهش جذب آب توسط بذر به علت پتانسیل اسمزی ایجاد شده توسط نمک طعام و یا اثرات سمی با توجه به جذب سدیم و کلر بیش از حد می‌باشد (Almansouri et al., 2001). بسیاری از پژوهش‌ها، اثر بازدارندگی شوری بر جوانه‌زنی را عمدتاً به دلیل محدودیت جذب آب توسط نمک طعام گزارش کردند. (Kaya et al., 2006; Khajeh Hosseini et al., 2003; Murillo et al., 2002; Atak et al., 2006). حذف پوسته در سه رقم آفتابگردان در آزمایشی نشان داد که با حذف پوسته، درصد و سرعت جوانه‌زنی در شرایط تنش خشکی نسبت به بذور با پوسته بیشتر می‌شود (Kaya, 2009). ضخامت و مقاومت فیزیکی پوسته بذر در گیاهان مختلف بسیار متفاوت است. جوانه‌زنی و ظهور گیاهچه در بذور آفتابگردان به دلیل وجود پوسته‌ی بذر که باعث جذب آهسته آب می‌گردد طولانی مدت می‌باشد. به عبارتی پوسته‌ی بذر با جلوگیری از جذب آب یا کند کردن انتقال رطوبت به جنین و آندوسپرم باعث طولانی تر شدن روند جوانه‌زنی در بذر می‌گردد (Kaya, 2009). هدف از این آزمایش ارزیابی حذف پوسته بر خصوصیات جوانه‌زنی بذور آفتابگردان در شرایط تنش خشکی و شوری بود.

مواد و روش‌ها

این تحقیق در سال ۱۳۹۰ در آزمایشگاه بذر گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به صورت دو آزمایش جداگانه فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در ۳ تکرار انجام شد. در این آزمایش از بذور آفتابگردان رقم گاپور تولید سال ۸۸ استفاده گردید. در آزمایش اول فاکتور پوسته در دو سطح (با پوسته و بدون پوسته) و تنش شوری در ۶ سطح (صفر، ۲، ۴، ۶، ۸، ۱۰-) و در آزمایش دوم، فاکتور پوسته در دو سطح (با پوسته و بدون پوسته) و تنش خشکی در ۶ سطح (صفر، ۲، ۴، ۶، ۸، ۱۰-) بود. برای ایجاد تنش خشکی از پلی اتیلن گلیکول ۶۰۰۰ (Michel, 1983; Michel & Kaufman, 1973) استفاده شد. برای ایجاد تنش شوری از نمک NaCl استفاده شد. جوانه‌زنی بذور در ۳ تکرار، هر تکرار شامل ۵۰ بذر به مدت ۱۰ روز مطابق با قوانین (ISTA, 2010) در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد تحت آزمون جوانه‌زنی به صورت بین کاغذی^۱ در شرایط پتری دیش انجام شد. تعداد بذور جوانه زده به طور روزانه شمارش و سپس در پایان صفات جوانه‌زنی شامل: درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی (GR)^۲، متوسط زمان جوانه‌زنی (MGT)^۳، طول گیاهچه، وزن گیاهچه محاسبه شدند.

¹ Between paper

² Germination Rate

³ Mean Germination Time

تجزیه واریانس داده ها بر اساس آزمایشات فاکتوریل و بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی انجام شد و برای مقایسه میانگین فاکتورها از آزمون دانکن در سطح ۵ درصد استفاده شد. محاسبات آماری با استفاده از نرم افزار SAS، رسم نمودارها با استفاده از نرم افزار Excel انجام شد.

نتایج

آزمایش اول: تنش شوری

اثر تیمار حذف پوست بر شاخص های جوانه زنی در سطح ۱ درصد معنی دار بود، اثر تنش شوری و اثر متقابل حذف پوسته در شوری بر همه ی شاخص های جوانه زنی به غیر از متوسط زمان جوانه زنی در سطح ۱ درصد معنی دار بودند (جدول ۱). مقایسه میانگین بذور با پوست و بدون پوست در شرایط تنش شوری اختلاف معنی داری در سطح ۵٪ برای صفات متوسط زمان جوانه زنی، طول گیاهچه، وزن گیاهچه و شاخص بنیه نشان داد (جدول ۲). بذور بدون پوست دارای شاخص های جوانه زنی بهتری نسبت به بذور با پوست بود (جدول ۲). بیشترین متوسط مدت زمان جوانه زنی مربوط به بذور با پوسته بود که در سطوح مختلف تنش خشکی اختلاف معنی داری با هم نداشتند (جدول ۲). بیشترین طول گیاهچه و بنیه بذور مربوط به سطوح شاهد و ۲- بار شوری در بذور بدون پوست می باشد (جدول ۲). از لحاظ وزن خشک گیاهچه بذور بدون پوست اختلاف معنی داری با هم نداشتند (جدول ۲). مقایسه میانگین اثرات متقابل حذف پوسته در شوری اختلاف معنی داری در سطح ۵٪ برای درصد جوانه زنی نشان داد (جدول ۲). حذف پوست طی تنش شوری باعث بهبود درصد جوانه زنی شد (شکل ۱). بذور با پوست و بدون پوست در تیمار شاهد نیز اختلاف معنی داری از خود نشان دادند، بذور با پوست در تیمار شاهد ۷۰ درصد جوانه زنی داشتند، در حالی که حذف پوسته درصد جوانه زنی را به ۹۴ درصد افزایش داد (شکل ۱).

درصد جوانه زنی بذور با پوسته با افزایش سطح شوری کاهش یافت به طوری که در پتانسیل ۲- بار نسبت به شاهد ۵۰٪ افت جوانه زنی را نشان داد (شکل ۱). درصد جوانه زنی برای پتانسیل ۱۰- بار بذور بدون پوست ۷۰ درصد و برای بذور با پوست ۱۸.۹۸ درصد بود (شکل ۱). سرعت جوانه زنی بذور بدون پوست نسبت به بذور با پوست اختلاف چشمگیری را نشان داد و همچنین بذور بدون پوست در سطوح شوری سرعت جوانه زنی بالایی را داشتند (شکل ۲).

جدول ۱. تجزیه واریانس اثر حذف پوسته و شوری بر درصد، سرعت و متوسط جوانه زنی، طول گیاهچه، وزن گیاهچه


| شاخص بنیه | وزن گیاهچه (گرم) | طول گیاهچه (cm) | متوسط زمان جوانه زنی (روز) | سرعت جوانه زنی | درصد جوانه زنی | درجه آزادی | منبع تغییر (میانگین مربعات) |
|-----------|------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|
| ۳۴۴/۰۱** | ۱/۲۴** | ۶۶۷/۶۲** | ۷۲/۴۴** | ۴/۴۴۵** | ۶۲۴۲۲/۲** | ۱ | حذف پوسته |
| ۷۲/۷۶** | ۰/۰۳** | ۶۱۴/۸۲** | ۰/۶۹ ^{ns} | ۰/۰۶۱** | ۱۵۲۲/۴۹** | ۵ | شوری |
| ۱۲/۰۲** | ۰/۰۲۲** | ۸۱/۶۷** | ۰/۲۷۵ ^{ns} | ۰/۰۵۳** | ۱۰۸۲/۴۹** | ۵ | حذف پوسته*شوری |
| ۰/۶۶۵ | ۰/۰۰۱۲ | ۳/۲۴۹ | ۰/۳۷۵ | ۰/۰۰۴۴ | ۵۹/۱۱ | ۲۴ | خطا |
| ۱۹/۱۸ | ۱۱/۹۳ | ۱۴/۸۱ | ۲۶/۹ | ۱۱/۶۷ | ۱۱/۹۳ | - | ضریب تغییرات |

** معنی داری در سطح احتمال ۰.۰۱ و ns عدم معنی داری است.


جدول ۲. مقایسه میانگین اثرات متقابل حذف پوست آفتابگردان در سطوح مختلف تنش شوری برای شاخص های جوانه زنی

| شاخص بینه | وزن گیاهچه (گرم) | طول گیاهچه (cm) | متوسط زمان جوانه زنی | شوری | پوست |
|-----------|------------------|-----------------|----------------------|---------|-----------|
| ۹/۰۶۴a | ۰/۴۲۱۸a | ۲۱/۵۰a | ۱/۱۰۸c | شاهد | بدون پوست |
| ۸/۳۵۷a | ۰/۴۳۹۷a | ۲۱/۰۹a | ۱/۰۸۷c | ۲- بار | |
| ۷/۵۱۱c | ۰/۴۲۴۸a | ۱۹/۰۰b | ۱/۱۹۱c | ۴- بار | |
| ۷/۰۷۳c | ۰/۴۱۵۹a | ۱۷/۶۷b | ۱/۱۲۳c | ۶- بار | |
| ۵/۱۷۳d | ۰/۴۱۲۹a | ۱۷/۴۴b | ۱/۳۰۵c | ۸- بار | |
| ۱/۴۵۶f | ۰/۳۹۵a | ۱۷/۰۲b | ۱/۸۰۴c | ۱۰- بار | |
| ۶/۵۹۹c | ۰/۳۱۱۹b | ۱۲/۴۵c | ۳/۲۱۷ab | شاهد | با پوست |
| ۳/۰۷۸۱e | ۰/۱۷۲۳c | ۱۰/۵۹c | ۳/۰۷۸ab | ۲- بار | |
| ۲/۱۳۰۱f | ۰/۱۹۶۱c | ۳/۶۷d | ۳/۲۰۵ab | ۴- بار | |
| ۰/۳۱۶۸g | ۰/۰۸۰۲d | ۳/۲۸d | ۲/۹۶۳b | ۶- بار | |
| ۰/۲۶۳۲g | ۰/۱۰۶۹d | ۲/۲۳de | ۳/۸۰۳a | ۸- بار | |
| ۰/۰۱۳۵g | ۰/۰۶۸۳d | ۰/۱۷e | ۳/۳۸۸ab | ۱۰- بار | |

حروف مشترک در هرستون بیانگر عدم تفاوت معنی دار در میانگین تیمار است



شکل ۱. مقایسه میانگین اثر متقابل حذف پوسته در شوری بر درصد جوانه زنی بذر آفتابگردان



شکل ۲. مقایسه میانگین اثر متقابل حذف پوسته در شوری بر سرعت جوانه زنی بذر آفتابگردان

آزمایش دوم: تنش خشکی

اثر تیمار حذف پوست و تنش خشکی بر شاخص های جوانه زنی در سطح ۱ درصد معنی دار بود، اثر متقابل حذف پوسته و خشکی برای درصد جوانه زنی و درصد جوانه زنی نرمال معنی دار نبود اما برای سایر شاخص های جوانه زنی به جز طول ریشه در سطح ۱ درصد معنی دار بود و برای طول ریشه در سطح ۵ درصد معنی دار بود (جدول ۳). مقایسه میانگین بذور با پوست و بدون پوست در شرایط تنش خشکی اختلاف معنی داری در سطح ۱٪ برای صفات متوسط زمان جوانه زنی، طول گیاهچه، وزن گیاهچه و شاخص بنیه نشان داد (جدول ۴). بذور بدون پوست دارای شاخص های جوانه زنی بهتری نسبت به بذور با پوست بودند (جدول ۴). بیشترین متوسط مدت زمان جوانه زنی مربوط به بذور با پوسته و سطح شوری ۱۰- بار بود (جدول ۴). بیشترین طول گیاهچه و وزن خشک مربوط به سطوح شاهد در بذور بدون پوست بود (جدول ۲).

جدول ۳. تجزیه واریانس اثر حذف پوسته و شوری بر درصد، سرعت و متوسط جوانه زنی، طول گیاهچه، وزن گیاهچه

| منابع تغییرات (میانگین مربعات) | درجه آزادی | درصد جوانه زنی | متوسط زمان جوانه زنی (روز) | سرعت جوانه زنی | طول گیاهچه (cm) | وزن گیاهچه (گرم) | شاخص ویگور ۲ |
|-----------------------------------|------------|----------------|----------------------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| حذف پوست | ۱ | ۲۳۸۴۰/۹۵۵** | ۹۲/۳۸۸** | ۱۳۴۳/۶۸۷** | ۵۲/۹۵۵** | ۰/۳۷۱** | ۵۱۲۴/۰۳** |
| خشکی | ۵ | ۸۳۳/۰۸۳** | ۸/۲۰۲** | ۵۳/۵۸۴** | ۳۶۹/۸۱۲** | ۰/۲۱۴** | ۹۸۸/۵۴۵** |
| حذف پوست * خشکی | ۵ | ۸۷/۱۵۴* | ۱/۱۶۱** | ۲۷/۹۲۴** | ۲۳/۶۴۷** | ۰/۰۲۷** | ۴۳۹/۱۳۴** |
| خطا | ۲۴ | ۲۹/۵۳۶ | ۰/۲۳۸ | ۰/۳۶۷ | ۳/۳۸۳ | ۰/۰۰۲۴ | ۲۱/۶۸۲ |
| ضریب تغییرات | - | ۸/۲۹۷ | ۷/۴۳۱ | ۷/۴ | ۱۵/۷۴۹ | ۱۸/۱۰۵ | ۲۶/۲۶۱ |


*, ** معنی داری در سطح احتمال ۰/۰۵، ۰/۰۱ و NS عدم معنی داری است.

جدول ۴. مقایسه میانگین اثرات متقابل حذف پوست آفتابگردان در سطوح مختلف تنش خشکی برای شاخص های جوانه زنی


| پوست | خشکی | شاخص بنیه | طول گیاهچه (cm) | وزن گیاهچه (گرم) | متوسط زمان جوانه زنی (روز) |
|-----------|---------|-----------|-----------------|------------------|----------------------------|
| بدون پوست | شاهد | ۱۸.۲۷۴a | ۲۲.۵۰۴a | ۰/۵۸۰a | ۱.۳۱۱e |
| | ۲- بار | ۱۸.۳۸۸a | ۱۳.۸۹۵c | ۰/۵۵۴ab | ۱.۲۹۰e |
| | ۴- بار | ۱۷.۸۰۷a | ۱۹.۹۱۲ | ۰/۵۲۶ab | ۱.۲۶۳e |
| | ۶- بار | ۱۴.۷۱۷b | ۱۲.۲۷۲c | ۰/۴۷۹b | ۱.۷۲۴e |
| | ۸- بار | ۱۰.۷۵۵c | ۶.۰۸۸g | ۰/۲۶۹c | ۲.۰۰۴e |
| | ۱۰- بار | ۵.۶۷۲d | ۲.۶۷۵i | ۰/۲۶۵c | ۳.۶۶۷d |
| با پوست | شاهد | ۲۹.۸۷e | ۲۴.۰۲۹a | ۰/۲۶۳c | ۵.۶۵۷b |
| | ۲- بار | ۲.۲۹۳e | ۱۵.۵۱۷c | ۰/۲۰۷c | ۴.۴۸۸cd |
| | ۴- بار | ۲.۶۰۱e | ۱۰.۸۵۳e | ۰/۰۶۱d | ۳.۸۲۷d |
| | ۶- بار | ۲.۴۱۶e | ۸.۱۹۷e | ۰/۰۳۹d | ۳.۹۳۴cd |
| | ۸- بار | ۱.۴۹۶e | ۳.۹۹۵g | ۰/۰۱۶d | ۴.۷۳۳c |
| | ۱۰- بار | ۰.۵۶۲e | ۰.۲۰۰i | ۰d | ۷.۸۴۳a |

حروف مشترک در هر ستون بیانگر عدم تفاوت معنی دار در میانگین تیمار است.

از لحاظ بنیه، سطوح شاهد، ۲- و ۴- بار تنش خشکی بذور بدون پوست اختلاف معنی داری با هم نداشتند (جدول ۴). مقایسه میانگین اثرات متقابل حذف پوست در شرایط تنش خشکی نشان داد که بیشترین درصد جوانه زنی مربوط به سطوح شاهد، ۲-، ۴- و ۶- بار تنش خشکی بود که از لحاظ آماری تفاوت معنی داری با هم نداشتند (شکل ۳). کمترین درصد جوانه زنی در شرایط تنش خشکی مربوط به بذور با پوسته و سطح تنش خشکی ۱۰- بار بود (شکل ۳). مقایسه میانگین اثرات متقابل حذف پوست در شرایط تنش خشکی نشان داد که بیشترین سرعت جوانه زنی مربوط به بذور بدون پوسته بود و تفاوت معنی داری بین سطوح شاهد تا سطح ۸- بار وجود نداشت (شکل ۴).



شکل ۳. مقایسه میانگین اثر متقابل حذف پوسته در خشکی بر درصد جوانه زنی بذر آفتابگردان



شکل ۴. مقایسه میانگین اثر متقابل حذف پوسته در خشکی بر سرعت جوانه زنی بذر آفتابگردان

بحث

مقایسه میانگین اثرات متقابل حذف پوست در شرایط تنش شوری و خشکی نشان داد که اختلاف معنی داری بین بذور بدون پوست و دارای پوست وجود دارد. به نظر می‌رسد با حذف پوسته جذب آب سریعتر انجام گرفته و همچنین مقاومت مکانیکی پوسته از خروج گیاهچه نیز حذف گردیده که باعث بهبود صفات جوانه زنی گردیده است. آب یکی از عوامل اصلی فعال کننده جوانه زنی است که قابلیت دسترسی به آب با منفی تر شدن پتانسیل اسمزی و ماتریک کاهش می‌یابد (Atak et al., 2006). تنش شوری سبب کاهش شاخص‌های جوانه زنی هم در بذور بدون پوست و هم با پوست شد، اما اثرات بازدارندگی بر بذور با پوسته بیشتر از بذور بدون پوسته بود. (Kaya, 2009) گزارش کرد که حذف پوسته آفتاب گردان سبب افزایش شاخص‌های جوانه زنی نسبت به بذور با پوست در شرایط تنش شوری می‌شود. اثرات بازدارندگی شوری بر روی جوانه زنی می‌تواند به دلیل اثر مستقیم آن بر روی رشد جنین باشد (Ashraf et al., 1992). تحقیقات نشان داده که افزایش شوری سبب افزایش جذب سدیم، پتاسیم و فسفر و کاهش جذب نیتروژن می‌شود که این امر می‌تواند دلیل کاهش درصد جوانه زنی نیز باشد (Safarnejad et al., 1996). بنیه بذر از دیگر شاخص‌های جوانه زنی است که با افزایش تنش شوری کاهش می‌یابد. با

افزایش شوری و منفی شدن پتانسیل اسمزی آب توسط نمک جذب آب برای جنین بذر سخت تر می‌شود و در نتیجه با افزایش شوری افت جوانه‌زنی و بنیه را در پی دارد. سطوح مختلف شوری سبب کاهش طول گیاهچه شد. محققین مختلف دریافتند که طویل شدن محور جنینی شدیداً بواسطه سطوح بالای کلرید سدیم موجود در محلول آبیاری بازداشته می‌شود (Poljakoff-Mayber et al., 1994). سطوح مختلف تنش خشکی نیز سبب کاهش درصد و سرعت جوانه‌زنی شد. اثرات منفی تنش خشکی بر درصد و سرعت جوانه‌زنی توسط محققین در گیاهان مختلف نیز گزارش شده است (Karan et al., 1985; Romo & Haferkamp, 1987). تنش خشکی ۶- بار بطور معنی‌داری جوانه‌زنی بذر نخود فرنگی را کاهش داد (Gamze et al., 2005). کاهش جوانه‌زنی در اثر تنش خشکی می‌تواند با کاهش جذب آب توسط بذرهای مرتبط باشد. اگر جذب آب توسط بذر مختل شود یا جذب آب به کندی صورت گیرد فعالیت‌های متابولیکی جوانه‌زنی به آرامی صورت می‌گیرد، در نتیجه مدت زمانی که ریشه‌چه از بذر خارج می‌شود طولانی‌تر شده و از این رو سرعت جوانه‌زنی نیز کاهش می‌یابد (Marchner, 1995). سطوح مختلف تنش خشکی سبب کاهش طول گیاهچه بذر آفتابگردان شد اما تاثیر کاهش طول گیاهچه در بذر بدون پوسته کمتر بود. در آزمایشی بر روی تمشک با سطوح تنش خشکی ایجاد شده در سطوح بالا کاهش طول اندام هوایی نسبت به سطح شاهد مشاهده شده است (Georgieva et al., 2004). یکی از علل کاهش طول ساقه‌چه در شرایط تنش خشکی، کاهش یا عدم انتقال مواد غذایی از بافت‌های ذخیره‌ای بذر به جنین ذکر گردیده است (Trautwein et al., 1997). دلیل کاهش رشد گیاهچه در بذر با پوسته را در سطوح بالای تنش خشکی می‌توان سخت بودن پوسته و اثر ممانعت‌کنندگی پوسته بر جذب آب دانست. حذف پوسته باعث می‌شود تا درصد جوانه‌زنی افزایش یابد و همچنین سرعت جوانه‌زنی باعث استقرار سریع‌تر گیاهچه گردد. به نظر می‌رسد با حذف پوسته جذب آب سریع‌تر انجام گرفته و همچنین مقاومت مکانیکی پوسته از خروج گیاهچه نیز حذف گردیده که باعث بهبود صفات جوانه‌زنی گردیده است. جوانه‌زنی و ظهور گیاهچه در بذر آفتابگردان به دلیل وجود پوسته‌ی بذر که باعث جذب آهسته آب می‌گردد طولانی مدت می‌باشد. به عبارتی پوسته‌ی بذر با جلوگیری از جذب آب یا کند کردن انتقال رطوبت به جنین و اندوسپرم باعث طولانی‌تر شدن روند جوانه‌زنی در بذر می‌گردد (Kaya, 2009). حذف پوسته نه تنها باعث جذب سریع‌تر آب توسط جنین و اندوسپرم بذر می‌شود بلکه مقاومت مکانیکی برای خروج ریشه‌چه از پوسته نیز حذف می‌گردد، و در نتیجه بذر به سرعت مراحل جوانه‌زنی را طی کرده و گیاهچه رشد و نمو خود را ادامه می‌دهد. (Atak et al., 2006).

نتیجه گیری نهایی

نتایج این آزمایش به خوبی نشان داد که حذف پوسته سبب افزایش شاخص‌های جوانه‌زنی بذر آفتابگردان در شرایط تنش شوری و خشکی می‌شود. تیمار حذف پوسته در بذر آفتابگردان باعث افزایش درصد جوانه‌زنی و سرعت جوانه‌زنی و دیگر شاخص‌های جوانه‌زنی طی شرایط شوری و خشکی می‌گردد، به نظر می‌رسد که می‌تواند سبب افزایش سرعت رشد و یکنواختی سبز شدن در مزرعه گردد. افزایش درصد جوانه‌زنی و سرعت جوانه‌زنی می‌تواند باعث صرفه جویی نهاده‌های کشاورزی (همچون آب، بذر، کود) گردد.

References

- Almansouri, M., Kinet, J.M. and Lutts, S. 2001. Effect of salt and osmotic stresses on germination in durum wheat (*Triticum durum* Desf.). *Plant Soil*. 231: 243-254.
- Ashraf, M., Bokhari, H. and Cristiti, S.N. 1992. Variation in osmotic adjustment of lentil (*Lens culmaris* Medic) in response to drought. *Acta Bot. Neerlandica*. 41: 51-62.
- Atak, M., Kaya, M D., Kaya, G., Çıkkılı, Y. and Çiftçi, CY. 2006. Effects of NaCl on the germination, seedling growth and water uptake of triticale. *Turk. J. Agric. For.* 30: 39-47.

- Demir Kaya, M. 2009. The role of hull in germination and salinity tolerance in some sunflower (*Helianthus annuus* L.) cultivars. *African Journal of Biotechnology* Vol. 8 (4), pp. 597-600.
- Duman, I. 2006. Effects of Seed Priming with PEG or K₃PO₄ on Germination and Seedling Growth in Lettuce. *Pakistan J Biologic Sci.* Vol: 923-928.
- Finch-Savage, W.F., Phelps, J.R.A., Whalley, W.R. and Rowse. H. R. 2001. Seed reserve-dependent growth responses to temperature and water potential in carrot (*Daucus carota* L.). *J. Exp. Bot.* 52. 2187-2197.
- Flexas, J., Bota, J., Loreto, F., Cornic, G. & Sharkey, T. D. 2004. Diffusive and metabolic limitations to photosynthesis under drought and salinity in C3 plants. *Plant Biol*, 6, 269-279.
- Gamze, O., Kaya, M.D. and Atak, M. 2005. Effect of Salt and Drought Stresses on Germination and Seedling Growth of Pea (*Pisum sativum* L.). *Turk J Agric For* 29 (2005) 237-242.
- Georgieva, M.D., Djilianov, D., Konstantinova, T. and Parvanova, D. 2004. Screening of Bulgarian raspberry cultivars and elites for osmotic tolerance in vitro. *Biotech. Equip.* 18(2): 95-98.
- Ghaderifar, F., Ghaleshi, F. and Ahmadi, A. 2011. Effects of drought stress on germination and seedling growth of nine *Trifolium subterraneum* L. *Iranian Journal of Field Crops Research.* 8(1): 61-68.
- Hampson, C.R. and Simposon, G.M. 1990. Effect of temperature, salt and osmotic potential on early growth of wheat. II. Early seedling growth. *Canadian Journal of Botany.* 68: 524-528.
- Hosseini, H. and Rezvani-moghadam, P. 2011. The effect of drought and salinity on germination of *Plantago ovata*. *Iranian Journal of Field Crops Research.* 4(1): 15-22.
- Kaya, MD., Okçu, G., Atak, M., Çikili, Y. and Kolsarıcı, Ö. 2006. Seed treatments to overcome salt and drought stress during germination in sunflower (*Helianthus annuus* L.). *Eur. J. Agron.* 24: 291-295.
- Karan, S., Afria, B., and Singh, K. 1985. Seed germination and seedling growth of chick pea (*Cicer arietium*) under water stress. *Seed. Res.* 13:1-9.
- Khajeh-Hosseini, M., Powell, AA. And Bingham, I.J . 2003. The interaction between salinity stress and seed vigour during germination of soybean seeds. *Seed Sci. Technol.* 31: 715-725.
- Marchner, H. 1995. *Mineral Nutrition of Higher Plants* .Second reprint. Academic Press. pp: 6-73.
- Mohammed, EM. Benbella M. and Talouizete, A. 2002. Effect of sodium chloride on sunflower (*Helianthus annuus* L.) seed germination. *Helia*, 25: 51-58.
- Monotti, M. 2004. Growing non-food sunflower in dry land conditions. *Ital J Agron*, 8: 3-8.
- Murillo-Amador, B., Lopez-Aguilar, R., Kaya, C., Larrinaga-Mayoral, J. and Flores-Hernandez, A . 2002. Comparative effects of NaCl and polyethylene glycol on germination, emergence and seedling growth of cowpea. *J. Agron. Crop Sci.* 188: 235-247.
- Michel, E.B.1093. Evaluation of the Water Potentials of Solutions of Polyethylene Glycol 8000 Both in the Absence and Presence of Other Solutes. *Plant Physiol.* (1983) 72, 66-70.
- Michel, B. and Kaufman, E.1973 The osmotic potential of polyethylene glycol6000. *Plant Physiol* 51: 914-916
- Safarnejad, A., Collin, H.A., Bruce, K.D. and Mc Neily, T. 1996. Characterization of alfalfa (*Medicago sativa*) following in vitro selection for salt tolerance. *Euphytica*, 92:55-61.